

علم الحشرات والجامر

(أساسيات ومتقدم)

دكتور

محمد بن عبد الله بن محمد

أستاذ بكلية العلوم الزراعية والأغذية
جامعة الملك فيصل



للطبع والنشر والتوزيع

السعودية - الدمام

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

إهداء

إلى جميع الرواد الأول الذين ساهموا في بناء صرح جامعة الملك
فيصل الفتية والتي تبوأ مكانتها الآن بين الجامعات السعودية
والعربية.

أهدى هذا الكتاب

« المؤلف »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَقْدِيم

بسم الله، أقدم هذه الطبعة من كتاب علم الحشرات العام لطلاب كليات الزراعة والعلوم والمعاهد الزراعية العليا وللباحثين في الفروع المختلفة لعلم الحشرات بالدول العربية.

ولقد تعمدت أن يكون لهذا الكتاب صفتان مميزتان ، الأولى : الإختصار المبسط في لغة سهلة ميسرة ، الثانية : الإهتمام بالرسم وبالشكل التوضيحي لأغلب محتويات الكتاب . ولقد قصدت أن يجيء على هذه الصورة ملخصاً لتركيب الأجزاء المختلفة للحشرة وأجهزتها الداخلية ووظائفها الحيوية ، فيكون للدارس معوناً للفهم في غير ما صعوبة أو جهد .

وعلم الحشرات ، علم شديد الغور متشعب المسالك كثير الدروب ، لذلك كان لابد لدارس هذا العلم من ضوء ينير السبيل ، ويهدي إلى الغاية .

فلعلني أكون قد وفقت في أن أضع بين يدي الدارسين والباحثين شمعة على الطريق ، ولعلني أكون بذلك أيضاً قد أنرت من مكتبتي العربية جانباً في هذا التخصص .

على أنني أرجو أن يتاح لي في طبعات قادمة بإذن الله أن يكون الضوء أبعد مدى وأكثر سبى .

ولله الفضل والمنة وهو ولي التوفيق .

المؤلف

المحتويات

الباب الأول

الصفحة

أولاً : مقدمة	١٧
ثانياً : مميزات الحشرات	١٧
ثالثاً : أضرار ومنافع الحشرات	٢١
رابعاً : موقع الحشرات في المملكة الحيوانية	٢٩
خامساً : تطور نشوء جسم الحشرة من حيوان أولى دودي الشكل	٣٨

الباب الثاني

الغلاف الخارجي (جدار جسم الحشرة)	٤٣
صفائح ونموات جدار الجسم	٤٤
تركيب جدار الجسم	٤٨
الإنسلاخ	٥١

الباب الثالث

مناطق الجسم في الحشرات	٥٩
الرأس	٥٩
أجزاء الفم	٦٥
الرقبة	٧٤
الصدر	٨١
الأرجل	٨٤
الأجنحة	٨٨
البطن	٩٧
زوائد البطن	٩٧

الباب الرابع

- ١٠٧ الغدد أو أعضاء الإفراز
١٠٧ الغدد غير الصماء

الباب الخامس

- ١٢٧ الجهاز العصبي
١٢٧ أولاً : الجهاز العصبي المركزي
١٣٤ ثانياً : الجهاز العصبي الحشوي أو السمبثاوي
١٣٧ الغدد الصماء
١٥٤ ثالثاً : الجهاز العصبي السطحي
١٥٤ أعضاء الحس
١٥٥ أعضاء الحس الميكانيكية
١٥٧ أعضاء الحس الكيماوية
١٥٨ أعضاء الحس الضوئية
١٦٧ أعضاء الحس التي تتأثر بالحرارة والرطوبة

الباب السادس

- ١٧١ أولاً : طرق إحداث الصوت ووسائل السمع في الحشرات
١٧١ الأصوات الناتجة بسبب إهتزازات أجنحة الحشرات أثناء الطيران
١٧٣ الأصوات الناتجة بسبب احتكاك جزء من أجزاء الحشرة بسطح جسم خارجي صلب
١٧٣ الأصوات الناتجة بسبب قيام الحشرة بأعمال ميكانيكية خاصة
١٧٩ ثانياً : وسائل السمع في الحشرات
١٨٠ أعضاء السمع ذات الطبلة الخارجية
١٨٣ عضو جونستون
١٨٣ مجاميع الخلايا الحسية السمعية الموجودة بأرجل الحشرات
١٨٤ الأطباق الحسية المبعثرة على جدار الجسم
١٨٥ الشعيرات السمعية الحسية المنتشرة على سطح الجسم

الباب السابع

١٨٩	الجهاز التنفسي
١٩٢	الثغر التنفسي
١٩٣	القصبة الهوائية
١٩٣	الأكياس الهوائية
١٩٦	سلوك الجهاز القصبي عند الإنسلاخ
١٩٦	ميكانيكية التنفس
١٩٨	التنفس في الحشرات المائية
١٩٨	التنفس في الحشرات المتطفلة داخل أجسام حشرات أخرى

الباب الثامن

٢٠٥	الجهاز الهضمي
٢٠٥	أولاً : القناة الهضمية
٢٠٥	القناة الهضمية الأمامية
٢٠٦	القناة الهضمية الوسطى
٢١٠	القناة الهضمية الخلفية
٢١٤	ثانياً : الهضم في الحشرات
٢١٨	ثالثاً : أنابيب مليجي

الباب التاسع

٢٢٧	الجهاز العضلي
٢٢٧	جهاز عضلي هيكل
٢٢٧	جهاز عضلي حشوي
٢٣٠	أنواع الألياف العضلية الهيكلية
٢٣١	التخطيط العرضي في العضلات الهيكلية
٢٣٢	اتصال العضلات الهيكلية بمجدار الجسم
٢٣٤	أنواع العضلات المحركة لزوائد الجسم

الباب العاشر

٢٤١	الجهاز الدوري والأنسجة المتصلة به
٢٤١	الوعاء الظهري

٢٤٣	الحجابان الحاجزان العلوى والسفلى
٢٤٤	الفتحات الجانبية
٢٤٦	غرف القلب
٢٤٦	الدورة الدموية
٢٤٧	الدم
٢٥١	الخلايا الجار قلبية
٢٥١	الخلايا النبذية
٢٥٢	الجسم الدهنى
٢٥٦	أعضاء إحداث الضوء

الباب الحادى عشر

٢٦١	الجهاز التناسلى
٢٦١	أولاً : الجهاز التناسلى فى الأنثى
٢٦٩	ثانياً : الجهاز التناسلى فى الذكر
٢٧١	ثالثاً : الخلايا التناسلية
٢٧١	البيضة
٢٧٨	الحيوان المنوى
٢٨٦	رابعاً : أوضاع التزاوج فى الحشرات
٢٨٨	خامساً : التكاثر فى الحشرات

الباب الثانى عشر

٢٩٩	تكوين الجنين فى الحشرات (القوم الجنينى)
٢٩٩	تكوين الأجسام القطبية
٢٩٩	تكوين البلاستودرم والشريط الجنينى
٢٩٩	تكوين الأغشية الجنينية وعملية الإنبعاث الداخلى فى سطح الجنين السفلى
٣٠١	ظهور حلقات الجسم
٣٠٢	طبقة الميزودرم
٣٠٢	تكوين جدار الجسم والفراغ الداخلى
٣٠٣	الوعاء الظهرى
٣٠٣	الأجهزة التناسلية

٣٠٣	 الجهاز العصبي
٣٠٤	 الجهاز الهضمي وملحقاته
٣٠٥	 القصبات الهوائية
٣٠٦	 مراحل النمو الأخيرة
٣٠٦	 طرق الفقس من البيضة

الباب الثالث عشر

٣١٢	 النمو الذى يلي النمو الجنينى فى الحشرات (التطور)
٣١٤	 طور البيضة
٣١٤	 طور اليرقة
٣١٤	 طور الحورية
٣١٤	 طور العذراء
٣١٧	 فرط التطور

الباب الرابع عشر

٣٢١	 تكوين ونشوء الحشرة الكاملة
٣٢٢	 الهيودرمس
٣٢٢	 القناة الهضمية
٣٢٤	 أنابيب مليجي
٣٢٤	 الغدد اللعابية (وغدد الحرير)
٣٢٤	 الخلايا النبذية
٣٢٤	 الجهاز القصى
٣٢٥	 الوعاء الظهرى
٣٢٥	 الجهاز العصبى المركزى
٣٢٥	 الجهاز العضلى
٣٢٦	 الجهاز التناسلى
٣٢٦	 النمو الذى قد يحدث بعد انتهاء عملية التطور

الباب الخامس عشر

٣٣٣	 الحشرات والبيئة
٣٣٣	 علم البيئة الذاتى أو الفردى

علم البيئة الجماعى أو الإجمالى	٣٣٣
العوامل المؤثرة فى حياة الحشرات وحيويتها وتكاثرها وانتشارها	٣٣٣
التوازن الحيوى	٣٣٤

الباب السادس عشر

تصنيف الحشرات وتسميتها	٣٤٧
تحت صف أبتريجوتا (الحشرات عديمة الأجنحة)	٣٥٥
رتبة دييلورا (ذات الذنب المزدوج)	٣٥٦
رتبة بروتورا (ذات الذنب الأولى)	٣٥٨
رتبة كوليمولا (ذات القضيب اللاصق)	٣٥٩
تحت صف بتريجوتا (الحشرات ذوات الأجنحة)	٣٦٠
قسم إكسوتريجوتا (الحشرات ذوات الأجنحة الخارجية النمو)	٣٦٠
رتبة إيميروتا (ذات الأجنحة اليومية البقاء)	٣٦٠
رتبة أودوناتا (ذات الأجزاء الفمية المسننة)	٣٦١
رتبة بليكوترا (مطبعة الأجنحة)	٣٦٤
رتبة أورثوترا (مستقيمة الأجنحة)	٣٦٥
رتبة فازميرا (الحشرات الشبحية أو العضوية)	٣٦٦
رتبة ديرماترا (جلدية الأجنحة)	٣٦٩
رتبة إمبيوترا (أمياوية الأجنحة)	٣٧٠
رتبة ديكتيوترا (مشبكة الأجنحة)	٣٧١
رتبة أيسوترا (متساوية الأجنحة)	٣٧٣
رتبة زورابترا (الحشرات الرائقة غائبة الأجنحة)	٣٧٥
رتبة سوكوترا	٣٧٥
رتبة مالوفاجا (آكلات الشعر)	٣٧٧
رتبة هيميترا (نصفية الأجنحة)	٣٧٨
رتبة هوميترا (متشابهة الأجنحة)	٣٨٢
قسم إندوتريجوتا (الحشرات ذوات الأجنحة الداخلية النمو)	٣٨٢
رتبة نيوروبترا (معصبة أو شبكية الأجنحة)	٣٨٣
رتبة ميكوترا (طويلة الأجنحة)	٣٨٦
رتبة ليدوترا (حرفية الأجنحة)	٣٨٧
رتبة تراكوترا (شعرية الأجنحة)	٣٩٢

٣٩٤	رتبة دييترا (ذات الجناحين)
٣٩٥	رتبة سايفونابترا (غائبة الأجنحة ذات الفم المصاص)
٣٩٧	رتبة هايمينوترا (غشائية الأجنحة)
٤٠١	رتبة كوليوبترا (غمدية الأجنحة)
٤٠٣	رتبة ستريسيبترا (ملوية الأجنحة)
٤٠٤	المفاتيح التقسيمية

الباب السابع عشر

٤١٧	علم الأحافير الحشرية
٤١٨	الرتب الحشرية المعروفة على صورة مستحجرات فقط
٤٢٠	رتبة باليوديكتيوبترا
٤٢٠	رتبة بروتورثوترا
٤٢٠	رتبة ميغاسيكتوبترا
٤٢١	رتبة بروتودوناتا
٤٢١	رتبة بروتويرلاريا
٤٢٢	رتبة بروتوهمبترا
٤٢٢	رتبة بروتوكوليوبترا
٤٢٣	رتبة بروتيليتروبترا
٤٢٣	التاريخ الجيولوجي للحشرات
٤٢٣	العصر الديفونياوى
٤٢٤	العصر الكربونى
٤٢٤	العصر البرميائى
٤٢٥	العصر الترياسى
٤٢٦	العصر الجيوراسى
٤٢٦	العصر الطباشيرى
٤٢٧	العصر الثلاثى
٤٢٧	التاريخ التطورى للرتب الحشرية المنقرضة والحديثة

المراجع

٤٣٢	المراجع العربية
٤٣٣	المراجع الأجنبية

الباب الأول

أولا : المقدمة

تشغل الحشرات مركزا ممتازا في المملكة الحيوانية وذلك بفضل ما لها من مميزات كثيرة تفوقت بها على غيرها من الحيوانات الأخرى ، فتراها تعيش على اليابسة وفي الماء ، كما تتحمل الحياة في المناطق الباردة والمناطق الحارة ، كما أنها لم تترك أغلب الكائنات الحية سواء أكانت نباتاً أو حيواناً إلا وأصابها بضررها أو زودتها بمنفعتها . وعلاوة على ذلك تمتاز الحشرات بعددها الهائل جداً ، فقد بلغ ما عرف وتمت تسميته من الحشرات حتى الآن نحو ٩٠٠,٠٠٠ نوعا ، وهذا العدد يفوق كل ما عرف من جميع أنواع الحيوانات الأخرى والبالغ عددها حوالي ٢٧١,٠٠٠ نوعا .

وعلى العموم تحتوى قبيلة مفصليات الأرجل على أكثر من ٧٦ ٪ من المجموع الكلى لأنواع المملكة الحيوانية ، كما وأن صف الحشرات وحده يحتوى على أكثر من ٩١ ٪ من مجموع أنواع قبيلة مفصليات الأرجل وأكثر من ٧١ ٪ من مجموع أنواع المملكة الحيوانية .

ويحتوى صف الحشرات Class Insecta على ٣٠ رتبة حشرية Insect Orders وتشمل كل رتبة منها عددا معروفا من الأنواع .

كما أن هناك أنواع أخرى من الحشرات لم تكتشف بعد وهذه عددها ولا شك كبير جداً ، ويكتشف من الحشرات سنويا حوالي ١٠,٠٠٠ نوع جديد باستمرار . والنوع الواحد من الحشرات يحتوى على أعداد لا يحصى لها من الأفراد ، وعلى سبيل المثال نذكر الجراد الرحال الذى يغير على بعض البلاد ، وهو يهاجر في شكل أسراب قد يبلغ طول السرب الواحد منها في بعض الأحيان ستة أميال وعرضه نحو ميلين ، وهنا يمكننا أن نتصور ما يحويه هذا للسرب من أفراد الجراد الهائلة .

ثانيا : مميزات الحشرات

احتلت الحشرات المركز الممتاز الذى وصلت إليه بين أفراد المملكة الحيوانية عن طريق تمتعها بعدة مميزات هامة هي :

١ - قدرة الحشرات على الطيران :

المشاهد أن أغلب الحشرات يمكنها أن تطير بفعل الأجنحة ، وقد مكن الطيران الحشرات من الإنتشار فوق مساحات شاسعة من الأرض مما جعل الحشرات في مأمن من

شر التزاحم وما يترتب عليه من عدم توافر الغذاء وبالتالي قلة انتاجها من البيض الذى يفقس مكونا الأجيال الجديدة من الحشرات ، كما وأن وجود الأجنحة مكن الحشرات بجانب البحث عن غذائها من أن تهرب من أعدائها وأن تعثر على الجنس الآخر .

٢ — مقدرة الحشرات على التأقلم :

يمكن للحشرات أن تعيش وتأقلم فى بيئات مختلفة ، وعلى هذا يمتد توزيع الحشرات على الكرة الأرضية من القطبين إلى خط الاستواء ، ولم تترك الحشرات تقريبا أى نوع من أنواع النباتات إلا واتخذته غذاء لها ، وحتى المواد العضوية المتحللة لم تسلم من تغذية الحشرات عليها . كذلك يتطفل الكثير من الحشرات إما خارجيا أو داخليا على غيره من الحشرات أو الحيوانات الأخرى بما فى ذلك الحيوانات الفقيرة . ولم تقصر الحشرات سكناها على الجزء اليابس من القشرة الأرضية بل أن منها ما يعيش فى الماء ، وحتى فى الجهات الشديدة البرودة تعيش أنواع من الحشرات ، إذ وجد بعضها يتحمل درجة برودة تصل إلى ٥٠° م تحت الصفر ، كذلك فإن الحرارة المرتفعة لم تقف عقبة فى طريق انتشار الحشرات بدليل أن بعضها يعيش فى النبايع الساخنة التى تزيد درجة حرارتها عن ٤٠° م ، كما توجد أنواع من الحشرات فى الصحارى التى تبلغ درجة حرارتها فى فصل الصيف وقت الظهيرة حوالى ٦٠° م . ويعيش فى بعض آبار البترول بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية نوع خاص من الذباب . كذلك يمكن لبعض الخنافس أن تعيش على نباتات سامة مثل الخشخاش وأبى النوم .

٣ — حجم الحشرات الصغير :

النادر من الحشرات ما هو كبير الحجم مثل *Palophus titan* (رتبة الحشرات العنكبوتية) والتى تعتبر أكبر الحشرات الموجودة حجما إذ تبلغ حوالى ٢٥ سم فى الطول ، ٤٢ جم فى الوزن ، وكذلك الفراشة المسماة *Thysania agrippinao* التى تبلغ فى العرض عند فرد جناحيها حوالى ٢٨ سم (متكالف وفلنت ، ١٩٦٢) . إلا أن أغلب الحشرات صغيرة الحجم جدا إذ تبلغ فى المتوسط من ٦ — ١٠ مم فى الطول ، ٢٥ — ٥٠ ملجم فى الوزن ، مما جعلها تتمتع بميزات ليست متوفرة لغيرها من الحيوانات الأكبر منها . فصغر حجم الحشرة جعلها تكتفى بكمية ضئيلة من الطعام ، وبالتالي يمكن لمجموعة كبيرة من الحشرات الصغيرة أن تعيش على مقادير ضئيلة من الأغذية تعتبر كمية مهملة بالنسبة للحيوانات الأخرى . ولقد كان من نتيجة صغر الجسم أيضا أن الحيز الصغير من البيئة يمكنه أن يحوى أعدادا هائلة من الحشرات ، ولهذا أمكن للغالبية العظمى من الحشرات أن تعيش وتم دورة حياتها فى مناطق آمنة بعيدة عن أعدائها مثل

الحشرات التى تعيش بين بشرق ورقة نبات مثل Leaf-mining Insects ، أو داخل بذور صغيرة جدا كبذور البرسيم والقمح والأرز واللوبيا ، أو فى الشقوق أو تحت سطح التربة . وصغر حجم الحشرة يعطيها قوة ومرونة أكثر مما لو كانت كبيرة الحجم ، وعلى هذا فيمكن للبرغوث الذى لا يزيد متوسط طول أرجله عن ١,٣ ملم تقريبا أن يقفز لارتفاع ٢١ سم ولمسافة ٣٤ سم ، فإذا قارنا بين البرغوث والانسان من هذه الناحية لكان الواجب على الانسان إذن أن يقفز لارتفاع ٤٥٠ قدم فوق سطح الأرض ولمسافة ٧٠٠ قدم إذ أن متوسط طول أرجله تبلغ نحو ٧٥ سم . ويمكن للجراد الصحراوى *Schistocerca gregaria* كذلك أن يقفز لارتفاع يعادل ١٠ أمثال مقدار ارتفاع جسمه ، ٢٠ مثلاً مقدار طول جسمه كما يمكنه أن يرفع ثقلاً يبلغ ١٠ أمثال وزن جسمه وذلك برجل واحدة من أرجله . ولقد وجد أن الخنفساء *Lucanus dama* يمكنها سحب ثقل يعادل حوالى ١٢٠ مرة ثقل جسمها ، فإذا كانت قوة الانسان تعادل قوة هذه الخنفساء لكان من الممكن للانسان الذى يزن حوالى ٧٥ كيلوجراماً أن يسحب ثقلاً يبلغ ٩ أطنان ، وهذه القوة الخارقة للحشرات راجعة إلى صغر حجمها ، إذ كلما زاد حجم الجسم كلما قلت قوة عضلاته والعكس صحيح .

٤ - عناد الحشرات :

الذبابة هى أكبر مثل على عناد وإصرار الحشرات فهى عندما تحوم يومياً حول الحيوانات أو تضايق الإنسان داخل المنازل وقت الراحة أو النوم يكون من الصعب تخويفها أو إرجاعها عن إصرارها أو عنادها ، ومثل هذا الإصرار يمكنها من الحصول على ما تطلبه من غذاء ضرورى لحياتها وللإعداد لأجياها القادمة .

٥ - تركيب جسم الحشرات :

للحشرات وغيرها من أفراد قبيلة مفصليات الأرجل هيكل خارجى صلب *Exoskeleton or Integument* . ولهذا الهيكل الخارجى فضل كبير على الحشرات فى حياتها وتطورها ، فكونه مبنى على شكل حلقات *Segments* متمفصلة مع بعضها البعض بأغشية رقيقة يجعل جسم الحشرة يتحرك فى أى اتجاه بسهولة شديدة .

وتغليف جسم الحشرات من الخارج جعله أقوى بكثير من الهيكل المحورى للفقرات بدليل أن أحد العلماء أجرى مقارنة بين قوة احتمال زلدة من زوائد حيوان فقرى (ذات هيكل داخلى مسط) فوجد أن الهيكل الخارجى للحشرة أقوى بنحو ٣ أمثال الهيكل الداخلى للفقرات .

وعلاوة على متانة الهيكل الخارجى للحشرات فانه مقاوم عنيد للمبيدات الحشرية ، كما أنه غير منفذ للماء ، ولذلك فقد أصبح وسيلة فعالة لحماية الحشرة من المؤثرات الخارجية وكذلك مكن الحشرة من الإحتفاظ بالماء الموجود بداخلها مما كان له أكبر الأثر فى مساعدة الحشرات على سكنى الأرض وعلى التفوق على غيرها من الحيوانات .

ويحمل الهيكل الخارجى للحشرات من الخارج شعيرات وأشواك وحراشيف لحماية الحشرة من المؤثرات الميكانيكية الخارجية ومن الحرارة المرتفعة أو من الأعداء الطبيعية ، كما قد تفرز بعض هذه الشعيرات إفرازات سامة . وبجانب هذا يمكن للكثير من الحشرات إفراز روائح طاردة تبعد عنها أعداءها الطبيعية .

٦ — القدرة على حماية نفسها :

من أحسن وسائل حماية الحشرات فعلاً هو الشرنقة التى تفرزها يرقات رتبة حرشفية الأجنحة حول نفسها لتعذر بداخلها أو لتبقى اليرقة طيلة حياتها داخل مثل هذه الشرنقة كما تفعل يرقات دودة الملابس ذات الكيس *Tineola biseliella* ، وبناء العشوش فى الحشرات الإجتماعية هى وسيلة من وسائل حماية الحشرات لنفسها . ولكثير من الحشرات طرق مختلفة للتخفى عن أعدائها مثل الحشرات العصوية مثلاً والتى عندما تبقى ساكنة تشبه فرع الشجرة الواقفة عليه تمام الشبه مما يجعلها فى مأمن من أعدائها . ويمكن لبعض أنواع أخرى من الفراشات أو الذباب أن تأخذ شكل أو لون أنواع الفراشات والذباب الغير مستساغة فى الطعم لتلك الطيور . وأهم الأمثلة على قدرة الحشرات على حماية نفسها تلك التى توجد فى رتبة غشائية الأجنحة التى تملك آلة لسع قوية تلدغ بها كل من يقترب منها ، كما توجد حشرات أخرى تثقب جدار جسم المعتدى عليها أو تقرضه بأجزاء فمها .

٧ — سرعة التكاثر :

للحشرات مقدرة كبيرة على التكاثر . وفى الحشرات ذات التكاثر الجنسى تضع الإناث البيض بعد أن تلحقها الذكور ، ثم يفقس هذا البيض لتخرج منه صغار يموت منها الكثير بفعل عوامل البيئة المضادة ، ومع ذلك فإن ما يتبقى منها فيه الكثير من الكفاية للمحافظة على بقاء النوع . وقد ذهبت بعض الحشرات فى طريقة تناسلها إلى أبعد من ذلك ، فقد تستغنى الاناث عن الذكور وتضع بيضا غير مخصب لكنه يفقس ، وهذا ما يسمى بالتوالد البكرى *Parthenogenesis* ، أو قد تضع الاناث يرقات أو عذارى مباشرة وهذا ما يسمى بولادة الأحياء *Viviparity* ، أو قد تتكاثر الأطوار الغير

كاملة في الحشرات أثناء طورى اليرقة أو العذراء وهذا مايسمى بتوالد الأطوار غير الكاملة . Paedogenesis

ومما يساعد الحشرات على التكاثر السريع ان فترة حياة الحشرة قصيرة إذا قورنت بغيرها من الحيوانات ، فبعض الحشرات كالمن مثلاً لا يستغرق الجيل الواحد فيها أكثر من ٥ أيام . بينما هناك حيوانا أخرى كالحوانات القارضة مثلاً قد يستغرق الجيل الواحد فيها عدة أشهر ، وفي بعض الحيوانات الثديية قد يستغرق الجيل الواحد عدة سنوات .

ولكى نأخذ فكرة عن سرعة تكاثر الحشرات ندرس حشرة المن مثلاً والتي تلد أنثاها الواحدة بدون تلقيح من ٢٠ — ١٢٠ أنثى أى ٧٠ أنثى في المتوسط ، فيكون في الجيل الأول ٧٠ أنثى ، وفي الجيل الثانى ٤٩٠٠ أنثى (70×70) . وفي الجيل الثالث ٣٤٣,٠٠٠ أنثى ، والرابع ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ أنثى وهكذا ، فاذا علم أن لحشرة المن هذه حوالى ٥٠ جيلاً في السنة لأمكن تصور العدد الهائل الذى سينتج عن هذه الحشرات في العام الواحد إذا لم تتدخل العوامل الطبيعية والبيئية للحد من تكاثر هذه الحشرات .

كل هذه الصفات التى ذكرناها جعلت الحشرات أكثر الحيوانات صموداً أمام الانسان ، ومن هنا نشأ النضال الدائم بين الانسان والحشرات ، وسيظل هذا النضال قائماً طالما أن الحشرات والإنسان يشتركان في كثير من الإحتياجات التى أهمها المأوى والغذاء .

ثالثاً : أضرار ومنافع الحشرات

١ — أضرار الحشرات :

منذ ظهرت الحشرات على الأرض وهى مصدر متاعب للانسان . وقدما عندما كانت المخلوقات البشرية موزعة ومبعثرة في مجاميع صغيرة على أنحاء الأرض كان كل هم الانسان أن يعثر على غذائه اليومي وأن يتجنب غارات الحيوانات المفترسة ، ولذلك كانت الحشرات وما تسببه من مضايقات وأمراض قليلة الأهمية بالنسبة للعوامل البيئية المضادة الأخرى .

وبرق الإنسان عمد إلى تغيير الظروف البيئية المضادة لحياته إلى ظروف صالحة لبقائه وزيادة عدده ، فكان من نتيجة ذلك أن كل تغير إبتدعه الإنسان لصالحه جلب معه الشقاء لأنه أفاد أيضاً بعض الحشرات الضارة . وقد أدى إزدياد المجاميع البشرية إلى زيادة

أعداء الإنسان من الطفيليات الحشرية الضارة مثل القمل والبراغيث والبعوض والذباب وغيرها نتيجة لزيادة عوائلها ، وكان هذا سبباً في إنتشار الأوبئة وخاصة التى تنقل بواسطة الحشرات مثل التيفوس والطاعون والكوليرا والرمد ومرض النوم والحمى الصفراء والملاريا وكثير من الأمراض الفتاكة الأخرى .

ولما تكونت المدن الكبيرة تكررت حوادث اجتياحها بالأوبئة ، وهذا الشكل أصبحت الحشرات من أهم العوامل الضارة جدا بالصحة العامة ، كذلك أصبحت الحشرات عوامل ضارة بالنسبة للأغذية ، حيث أدى تخزين المواد الغذائية والحبوب إلى إصابتها بحشرات لم تكن مهمة إطلاقاً من قبل . ولقد أدى تخزين الغذاء والحبوب فى مخازن أو صوامع كبيرة إلى تجمع الحشرات لدرجة أنها أصبحت تتلف سنويا ملايين الأطنان من هذه الأغذية والحبوب بالرغم من الوسائل الكثيرة التى تتبع لمقاومة هذه الحشرات والوقاية منها .

وأدى تجمع الحيوانات عندما بدأ الانسان فى استئناسها للحصول على منتجاتها كاللحم واللبن والصوف والوبر وغيرها إلى ازدياد الحشرات المتطفلة عليها كأنواع القمل والبرغش وذبابة مسرى (التبان) وذبابة الاسطبلات وأنواع النغف وغيرها ، كما كانت الحشرات المذكورة سببا فى إصابة هذه الحيوانات المستأنسة بالأمراض مما أدى إلى ضياع جزء كبير من الثروة الحيوانية .

ولقد ساعد التوسع فى انتاج المحاصيل الزراعية بطريقة منظمة على ازدياد أعداد الحشرات ، لأن الزراعة المنظمة جعلت العوائل النباتية متجمعة مع بعضها البعض بكميات متوفرة ، وبذلك تمكنت الحشرات التى تتغذى على هذه النباتات من تكوين مجاميع Populations هائلة . كما أدى تطور وسائل الزراعة وتحسين المحاصيل واستنباط الأصناف الجديدة من النباتات بغرض زيادة الانتاج إلى جعل النباتات الجديدة أكثر اجتذابا للحشرات عن العوائل البرية التى كانت غالبا منيعة ضد الإصابة بهذه الحشرات ، وبذلك نشأت الحشرات المختلفة التى تضر بالمحاصيل الزراعية ، وكذلك الحشرات التى تنقل أمراضا نباتية كأمراض الفيرس والبكتريا والفطر وغيرها . هذا ولقد قدرت الخسائر السنوية فى المحاصيل الزراعية المتسببة عن الحشرات بالولايات المتحدة الأمريكية بنحو ١٠ ٪ (متكالف وفلنت ، ١٩٦٢) .

والتقدم الكبير فى وسائل النقل الحديثة بالبر والبحر والجو ساعد على انتشار الحشرات بدرجة كبيرة ونقلها إلى بيئات جديدة أكثر ملاءمة لها من بيئاتها الأصلية التى نشأت فيها والتى كان يفصل بينها وبين هذه البيئات الجديدة حواجز طبيعية كالجبال

وبالبحار والصحارى منعت وصولها إليها ، ولكن وسائل النقل الحديثة سهلت هذه العملية ، وبذلك نقلت الحشرات إلى بيئات ذات جو ربما قد يكون أكثر ملاءمة ، وغذاء ربما يكون أكثر توافرا ، وانعدمت في هذه البيئات الجديدة الأعداء الطبيعية الموجودة في البيئة الأصلية للحشرات والتي كانت تحد من تكاثرها .

٢ — منافع الحشرات :

وعلى الرغم من أن معظم الحشرات ضارة بالانسان والحيوان والنبات إلا أن هناك حشرات نافعة نذكرها فيما يلي :

(١) ديدان الحرير Silkworms :

عرف الصينيون تربية دودة الحرير المستأنسة — *Bombyx moder* (Order Lepidoptera, Fam. Bombycidae) منذ ٢٠٠٠ سنة، وتستهلك اليرقة الواحدة من يرقات دودة الحرير المذكورة من وقت فقسها من البيضة حتى تحولها إلى عذراء حوالى ٩٠ جراما من ورق التوت ، وتنتج الشرنقة الواحدة خيطا حريريا طوله ٨٠٠ — ١٢٠٠ ياردة ووزنه ٠,٤ — ٢ جم ، وينتج الرطل الواحد من الحرير الخام من نحو ٣٠٠٠ شرنقة . وإنتاج الحرير صناعة هامة ورئيسية في دول كثيرة كاليابان والصين وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا ، وتنتج هذه الدول حوالى ٥٠ — ٧٠ مليون رطل من الحرير الخام سنويا قيمتها نحو ٣٠ مليون جنيه مصرى أو ١٠٠٠ مليون ريال سعودى .

وتوجد أنواع أخرى من ديدان الحرير المستأنسة غير الدودة المعروفة *Bombyx mori* ومن نفس الجنس مثل *B. sinensis* ، *B. textor* ، ٣٠ نوعا آسيويا غير مستأنسة تابعة لرتبة حرشفية الأجنحة ولكنها كلها تابعة للعائلة *Saturniidae* ، وأهم هذه الأنواع غير المستأنسة هى الأنواع *Anthernea pernyi* (ويوجد فى الصين) ، *A. paphia* (ويوجد فى الهند) ، *A. yamamai* (ويوجد فى اليابان) ، *A. assamensis* (ويوجد فى أسام) . ومن ديدان الحرير غير المستأنسة والتابعة للعائلة *Saturniidae* ولكن أمكن استئناسها الآن لمحاولة استغلالها تجاريا الأنواع *Samia ricini* ، *Samia atlas* ، *cynthia* . هذا ولا زال النوع *Bombyx mori* يفوقها جميعها فى الانتاج .

(ب) نحلة العسل *Apis mellifera* :

تجمع شغالة العسل رحيق الأزهار لتصنع منه العسل Honey ، ولذا وجد أن على الشغالة الواحدة أن تقوم بحوالى ٤٠,٠٠٠ — ٨٠,٠٠٠ رحلة تزور خلالها أزهارا كثيرة كى تجمع رحيقا يكفى لصنع رطل واحد فقط من العسل ، علما بأن الرحلة الواحدة تبلغ

حوالى ١ — ١ ١/٢ من الأميال ، أى أنه على الشغالة الواحدة أن تطير مسافة تعادل ضعف محيط الكرة الأرضية لكى تجمع رحيقا يكفى لصنع رطل واحد من العسل . والعسل سائل سكرى يحتوى على نحوى ١٣ — ٢٠ ٪ ماء ، ٤٠ — ٥٠ ٪ سكر فركتوز ، ٣٢ — ٣٧ ٪ سكر جلوكوز ، ٢ ٪ سكر سكروز ، آثار من سكر المالتوز ، ١ — ١٢ ٪ دكسترين ، وأصماغ ، آثار من المعادن (بوتاسيوم ، فسفور ، كالسيوم ، مغنسيوم ، حديد وغيرها) وأحماض عضوية ، وفيتامينات ، وإنزيمات ، وحبيبات نباتية ، ومعلقات صلبة مثل حبوب اللقاح (الغنية بالبروتينات) ، وشمع نحل العسل .

وتفرز شغالة نحل العسل أيضا الشمع Beewax الذى يستعمل فى أغراض كثيرة نافعة مثل عمل براويز شمع نحل العسل وصابون الخلاقة والبويات والورنيش وغمادج الموديلات وأقلام الرصاص وبعض المنجات الكهربائية وغيرها ، ويفرز الشمع من غدد خاصة بطن الشغالة وذلك بعد أن تهضم الشغالة كمية من العسل مباشرة ، وينتج الرطل الواحد من شمع العسل بعد هضم الشغالات لكمية تتراوح بين ٣ — ٢٠ رطلا من العسل فى مدة ٢٤ ساعة .

(ج) الحشرة القشرية المفترزة لمادة الشيلاك :

تفرز الحشرة القشرية الصغيرة *Laccifer (Tacharida) iacca* مادة الشيلاك Shellac فوق جسمها للحماية ، وتوجد هذه الحشرة على أشجار الغابات بالهند وبورما ، وتستعمل مادة الشيلاك فى عمل البويات والورنيش وصناعة الأخشاب وتلميع المعادن وصناعة القبعات وعمل الشمع الأحمر وبعض الأحبار والمواد العازلة والأسطوانات واللينوليم الذى يستعمل فى تغطية أرضية الحجرات والزراير والقيشاني ولعب الأطفال والغمادج الصناعية للزهور والفاكهة والخضراوات . ويجمع من مادة الشيلاك سنويا نحو ٢٠ — ٤٥ مليون كيلو جرام ، ويحتاج الكيلو جرام الواحد من الشيلاك إلى نحو ٣٠٠,٠٠٠ حشرة قشرية لإفرازه ، وجدير بالذكر أن مادة الشيلاك واستعمالاتها قد عرفت منذ عام ١٥٩٠ م .

(د) الحشرات المنتجة للضوء الحى (أو الضوء بدون حرارة) :

بعض الكائنات الحية مثل الأوليات والجوفمعويات والرخويات (القواقع) والديدان الحلقية والقشريات والأسماك والطيور والبكتيريا والفطر وغيرها قادرة على إنتاج ضوء يشع منها .

ومن الحشرات تستطيع بعض الخنافس (الحشرات الكاملة) التابعة للعائلات *Cerambycidae, Elateridae, Phengodidae, Lampyridae* ، وكذلك يرقات

الذباب التابعة للجنس *Bolitophila* (عائلة *Mycetophilidae*) ، وكثير من أنواع حشرات الكولبولا أن تنتج هذا الضوء الحى . هذا وتستخدم تلك الحشرات المضيفة أحيانا لأغراض الزينة وفى الأضاءة الصناعية وفى أغراض التصوير .

(هـ) الحشرات المستخدمة فى مواد التجميل :

تستعمل أجسام بعض الحشرات مثل حشرة البق الدقيقى الحمراء اللون *Dectylopius coccus* التى تعيش على أشجار الكمثرى البرية *Opuntia coccinellifera* الموجودة فى هندوراس وجزر الكنارى والمكسيك وبيرو وأسبانيا والجزائر بعد تجفيفها وطحنها فى صنع أحمر الشفاه وفى عمل الألوان التى تدخل فى صناعة الحلويات وفى تلوين الأدوية والمشروبات كما تستعمل فى علاج السعال الديكى وبعض الأمراض العصبية . ويحتاج إنتاج الكيلوجرام الواحد من مسحوق أجسام الحشرات السالفة الذكر إلى نحو ١٥٠,٠٠٠ حشرة ، ويحتوى المسحوق الناتج على نحو ١٠ ٪ من حامض الكرمينيك النقى .

(و) الحشرات المستخدمة فى الأغراض الطبية :

لبعض الحشرات قيمة طبية كيرقات بعض أنواع الذباب ونحلة العسل والخنافس المعروفة باسم *Blister beetles* من عائلة *Meloidae* . ولقد أمكن شفاء بعض الجروح عندما وضع الأطباء عليها يرقات الذباب المعقمة ، كذلك أمكن عزل مادة معينة لها خاصية شفاء الجروح من إفرازات يرقات الذباب وقد سميت هذه المادة باسم *Allanton* ، وهى تحضر الآن صناعياً ومتداولة بالأسواق ، وإذا وضع محلونها العديم الرائحة واللون والطعم والذى لا يسبب أية آلام على الإطلاق على الحروق والقرح والجروح فإنه يعمل على شفائها (متكالف وفلنت ، ١٩٦٢) .

ويحتوى الدم والأجهزة الداخلية لخنافس الـ *Blister beetle* المسماة *Lytta vesicatoria* على مادة الكنتارادين *Cantharadine* التى تستعمل الآن فى علاج بعض أمراض الأجهزة البولية والتناسلية ، وتوجد هذه الحشرة بكثرة فى كل من أسبانيا وفرنسا . وخلال القرن التاسع عشر كانت أجسام نحلة العسل تنقع فى كحول الإيثايل لمدة شهر تقريبا (بمعدل ٢ أوقية من النحل لكل ١ لتر من الكحول) مع حفظها فى مكان دافئ ، وكان المنقوع الناتج يستخدم فى علاج بعض الأمراض مثل الدفتريا والحمى القرمزية والتهابات المثانة وجروح البشرة ، وحديثا أستعمل الغذاء الملكى لنحل العسل كمصدر للفيتامينات فى بعض مراهم التجميل .

(ز) استخدام الأورام النباتية الناتجة عن الحشرات :

من المعروف منذ القرن الخامس قبل الميلاد أن الأورام Galls الموجودة على أشجار الجوز التي تنمو في شرق أوروبا وغرب آسيا تحتوى على مواد تستخدم كمقويات وكمضادات لبعض السموم أو كمواد لصبغة الشعر والصوف والبشرة ، كما تستخدم مستخلصات أوراق أشجار الجوز بكثرة في الوقت الحاضر في صبغة الجلود .

وهناك أورام نباتية أخرى تستخدمها نساء الصومال للتجميل ، كما يستخدم الأتراك في الصبغة مواداً قرمزية اللون ناتجة عن أورام نباتية حمراء اللون موجودة على أشجار البلوط .

ويوجد حمض التنيك Tannic acid بكثرة (٣٠ — ٧٠ ٪) في كثير من الأورام النباتية . كما تستخدم أنواع عديدة من الأورام النباتية الآن في تجهيز الأحبار Inks الثابتة

(ح) تلقيح الحشرات للأزهار :

تلعب الحشرات دوراً هاماً في نقل حبوب اللقاح من متك زهرة إلى مياسم زهرة أخرى أثناء زيارتها للأزهار للتغذية على رحيقها ، ويؤدي هذا بطريقة غير مباشرة إلى تلقيح الأزهار فالإخصاب ثم تكوين البذور . ويطلق على الحشرة التي تقوم بنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى إسم الحشرة الملقحة Pollinator ، ومن أمثلة الحشرات الملقحة أنواع النحل البرى ونحل العسل .

ومن الأمثلة الحية على اعتماد النباتات في تلقيحها على الحشرات توقف جودة طعم التين الأزمرلى على وجود الدبور (Chalcididae) Blastophaga psenes الذى يقوم بعملية تلقيح الأزهار .

(ط) الحشرات كغذاء للإنسان :

وجد بالتحليل الكيماوى لإجسام اليرقات والحشرات الكاملة لبعض الحشرات أنها غنية بالمواد الغذائية . لذلك فهى تؤكل بواسطة الإنسان في كثير من بلدان العالم كما في المكسيك (حيث يؤكل بيض بعض الحشرات المائية الكبير الحجم) ، وجامايكا (حيث تؤكل صراصير الغيط) ، وأستراليا (حيث يأكل الوطنيون الأصلون فراشات الديدان القارضة Agrotis infusa) ، والهند (حيث يؤكل التل والنطاط والجراد ويرقات وعذارى النحل والفراشات وبعض الخنافس النافقة للأخشاب Wood borers) ، والجزائر وشبه الجزيرة العربية (حيث كان يؤكل الجراد) ، وكثير من الدول الأفريقية (حيث يؤكل التل الأبيض وبعض يرقات رتبة حرشفية الأجنحة) . وتؤكل

الحشرات المذكورة في البلاد السابقة إما طازجة أو مجففة أو مشوية أو مقلية (بودنهييمر ، ١٩٥١) .

ويأكل فلاحو العراق وتركيا وإيران المادة العسلية المعروفة باسم الندوة العسلية والمسماة أيضا باسم مانا Manna والتي يفرزها المن والحشرات القشرية . وذكر بودنهييمر وسفيرسكى (١٩٥٧) أن ما يباع بأسواق العراق من هذه المادة العسلية يقرب من حوالى ٣٥,٠٠٠ كيلو جرام سنويا .

(ي) الحشرات المفترسة والمتطفلة :

لا شك أن الفضل الأكبر لكبح جماح الحشرات الضارة وتقليل أضرارها يرجع إلى الحشرات المفترسة Predators والمتطفلة Parasites (كلاوسن ١٩٣٠ ، ١٩٣٩ ، ١٩٤٠) . وقد يتطفل على الطفيل الأصلي طفيل آخر ثانوى Secondary parasite ، وهذا الطفيل الثانوى قد يتطفل عليه طفيل ثالث Tertiary parasite . وتتبع أغلب الحشرات المتطفلة رتبة الذباب Order Diptera (عائلة Tachinidae) ، ورتبة غشائية الأجنحة Order Hymenoptera (عائلات Scelionidae ، Chalcididae ، Braconidae ، Ichneumonidae) .

(ك) الحشرات كوسيلة لمقاومة الحشائش :

يتوقف اعتبار حشرة ما ضارة أو نافعة على القيمة الاقتصادية للنبات أو الحيوان الذى يتغذى عليه ، ولذا فإن الحشرة التى تتغذى على الحشائش أو تهاجم الحيوانات الضارة تعتبر حشرة نافعة . ولقد طبقت حكومة استراليا استخدام الحشرات كوسيلة لمقاومة الحشائش عام ١٩١٣ عندما استوردت الحشرة المسماة Cactoblastis cactorum (رتبة حرشفية الأجنحة) من تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأورجواى والهند وسيلان وجنوب أفريقيا لمقاومة الانتشار الكثيف لنباتات التين الشوكى وبعض أنواع الصبار الأخرى في مساحات شاسعة من الأراضى (٢٠ — ٢٥ مليون هكتار) ، وقد استطاعت هذه الحشرة المستوردة أن توقف نمو الصبار ، وأن تقضى عليه تدريجيا . وفي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية استطاعت الحنفساء Chrysomela gamellata المستوردة من أوروبا أن توقف إنتشار حشيشة كلامات Klamath (Hypericum perforatum) التى كانت تهدد ملايين الهكتارات . وكقاعدة عامة يجب الحذر عند استعمال الحشرات كوسيلة لمقاومة الحشائش ، إذ من المحتمل أن تتأقلم هذه الحشرات التى تستخدم في مقاومة الحشائش وتهاجم محاصيل اقتصادية وبذلك تتحول إلى آفة .

(ل) الحشرات وبناء التربة الزراعية :

تلعب الحشرات دورا كبيرا في بناء التربة الزراعية ، فهي تفتت الحبيبات الكبيرة وترفعها إلى أعلى سطح التربة حيث تتعرض إلى فعل المياه والعوامل الجوية الأخرى . كما أن الأنفاق الكثيرة التي تصنعها الحشرات بالتربة تساعد على تعريتها وعلى سهولة حركة المياه الشعرية خلالها . وتحفر الحشرات في التربة إلى أعماق تصل إلى حوالى ٥ — ١٠ أقدام . كذلك تساعد الحشرات على إضافة المواد العضوية في التربة وذلك عن طريق برازها أو عن طريق تحلل أجسامها بعد موتها . وأهم الحشرات التي تعيش في التربة هى النحل البرى والنمل والزنايزير والخنافس ويرقات الذباب والديدان القارضة وعذارى الفراشات وحشرات السيكاكادا والحفار وصراصير الغيط والكوليبولا .

(م) الحشرات الرمية :

كثير من الحشرات تتغذى على المواد العضوية التالفة نباتية كانت أم حيوانية ، ويطلق على هذه الحشرات اسم الحشرات الرمية Saprophitic Insects ، ولمثل هذه الحشرات فائدتان ، أولهما استهلاك تلك المواد العضوية التالفة التى قد تكون سببا في انتشار بعض الأمراض ، وثانيهما تحويل تلك المواد التالفة إلى مواد عضوية نافعة لثوم النبات . ومن أمثلة هذه الحشرات الرمية النمل الأبيض ويرقات الكثير من أنواع الذباب ، واليرقات والحشرات الكاملة لبعض الخنافس .

(ن) الحشرات كهواية ومتعة نفسية :

تشجع الألوان الجميلة لكثير من الحشرات كـ بعض أنواع الفراشات وأبى دقيقات الهواه على عمل مجموعات حشرية خاصة لكل منهم . كما أن ألوان تلك الفراشات وأبى دقيقات قد لفتت أنظار الكثير من الفنانين ومرى الزهور إلى جمال وتناسق الألوان مع بعضها البعض . ولا يخفى علينا أن الكثير من الحلى والزخارف المعدنية تأخذ أشكال الحشرات . وعادة يتحلى أفراد بعض قبائل جنوب أفريقيا وأستراليا بقلادات مصنوعة من كرات تشبه القواقع يطلقون عليها « اللآلىء الأرضية » ، وهى عبارة عن إفرازات حوريات نوع معين من الحشرات القشرية

(ي) الحشرات وقيمتها العلمية :

كانت الحشرات سببا في أن يتفهم الانسان الكثير من المواضيع الخاصة بفسولوجيا جسم الانسان والحيوان ومشاكل علوم الاجتماع وعلم النفس ، كذلك تستخدم الحشرات في الكثير من الأبحاث العلمية للكشف عن أسرار العلوم والحياة ، فهى مادة اختبار

لصلاحيه مياه صرف المصانع ، وذبابه الدروسوفيلا مثلا *Drosophila melanogaster* تستخدم على نطاق واسع في الدراسات الوراثية ودراسة الخلية ، استخدمت أيضا حشرات الحبوب المخزونة كإداة لدراسة الكثير من نواحي علم التغذية ، كما أفاد استخدام يرقات البعوض والذباب في الدراسات التي تجرى على الأثر المتبقى *Residual effect* للمبيدات الحشرية على الفواكه والخضروات .

رابعاً : موقع الحشرات في المملكة الحيوانية

تنقسم المملكة الحيوانية *Animal Kingdom* إلى عدة قبائل *Phyla* مختلفة هي :


Phylum Protozoa	١ — قبيلة الحيوانات الأولية
Phylum Porifera	٢ — قبيلة الأسفنجيات
Phylum Coelenterata	٣ — قبيلة الجوفمعوينات
Phylum Plathyhelminthes	٤ — قبيلة الديدان المفلطحة (المفلطحات)
Phylum Nemathelminthes	٥ — قبيلة الديدان الأسطوانية (الأسطوانيات)
Phylum Annelida	٦ — قبيلة الديدان الحلقية (الحلقيات)
Phylum Echinodermata	٧ — قبيلة الجلد شوكيات
Phylum Mollusca	٨ — قبيلة الرخويات
Phylum Arthropoda	٩ — قبيلة مفصليات الأرجل
Phylum Chordata	١٠ — قبيلة الحبلليات

وتنقسم قبيلة مفصليات الأرجل *Phylum Arthropoda* إلى عدة صفوف

Classes هي :

١ — صف الأنيكوفورا : *Class Onychophora*

حيوانات هذا الصف (شكل ١١) دودية الشكل وحلقات الجسم فيها واضحة ، وتحمل كل حلقة من حلقات الجسم . ما عدا الحلقتين الأولى والأخيرة . زوجا من الأرجل الغير مقسمة ، وتحمل الحلقة الأولى زوجا من قرون الأستشعار وزوجا من الحلمات توجد حول الفم . وفتحة الفم ذات حافة لحمية يتصل بها زوج من الفكوك الشيتينية . وحيوانات هذا الصف الكثير من مميزات أفراد قبيلة الديدان الحلقية *Phylum Annelida* . وتتغذى حيوانات صف الأنيكوفورا على المواد العضوية المتحللة في التربة ، وتنتشر في المناطق المظلمة الرطبة في البيئات الأستوائية ونصف الأستوائية . ويضم صف الأنيكوفورا جنسا واحدا فقط هو جنس *Peripatus* .



شكل (١): (أ) حيوان من جنس بيرباتس *Peripatus*.
(ب) جبري المياه العذبة.

٢ - صف التريلوبيتا : Class Trilobita

يضم هذا الصف (شكل ٢ ب) عددا من أنواع الحيوانات البحرية التي كانت منتشرة بكثرة في أوائل عصر الباليوزويك Paleozoic والتي انقرضت بانتهاء هذا العصر . وقد كانت أجسام حيوانات صف التريلوبيتا مفلطحة ومقسمة إلى رأس مغطاة بقصعة Carapace وصدر وبتن ، ويمتد على طول جسمها إثنان يقسمانه إلى ثلاثة فصوص . وكانت الرأس تتكون من فص يقع أمام الفم Prostomium وتحمل زوجا من قرون الاستشعار الطويلة المقسمة وعيونا واضحة ، وبلى هذا الفص عدة حلقات تحمل كل من الأربع حلقات الأولى منها زوجا من الزوائد ثنائية التفرع أما باقي الحلقات فقد كانت كل من منها تحمل زوجا من الزوائد المتفرعة المشابهة لزوائد الرأس ، والحلقة الأخيرة المسماة بالتلسن Telson كانت بدون زوائد . وفي بعض الأنواع كانت كل زوائد الجسم متشابهة ، وربما كان ذلك دليلا على أن زوائد الجسم كلها معدة للحركة ولكن في أنواع

أخرى كانت زوائد الرأس كانت وظيفتها المساعدة على دفع الطعام داخل الفم بينما وظيفة باقى زوائد الجسم كانت للحركة . والمعتقد أن حيوانات صف الترايلوبيتا كانت تتغذى على حيوانات أخرى دنيئة وعلى بقايا المواد الميتة المتحللة وعلى البلاكتونات Planktons .

٣ - صف القشريات : Class Crustacea



يتبع هذا الصف حيوانات ذات أشكال كثيرة متعددة تختلف فيما بينها لدرجة يصعب منها إعطاء صفات عامة ثابتة تنطبق عليها جميعا . وتتلخص الصفات العامة لأفراد هذا الصف فى أن الجسم مقسم إلى رأس وصدر وبطن ، والرأس لها زوجان من قرون الاستشعار وزوجا من الفكوك العليا وزوجان من الفكوك السفلى ، ويتكون الصدر عادة من ٤ إلى ٢٠ حلقة واضحة ، ويتصل بكل حلقة منها زوج من الزوائد المفصليّة . وتتكون البطن من حلقة واحدة أو أكثر على كل منها زوائد كثيرة ، وقد لا توجد زوائد على البطن بالمرّة . وفى الأفراد المتطفلة التابعة لهذا الصف يكون عدد حلقات وزوائد الجسم أقل منه فى الأفراد الغير متطفلة . ولبعض الأنواع قصعة سميكة تغطى أغلب الجسم ، كما أن البعض الآخر له صدفة ذات صمامين . ويشبه صف القشريات صف الحشرات فى تعدد أشكاله وتنوعها ، كما يشبهها أيضا فى أن بعض أنواعها أطوار نمو متعاقبة للفرد الواحد ، فمثلا الجمبرى يمر بأربعة أطوار غير كاملة مختلفة كلية عن بعضها البعض قبل أن يصل إلى طوره الكامل (شكل ١ ب) .

٤ - صف العنكبوتيات : Class Arachnia


يتبع هذا الصف العناكب العادية (شكل ٣) والعناكب ذات الأرجل الطويلة (شكل ٢ جـ) والعقارب الحقيقية (شكل ١٤ ، ب) والعقارب الكاذبة (شكل ٤ جـ) والقراد والحلم (شكل ٥) . وتتميز أفراد صف العنكبوتيات بالتحام الحلقات الأمامية من الجسم لتكوين رأس صدرى Cephalothorax تحمل عادة ستة أو ثمانية أزواج من الزوائد المفصليّة التى تتحول الزوائد الأمامية منها لتكون أجزاء الفم . كذلك يتحول الزوج من الزوائد الذى يقابل الزوج الأول من قرون الاستشعار فى القشريات إلى زوج من الملاقط Pincers ، أما زوج الزوائد الذى يقابل الزوج الثانى من قرون الاستشعار فى القشريات فيضمحل . والزوائد البطنية ان وجدت تكون متحورة للعوام .

٥ - صف البنتاستوميدا : Class Pentastomida

وهى حيوانات تتطفل داخل غيرها من الحيوانات الفقريّة ، والحيوان البالغ دودى الشكل فى حين أن طوره الغير بالغ له أربعة أرجل ويشبه الحلم .



- شكل (٢) : (أ) حيوان بوروبودا.
 (ب) حيوان من صف الترايلوبيتا.
 (ج) عنكبوت ذو أرجل طويلة.
 (د) حيوان من صف السمفيليا.



شكل (٣) : العنكبوت : (أ) منظر سفلى .
(ب) منظر علوى .



٦ - صف التاردجرا دا : Class Tardigrada

ويطلق على حيوانات هذا الصف دب الماء ، وهى حيوانات صغيرة جدا لا تزيد عن ١ ملم فى الطول تعيش فى التربة الرطبة وفى الماء العذب والمالح ، وللمجسم أربعة أزواج من الأرجل التى تنتهى بمخالب ، ولا تحمل الرأس أية أجزاء فم أو زوائد أخرى (شكل ٦ ج) .


٧ - صف الدبلوبودا (ذوات الألف رجل) : Class Diplopoda

يخوى هذا الصف مجموعة الديدان المسماة بذوات الألف رجل Millipedes ، تلتحم حلقات الجسم فى أزواج أى أن كل حلقتين داخليتين تبدوان من الخارج وكأنهما حلقة واحدة ، وعلى ذلك فكل حلقة ظاهرة تحمل زوجين من الأرجل . وتتكون أجزاء الفم من زوجين من الزوائد ، الأولى منهما عبارة عن زوج من الفكوك العليا يقارب فى شكله الفكوك العليا للحشرات ، والزوج الثانى مفلطح وملتحم ويشبه فى شكله العام الشفة السفلى للحشرات ويسمى Gnathochilarium ، وتفتح الأجهزة التناسلية خلف الزوج الثانى من الأرجل (شكل ٦ ب) .

تعيش حيوانات هذا الصف في الأحشاب المتعفنة وبين الأوراق المتساقطة وفي الأماكن الرطبة وقليل منها يتغذى على النباتات الحية الغضة .



- شكل (٤) : (أ) العقرب الحقيقي (منظر علوي).
 (ب) العقرب الحقيقي (منظر سفلي)
 (ج) العقرب الكاذب (منظر علوي).



شكل (٥): (أ) حلم الجذب

(ب) القراد الجامد

٨ - صف البوروبودا : Class Pauropoda

يحتوي هذا الصف أجناسا قليلة ، وحيواناته دقيقة تشبه حيوانات ذوات المائة رجل . ويتكون الجسم من ١٢ حلقة منها ٩ حلقات تحمل كل منها زوجين من الأرجل بينها




مسافة ، بينما لا تحمل الثلاث الباقية أرجلا . وتلتحم كل حلقتين من حلقات الجسم في حلقة واحدة من الناحية الظهرية فقط ، ويغطي الحلقتين الملتحمتين في هذه الحالة من أعلى صفيحة واحدة . وأهم ما يميز أفراد هذا الصف عن غيره من صفوف مفصليات الأرجل أن قرون الاستشعار متفرعة إلى فرعين . العيون على شكل بقعة صغيرة ، وأجزاء الفم مكونة من زوجين من الفكوك وشفه سفلى معقدة التركيب . وتتشابه حيوانات صف البوروبودا مع حيوانات صف الديلوبودا في أن أجهزة التناسل تفتح في الجزء الأمامي من الجسم بين الزوج الثاني من الأرجل تقريبا (شكل ١٢) .

٩ — صف الشيلوبودا (ذوات المائة رجل) : Class Chilopoda

يتبع هذا الصف حيوانات ذوات المائة رجل ، وهي حيوانات مستطيلة يتكون جسمها من عدة حلقات تحمل كل منها زوجا من الأرجل . وتحمل الرأس زوجا واحدا من قرون الاستشعار الطويلة . الأعين مركبة وقد تتكون العين من عوينه Facet واحدة فقط . تتكون أجزاء الفم من ثلاثة أزواج من الزوائد هي زوج من الفكوك العليا ، وزوج ملتحم من الفكوك السفلى يشبه الشفة السفلى في الشحرات ، أما الزوج الثالث فيشبه الرجل وقد تلتحم قاعدته . وتشبه زوائد الحلقة الأولى من حلقات الجسم المخلب وتفرز إفرازا سناما وتوجد أسفل الرأس مما يجعل البعض يعتقد أن هذا الزوج من ضمن أجزاء الفم . وحيوانات هذا الصف مفترسة وأغلبها ليلي يختبئ أثناء النهار بين الأوراق وفي شقوق الأشجار النالفة أو في شقوق التربة . ونادرا ما يزيد طول هذه الحيوانات عن ٣,٥ — ٤ سم في المناطق المعتدلة ، أما في المناطق الاستوائية فقد يبلغ طولها ٢٥ — ٣٠ سم (شكل ١٦) .

١٠ — صف السمفيليا : Class Symphyla

تبلغ حيوانات هذا الصف حوالى ١/٤ بوصة في الطول ، وتشبه في شكلها العام حيوانات صف ذوات المائة رجل . ويعتبر صف السمفيليا أقرب صفوف قبيلة مفصليات الأرجل إلى صف الحشرات . الرأس تشبه رأس الحشرات في كثير من الصفات ، فيوجد بها درز جمجمي وقرن استشعار طويل وأجزاء فم مكونة من فكين علويين وفكين سفليين وشفه سفلى . ويتكون الجذع من حوالى ٢٥ حلقة لا يلتحم أى منها في أزواج ، ولا توجد الأرجل إلا على ١١ أو ١٢ حلقة منها فقط (شكل ٢ د) .



شكل (٦) : (أ) حيوان من ذوات المائة رجل .
 (ب) حيوان من ذوات الألف رجل .
 (ج) حيوان من صف تاردigrada .

١١ — صف الحشرات : Class Insecta


تتميز الحشرات (شكل ٧) عن غيرها من مفصليات الأرجل بما يأتي :
 (أ) الجسم مقسم إلى ٣ مناطق واضحة هي الرأس والصدر والبطن ، وتكون كل منطقة من هذه المناطق من عدة حلقات قد تندمج معا أثناء التكوين الجنيني كما في الرأس (٦ حلقات مندجمة) ، أو تبقى واضحة كما في الصدر (٣ حلقات) والبطن (١١ حلقة) .

-

خامسا : تطور نشوء جسم الحشرة من حيوان أولى دودي - الشكل :

५८

تسمى Prostomium ، وتقع فتحة الفم على الجهة السفلية بين الرأس والحلقة الأولى من حلقات الجسم . ومن الرسومات (ب — هـ) الموضحة في (شكل ٨) يمكننا تتبع كيفية نشوء جسم الحشرات من جسم الحيوان الدودي الأول ، وكانت أول خطوة هامة في هذا التطور هو نشوء زوج من الزوائد على كل حلقة وكانت هذه الزوائد غير مقسمة إلى حلقات ، ثم قسمت الزوائد إلى حلقات ونشأت على الرأس قرون استشعار وأعين . وبدأ بعد ذلك تحور زوائد حلقات الجسم ٢ — ٤ إلى أجزاء فم ، أما زوائد الحلقة الأولى فاضمحللت ، وأصبحت زوائد الحلقة الثانية هي الفكوك العليا والثالثة الفك السفلى والرابعة الفك السفلى الثاني (أو الشفة السفلى) ، واندججت الحلقات المذكورة (١ — ٤) مع الرأس . والخطوة التي تلت ذلك هي نمو زوائد الحلقات ٥ — ٧ إلى زوائد للحركة وأطلق على الحلقات الثلاثة المذكورة اسم الصدر وما يليها من حلقات إسم البطن التي احتوت على معظم الأحشاء الداخلية ، وفي نفس الوقت تلاشت زوائد البطن فيما عدا زوائد الحلقات الأخيرة التي كونت آلة وضع البيض في الأنثى وضالة السفاد في الذكر والقرون الشرجية في كلا الجنسين .



شكل (٨) : شكل يوضح تطور جسم الحشرة من حيوان دودي الشكل.

الباب الثاني

الغلاف الخارجى (جدار جسم الحشرة) The Integument (Body - wall or Exoskeleton)

يعمل جدار الجسم فى الحشرات كهيكل خارجى ، وهو يقابل الهيكل الداخلى (أى العظام) فى الفقريات . ويتكون جدار الجسم من صفائح شيتينية Sclerites سميكة ومتينة تعمل على حماية الأجهزة الداخلية للجسم ، كما تنهىء مكانا مناسباً لاتصال العضلات التى تعطى للجسم تماسكه وقوته . وقد يكون لجدار الجسم مرونة بسيطة ، ولكنه لا يكون قابلاً للمط إلا بعد الانسلاخ مباشرة ، ولا تستمر هذه القابلية للمط إلا بعد الإنسلاخ مباشرة ، ولا تستمر هذه القابلية للمط إلا لفترة وجيزة .

وتوجد بين الصفائح الشيتينية السميكة المكونة لجدار الجسم أغشية رقيقة مرنة Thin membranes ، وهذه الأغشية أهمية كبيرة فى تسهيل حركة زوائد الجسم المختلفة والمساعدة على تمدد أو إنشاء الجسم نفسه ، إذ لو كان جدار الجسم كله صلباً لما تمكنت الحشرة من الحركة أو الزيادة فى الحجم عند امتلاء بطنها بالبيض أو بالطعام . فعندما تكون بطن الحشرة غير منتفخة يكون مقطعها العرضى ضيقاً ومطاولاً ، ولكن عند امتلاء البطن يصبح المقطع العرضى مستديراً تقريباً .

وأهم أنواع الأغشية المرنة التى تصل بين صفائح جدار الجسم تلك الأغشية التى تصل بين الصفيحتين العلوية المسماة بالترجة (Tergum) والسفلية المسماة بالاسترنة (Sternum) فى كل حلقة من حلقات الجسم ، وتعرف هذه الأغشية باسم البلورا (Pleura ومفرداها Pleuron) وتمتد على الجانبين بين ترجة واسترنة كل حلقة .

وهناك نوع آخر من الأغشية الرقيقة يعرف بالغشاء بين الحلقات Intersegmental membrane يصل بين ترجة أو استرنة كل حلقة وترجة أو استرنة الحلقة التى تسبقها

أو التي تليها وبذلك يمكن حلقات الجسم أن تتحرك حركة تلسكوبية بحيث تنطبق فوق بعضها عند انكماش هذه الأغشية بين الحلقات ، أو تفصل الحلقات عن بعضها لأقصى طول الأغشية عند انبساط الأغشية بين الحلقات .

صفائح ونموات جدار الجسم

١ - الصفائح : The Sclerites

تفصل الصفائح الرئيسية لجدار الجسم عن بعضها البعض بمساحات أو خطوط من الأغشية الضعيفة أو الانثناءات Furrows . وقد تنقسم الصفيحة الكبيرة إلى عدة صفائح أصغر بواسطة إنثناءات أو خطوط جديدة من هذه الأغشية الضعيفة ، كما قد تلتحم الصفائح ببعضها وفي هذه الحالة لا بد من وجود خط واضح أو حز Furrow على طول خط الالتحام . وتعرف الخطوط أو الانثناءات الناتجة عن التحام صفيحتين بالدروز Sutures . وبصفة عامة يطلق لفظ صفيحة على كل مساحة شيتينية صلبة محاطة بأى نوع من أنواع الدروز .


٢ - النموات الخارجية :

يحمل سطح جدار جسم الحشرة عادة أنواعا كثيرة جدا من النموات التي تظهر على صورة تجمعات أو تغلطات دقيقة في الكيوتيكل (شكل ٩ ، ١٠) أو أشواك تنتج من خلايا الهيبودرمس إلى الخارج أو نتوءات أو شعيرات أو حراشيف . أما عن الشعيرات ووظيفتها حسية بالطبع (أنظر فيما بعد أعضاء الحس في الحشرات) فهي تقسم حسب تركيبها إلى :

(أ) شعيرة متحركة مرتفعة عن مستوى الأبيكيوتيكل وتسمى Sensillum trichode (شكل ١١ أ) وتتحرك بحرية تامة على غشاء قاعدى متصل بالتجويف الذى ينشأ فى وسطه الشعيرة ، وإما أن تكون الشعيرة شوكية فتسمى Sensillum chaetica وهى غالبا للمس وليس حساسيتها كيميائية لتغلظ جدرانها (شكل ١١ ب) ، وإذا كانت الشعيرة قصيرة كالنتوء أو كالمخروط Peg - like (شكل ١١ جـ) فتسمى Sensillum basiconica


(ب) قد توجد الشعيرة منخفضة عن مستوى الأبيكيوتيكل وهذه إما أن تكون على شكل نتوء أو مخروط تحت مستوى جدار الجسم (شكل ١١ د ، هـ) وتسمى

(ج) الأجسام الجرسية وتتميز بأن الكيوتيكل يأخذ شكل القبة الصغيرة ويمتد في هذا النتوء العصب مثل محرك الجرس وتسمى هذه الأجسام Sensillum campaniformia (شكل ١١ و) .



40


(د) الأجسام الطبقية Plate organs وتسمى Sensillum placodea وتبدو من الخارج كأغشية رقيقة من الكيوتيكل أهليلجية أو بيضاوية أو متطاولة الشكل (شكل ١١ ز) وتشبه من الداخل الشعيرة . أو لها عدة خلايا حسية متصلة بها ، وتوجد هذه الأجسام الطبقية على قرون استشعار رتب متجانسة الأجنحة Homoptera وغمدية الأجنحة Coleoptera وغشائية الأجنحة Hymenoptera .



شكل (١٠) : الثورات المختلفة التي يحملها سطح جدار الجسم في الحشرة.

٣ - الثموات الداخلية :

تتكون هذه الثموات الداخلية التي تعرف باسم Apodemes نتيجة انبعاج جدار الجسم إلى الداخل وفائدتها أنها تعمل كنقطة إتصال داخلي للعضلات ، وتظهر أماكن حدوث هذه الانبعاجات على السطح الخارجى لجدار الجسم على هيئة نقر Pits ، وأماكن هذه النقر ثابتة فى جميع الحشرات ، ولذلك فهي هامة جدا فى تحديد اسماء الصفائح المحيط بها .



شكل (١١) : أشكال مختلفة للشعيرات الموجودة على جدار جسم الحشرة

تركيب جدار الجسم

يختلف سمك جدار الجسم في الحشرات باختلاف الحشرة ، فهو يتراوح بين أقل من ميكرون وبضعة ملليمترات ، كما قد يختلف السمك أيضا من منطقة إلى أخرى في الحشرة . وعادة يكون جدار الجسم أرفع ما يمكن فوق مراكز الحس الكيماوية Chemoreceptors والقصبية الهوائية Tracheoles وقد يكون لجدار الجسم في حيوانات مفصليات الأرجل القدرة على الثام بعض الجروح الطفيفة .


ويتكون جدار جسم الحشرة (شكل ٩ ، ١٢) من ثلاث مناطق رئيسية هي الكيوتيكل Cuticle ، وتحتة الهيودرمس Hypodermis ، ثم الغشاء القاعدى Basement membrane .

١ — الكيوتيكل : ويفرز بواسطة خلايا الهيودرمس ويتكون من مادة شديدة الثبات ناتجة عن اتحاد الشيتين (الذى يكون ٢٥ — ٦٠ ٪ من الوزن الجاف للكيوتيكل) مع البروتين بنسب معينة . ويمكن هضم الكيوتيكل ببعض الانزيمات الخاصة . والشيتين ما هو إلا مركب عديد السكريات يسمى : Polyacetylglucosamine مشابه للسليولوز (شكل ١٣) . أما عن تركيب البروتين الذى يدخل في تركيب جدار الجسم فهو مكون من شقين ، أولهما بروتينات تذوب في الماء ولقد سميت باسم ارثروبودين Arthropodin ، وثانيهما بروتينات لا تذوب في الماء وسميت باسم اسكليروتين Sclerotin ، ويحتوى الأثرروبودين على نسبة عالية من مادة التيروسين Tyrosine ونسبة قليلة من مادة الجليسين Glycine ولا يحتوى على أى نوع من البروتينات التى تحتوى على الكبريت . ويعتبر الأثرروبودين قريب الشبه جدا من سريسين Sericin الحرير ، ويتحول الأثرروبودين عند دبغه (Tanned) إلى الاسكليروتين . وينقسم الكيوتيكل بدوره إلى ثلاث مناطق هي :

(١) الايكيوتيكل : The Epicuticle

وهو طبقة رقيقة جدا يبلغ سمكها ١ — ٢ ميكرون أو أقل ومكونة في حشرة الردينس Rhodnius sp. وحشرة خنفساء الجريش Tenebrio sp. من أربعة مناطق (شكل ٩ ب) ، العلوية منها طبقة أسمنتية Cement layer وهى طبقة بروتينية دهنية غير منفذة للماء وتبلغ في السمك ١,٠ ميكرون ، يليها طبقة شمعية Wax layer تختلف درجة ذوبانها من حشرة لأخرى ، ثم طبقة البوليفينول Polyphenol layer ، ثم طبقة

الكيوتيكيولين Cuticulin وهي طبقة من البروتين الدهنى المدبوغ وربما المسئول عن إفرازها الخلايا النسيجية (خلايا الأنوسايتس Oenocytes) .



شكل (١٢) : مناطق جدار جسم الحشرة.

(ب) البروكيوتيكل : The Procuticle

ويوجد أسفل الأبيكيوتيكل ويتكون بدوره من طبقتين ، العلوية منهما وتسمى اكسوكيوتيكل Exocuticle أعمق من الطبقة السفلية المسماة الاندوكيوتيكل وهي عادة أكبر بكثير في السمك من طبقة الاكسوكيوتيكل . وتظهر في طبقة الاندوكيوتيكل فقط طبقات عرضية فاتحة متبادلة مع أخرى داكنة ، ويبلغ سمك الطبقة العرضية الواحدة من ٠,٢ إلى ١٠ ميكرون ، وهذه الطبقات رغم اختلاف لونها فهي متشابهة في التركيب الكيماوى ويمكن فصلها عن بعضها البعض ، ويقال أن الطبقة الداكنة تحتوى على نسبة

من بروتين أقل ما تحتويه الطبقة الفاتحة . ويتخلل منطقة البروكيوتيكل قنوات طويلة هي القنوات المسامية Pore canals وهي قنوات ضيقة جدا لا يزيد قطرها عن ١ ميكرون ، وقد تخترق هذه القنوات المسامية أيضا الجزء السفلى من منطقة الايكيوتيكل ، هذا ويوجد في المليمتر المربع الواحد عدة آلاف منها . والقناة المسامية (شكل ١٢) ذات شكل حلزوني Hellically coiled ، وفي بعض الحشرات نجد أن النهاية الطرفية العلوية لكل قناة مسامية متفرعة تفرعا شجريا . والقناة المسامية ما هي إلا خيط مجوف يخرج من السطح العلوى لخلية الهيبودرمس فائدها توصيل مادة أو أكثر من المواد المكونة للايكيوتيكل وكذلك المواد المكونة للمناطق العليا من البروكيوتيكل ، كما ينتقل خلالها أيضا إنزيمات الأكسدة ومواد الشام الجروح ومواد الفينول والمواد البروتينية اللازمة لتصلب جدار جسم الحشرة ، كما وجد أنها عامل هام في انتقال الماء من الخارج إلى داخل الجسم . وقد تبقى القناة المسامية (أو الخيط الخلولى المجوف) مفتوحة باستمرار أو قد تسد فيما بعد بالشيتين (كيتين) . وعندما تكون القناة المسامية مفتوحة (أى غير مسدودة) يكون بها دائما خيط سيتوبلازمى قد يسحب منها أو قد يضمحل فى أى وقت من الأوقات ، ولا تمتلئ القناة المسامية مطلقا بالهواء ، ودائما يكون سطح جدارها الداخلى مبللا Wettable .

٢ — الهيبودرمس : The Hypodermis

ويتكون فى أغلب مناطق جدار جسم الحشرة من طبقة واحدة من الخلايا التى يصعب تمييز الفواصل (الجدر) بينها فى أغلب الأحيان . وخلايا الهيبودرمس هى التى تفرز الكيوتيكل ، كما أنها تفرز سائل الانسلاخ الذى يفصل جدار جسم الحشرة القديم ، كما تفرز خلايا الهيبودرمس أيضا إفرازات تساعد على الشام الجروح . وتتحور بعض خلايا الهيبودرمس إلى أعضاء حس Sense organs أو غدد Glands أو خلايا خاصة لتكوين الشعيرات الحسية Sensillae الموجودة على جدار جسم الحشرة الخارجى وهى الخلايا المسماة Trichogen^١ و Tormogen^٢ ، وفى بعض الحالات تشاهد بللورات اليوريا فى خلايا الهيبودرمس دلالة على قيامها فى مثل هذه الحالة بوظيفة اخراجية .

٣ — الغشاء القاعدى : The Basement membrane

وهو غشاء خلايا الهيبودرمس عن فراغ جسم الحشرة، وتصل به عضلات الجسم . ولذا يكون مستمرا ومتصلا مع الاغشية المغلفة لهذه العضلات والمسماة بالساركولما Sarcolemma ، وتنتهى عنده (أو قد تخترقه) القصيبات الهوائية Tracheoles ، ومنشأ الغشاء القاعدى غير مؤكد حتى الآن ولكن يعتقد أنه ينشأ من خلايا دموية .

الانسلاخ

Moulting or Ecdysis

تكبر اليرقة أو الحورية عند تغذيتها فتتمو فيضيق جدار جسمها تبعا لذلك لأن الشيتين المغطى لجدار الجسم يمنع الأزدیاد فى الحجم فتضطر اليرقة أو الحورية لتغیر جدار جسمها بآخر أوسع منه يتكون أسفل الجدار الأول القديم الذى يطلق عليه الجدار المنسلخ *Exuvium* . وقد تغير اليرقة أو الحورية جدار جسمها مرتين أو ثلاث أربع مرات أو أكثر ، وتبلغ عدد مرات الانسلاخ هذه من ٣ — ٩ مرات فى يرقات رتبة حرشفیه الأجنحة . ويطلق على عملية تغير اليرقة أو الحورية لجدار جسمها القديم بجدار جديد أسفله وأوسع منه بعملية الانسلاخ *Moulting or Ecdysis* .

وعندما تريد اليرقة أو الحورية التخلص من جدار الجسم القديم الصغير لتستبدله بآخر جديد أوسع منه تسكن فترة من الزمن تسمى فترة الانسلاخ تمتنع فيها اليرقة أو الحورية عن الغذاء وتبدأ خطوات عملية الانسلاخ كالآتى (شكل ١٤) :

١ — تبدأ طبقة الهيودرمس نشاطها فتستطيل خلاياها كثيرا وتنفصل عن طبقة الاندوكيوتيكل الموجودة فوقها ويمتلئ مكان الانفصال بسائل يسمى سائل الانسلاخ *Moulting fluid* الذى تفرزه غدد خاصة تسمى غدد الانسلاخ موجودة بين خلايا الهيودرمس .

٢ — تبدأ خلايا الهيودرمس بعد ذلك فى إفراز طبقات الكيوتيكل الجديد الثلاث ولكنها تفرز أولا طبقة الایکيوتيکل ثم تحته بعد ذلك طبقة الاکسوكيوتيکل وأخيرا طبقة الاندوكيوتيکل .

٣ — وفى أثناء تكوين طبقات الكيوتيكل الجديد الثلاث وانفصال الكيوتيكل القديم عن الجديد يقوم سائل الانسلاخ الذى يفصل الكيوتيكل القديم عن الجديد بوظيفتين أساسيتين هما :

(١) إذابة اكسو واندو كيوتيكل جدار الجسم القديم بفعل انزيمين يحتوى عليهما هما إنزيمى الكيتينيز *Chitinase* الذى يؤثر على مادة الشيتين والبروتين *Protease* الذى يؤثر على مادة البروتين ، ولا يؤثر إنزيم الانسلاخ على طبقة الایکيوتيکل الجديد وذلك لاحتواء هذا الایکيوتيکل على مواد الشيتين والبروتين والاسكلوروتين مختلطة مع بعضها البعض بطريقة لا تمكن إنزيمى الانسلاخ من التأثير عليها . أما عن طبقة


الاندوكيوتيكل فلا تحتوى على مادة الاسكلوروتين ، وعلى ذلك فان إنزيمى
سائل الانسلاخ يؤثران عليها بدرجة كبيرة ويذيان جزءا كبيرا منها قد
يصل إلى حوالى ٨٦ ٪ من وزن جدار جسم الحشرة القديم .

(ب) ترطيب طبقة الاندوكيوتيكل القديم ويساعد هذا على انفصال جدار الجسم
القديم عن الجدار الجديد .


وعندما يتم فعل إنزيمى الانسلاخ على طبقة الاندوكيوتيكل القديم يحمل سائل
الانسلاخ الجزء المذاب أو المهضوم من هذه الطبقة إلى داخل الجسم عن طريق الانتشار
خلال جدار الجسم الجديد المتكون حديثا أو عن طريق ابتلاع طبقة الاندوكيوتيكل
المهضومة هذه عن طريق الفم . ويقال أن هذه المواد المهضومة تستعمل مرة أخرى في
تكوين طبقات جدار الجسم الجديد .

٤ — يوجد على السطح العلوى لليرقات والحوريات خط وسطى طولى ضعيف في
منطقة الصدر (لا يوجد في تركيب الكيوتيكل في مكان وجود هذا الخط طبقة
الاكسوكيوتيكل) ينشق عنده جدار الجسم القديم ، كما تنشق أيضا صفيحة الرأس عند
الدرز الجمجمى ، ويحدث انشقاق الجدار القديم بواسطة تقلصات عضلات الجسم
(وخاصة عضلات منطقة الصدر) التى تزيد من ضغط الدم وبخاصة في منطقة الصدر
وبمساعدة القناة الهضمية التى تمتلئ بالهواء وبطبيعة الحال بمساعدة التأثير الكيماوى
لسائل الانسلاخ أيضا . وفى الحشرات المائية ينكسر الكيوتيكل القديم بشق الصدر
عندما تبتلع اليرقات الماء أو الهواء الذى يتسبب عنه ازدياد حجم هذه اليرقات كثيرا
فيريد تبعا لذلك الضغط على جدار الجسم القديم خاصة في منطقة الصدر .

٥ — وعندما تريد اليرقة أو الحورية (أو الحشرة الكاملة عند خروجها من العذراء)
أن تتخلص من جدار جسمها القديم فعليها أن تخرج أولا صدرها عن طريق الشق المذكور
سابقا ثم تسحب نفسها إلى الخلف قليلا حتى تخرج الرأس من الشق ثم بعد ذلك
يستمر خروج الرأس والصدر من جدار جسمها القديم وتسحب معها زوائدها وأطرافها
ثم تخرج البطن بعد ذلك ، وعندئذ يتم خروج اليرقة أو الحورية أو الحشرة الكاملة تاركة
وراءها جدار الجسم القديم الذى يأخذ شكل الطور الذى نزرع منه تماما . وبمجرد انتهاء
تخلص الطور الحشرى المنسلخ من جدار جسمه القديم يكون لون جدار الجسم الجديد
أبيض ولين ولامع قليلا ثم يغمق لونه بمجرد تعرضه للضوء والهواء ويتصلب تدريجيا حتى
يأخذ في النهاية اللون والقوام الطبيعيين المستديمين .




الكيتوني



السليولوز



شكل (١٣)



شكل (١٤) : تكوين جدار الجسم الجديد وإنسلاخ القديم في الحشرات .

هرمون الانسلاخ Ecdyson (شكل ١٥) :

ظهر أن الانسلاخ والتطور ونضج الخلايا التناسلية تنظمها هرمونات خاصة تسير في الدم ، وأهم عضو يفرز هرمون الانسلاخ (الاكدايزون) هو غدة الصدر الأمامي Prothoracic gland أو مثيلاتها وذلك بتنظيم وتوجيه من خلايا عصبية خاصة مفرزة في المخ Neurosecretory cells . ووجد أن إفراز عقدتي ال Corpora cardiaca و Corpora allata (ca) ، والمسمى بهرمون الشباب (Juvenile hormone) يقل عند الانسلاخ ويزداد بالحشرة عندئذ إفراز غدة الصدر الأمامي (أو مثيلاتها) وبعمر الانتهاء من عملية الانسلاخ يزداد ثانية تركيز هرمون الشباب (الجوفينايل) ويقل تركيز هرمون الانسلاخ (الاكدايزون) .



هرمون الشباب
(Juvénile)

شكل (١٥)

الباب الثالث

مناطق الجسم في الحشرات

The Body Regions in Insects

ينقسم جسم الحشرة إلى ثلاثة مناطق هي الرأس Head والصدر Thorax والبطن Abdomen فالرأس دائما صلبة ولا يظهر فيها أى تقسيم إلى حلقات ، أما الصدر والبطن فحلقاتها ظاهرة .

أولا : الرأس The Head

وهي الجزء الأمامى من الجسم ، وتغلف بدرع Capsule شيتينى صلب من سطحها العلوى حيث يوجد المخ ، أما سطحها السفلى فهو غشائى صغير حيث توجد فتحة الثقب المؤخرى Occipital foramen وهو الثقب الذى تتصل به الرقبة ومنه يخرج أيضا الحبل العصبى والمرىء والقلب والدم والغدد اللعابية والقصبات الهوائية لتدخل الصدر .

وتأخذ الرأس أوضاعا مختلفة بالنسبة للمحور الطولى لجسم الحشرة ، ووضع الرأس مهم فى التقسيم . هذا ويوجد وضعان للرأس بالنسبة للمحور الطولى للجسم هما :

١ — الوضع المسمى Hypognathous وفيه تتجه أجزاء الفم إلى أسفل كما فى الصرصار والجراد .

٢ — الوضع المسمى prognathous وفيه تتجه أجزاء الفم إلى الأمام كما فى الخنافس .

وتحمل الرأس زوجين من العيون المركبة Compound eyes ، وتتكون كل عين من عدة أقسام صغيرة Facets ، وتحاط العين بصفيحة حلقيه تسمى بالصفيحة العينية Ocular sclerite . وفى كثير جدا من الحشرات وخصوصا فى البقوات نجد أن كل عين تصبح عبارة عن قسم صغير واحد Facet وبذلك يوجد فى هذه البقوات على كل جانب من جانبي الرأس مجموعة من هذه الأقسام منفصلة عن بعضها البعض ، وتسمى بمجموعة العيون البسيطة كلها Ocularium .

كما يوجد على رأس الحشرة وبين العيون المركبة في الغالب ثلاثة عيون بسيطة Ocelli ، وكل عين فيها ذات قسم صغير واحد Facet ، والزوج العلوى منها يكون مرتبا أمام بعضه كل واحدة على جانب ويسمى هذا الزوج بالأعين البسيطة الجانبية Lateral ocelli ، أما العين الثالثة فتقع اسفلهما وفي الوسط وتسمى بالعين البسيطة الوسطية Median ocellus .


ويوجد زوج من قرون الاستشعار Antennae على صفيحة الرأس العلوية بين العيون المركبة . ويتمفصل قرن الاستشعار في نقرة القرن Antennal socket والتي تحاط في الغالب بصفيحة حلقيه Antennal sclerite . ويوجد على سطح نقرة القرن بروز يتمفصل عليه القرن ويسمى هذا البروز بالمدور أو المحور Pivot وهو امتداد مثلث الشكل من صفيحة الرأس نفسها . ويتكون قرن الاستشعار من مفاصم صغيرة ، المقصم الأول منها الموجود جهة الرأس يسمى الأصل Scape وهو أكبر المفاصم حجما ، والمقصم الثاني ويسمى العذق Pedicel ، وما يلي ذلك من قرن الاستشعار يسمى الشمروخ Flagellum (شكل ١٦) وهو مركب من مفاصم عديدة . وتختلف قرون الاستشعار كثيرا من حيث أشكالها التي منها (شكل ١٧) الشعرى Setaceous والخيطى Filiform والمفلطح Flat والعقدى Moniliform والمنشارى Serrate والصولجاني Clavate or Clubbed والرأسي Capitulate والورق Lamellate والمرفقى Geniculate والمشطى Pectinate أو المشطى المضاعف Bipectinate والريشى Plumose والأريستى Aristate (حيث تكون الأريستا فيه جانبية) والمخرازى وهو من النوع الأريستى ولكن تكون الأريستا فيه طرفية بدلا من جانبية .

ويزداد عدد حلقات قرن الاستشعار بازدياد النمو في الحشرات بسيطة التطور Ametabola والحشرات ناقصة التطور Hemimetabola ، ففي النطايط المسمى Docicostaurus sp. نجد أن حلقات قرن الاستشعار عددها ١٣ في الحورية بينما عدد حلقات الحشرة البالغة ٢٥ حلقة . والزيادة في عدد الحلقات ينشأ بانقسام الحلقة القاعدية من حلقات الشمروخ والمسماة Meriston مما ينشأ عنه اضافة حلقات جديدة بينها وبين الحلقة التالية لها من حلقات الشمروخ أو تنشأ تلك الزيادة بانقسام العقلة الطرفية من عقل الشمروخ فتكون الحلقات الجديدة الزائدة موجودة عند نهاية القرن الطرفية .

وعادة مايكون قرن الاستشعار في اليرقات مخترلا جدا ويظهر وكأنه ندبة صغيرة كما في يرقات الذباب وبعض يرقات السوس (رتبة غمدية الأجنحة) ، أما في يرقات رتبة

حشرقية الأجنحة فيتكون من ثلاث حلقات واضحة وفي هذه اليرقات أيضا يمكن للقرن أن ينكمش داخل غشاء يسمى Antachoria موجود في حفرة على أحد جانبي الرأس فوق قاعدة الفك العلوى مباشرة .

ويستخدم قرن الاستشعار في البراغيث Fleas والكولبولا Collembola في التلقيح ، ففي ذكر البراغيث يستخدم قرن الاستشعار في القبض على الانثى من أسفل ، وفي الكولبولا قد يُحمل الذكر لعدة أيام بواسطة الانثى وذلك عن طريق تعلق الذكر بقرن استشعار الانثى . وعلى العموم فوظيفة قرن الاستشعار الأساسية هي حسية (اللمس أو الشم أو الاحساس بالرطوبة أو الحرارة) ، كما يوجد عضو سمع بدون طبلة خارجية داخل عقلة العنق كما في البعوض . وفي بعض الخنافس المائية (Hydrophilus spp.) يحجز قرن الاستشعار (بواسطة الشعيرات الطويلة التي تكسوه) فقايع مائية بينه وبين جسم الحشرة لمساعدتها على النفس عند وجودها تحت سطح الماء ، وفي اليرقات الحديثة الفقس لنفس الحشرة يوجد على قرن الاستشعار من جهته الداخلية أشواك حادة تساعد الفكوك العليا في مضغ الفريسة .



شكل (١٦) : قرن الاستشعار



ينقسم درع الرأس إلى عدة صفائح Sclerites تفصلها دروز Sutures عديدة ، والدروز الرئيسية وصفائحها المجاورة لها في الحشرات هي (شكل ١٨) :

٧٢

٢ — الدرز الجمجمى Epicranial suture : ويأخذ شكل حرف ٨ حيث يبدأ الحرف عند مؤخرة الرأس ويعبر قمة الرأس ثم يتفرع على وجه الحشرة .

ويسمى الجذع فى حرف ال ٨ بالدرز الجمجمى Epicranial stem أو بالدرز التاجى Coronal suture والفرعان بالذراعين الجمجميين Epicranial arms أو بالدرزين الجبيين Frontal sutures .

٣ — الجبهة Frons or Front : وهى المساحة الموجودة على الوجه الأمامى أو العلوى لصفحة الرأس بين أو أسفل الدرزين الجبيين . وتقع العين البسيطة الوسطى السفلية على صفحة الجبهة دائما . ويحد الجبهة من أسفل الدرز الجبى الدرق - Fronto Clypeal . وفى يرقات رتبة حرشفية الأجنحة (شكل ١٢٣) تتكون الجبهة من صفيحتين على جانبي الدرق من الخارج ويطلق على كل منهما Adfrontal sclerite ، ويفصلها عن الجدارية درز يسمى Adfrontal suture كما يفصل صفحة الجبهة المذكورة عن الدرق فى اليرقة درز يسمى Epistomal suture .

٤ — الصفيحتان الجمجميتان Epicranial plates : وهما الجزءان من صفحة الرأس الموجودتان على جانبي الدرز التاجى .

٥ — الدرق Clypeus : وتقع بين الدرز الجبى الدرق وبين الشفة العليا وتعلق بها الأخيرة إلى أسفل . وفى بعض الحشرات كما فى رتبة مستقيمة الأجنحة تكون الجهة البعيدة من الدرق الموجودة جهة الشفة العليا صلبة وغامقة وتسمى Epistoma . وتتم فصل الدرق مع الشفة العليا بغشاء رقيق ولكنها (أى الدرق) لا تتم فصل مطلقا مع الجبهة بل تلتحم بها بقوة . وفى يرقات رتبة حرشفية الأجنحة تنقسم الدرق إلى جزئين أحدهما علوى كبير Postclypeus والآخر سفلى صغير موجود جهة الشفة العليا Anteclypeus .

٦ — الشفة العليا Labrum : وهى عضو معلق متصل بالحافة السفلية للرأس وتعمل الجهة الداخلية للشفة العليا والمسماة بسقف الحلق Epipharynx كواجهة أمامية لفتحة أمام الفم Preoral cavity . وغالبا ما يحمل سقف الحلق فصوصا وحلمات وشعيرات حساسة ، ووجود وترتيب هذه الفصوص أو الحلمات أو الشعيرات هام جدا فى تقسيم الحشرات خاصة فى تقسيم طور اليرقة . وتصل العضلات المحركة للشفة العليا بزوائد شيتينية تسمى Tormae موجودة على الحافة القاعدية للشفة العليا ، ونظرا لعلاقة الشفة العليا فى الحشرات بالتغذية فهى غالبا ما تدرس مع أجزاء الفم ولو أنها جزء من الرأس .

٧ — الصدغ Gena : وهو الجزء السفلى من الرأس الذى يقع أسفل العين المركبة وخلف الجبهة ، وأحيانا يوجد درز صدغى Genal suture يفصل بين الجبهة والصدغ ، واذا لم يوجد هذا الدرز فتظهر الجبهة والصدغ وكأنهما قطعة واحدة .

٨ — الصفيحة الفكية Mandibular sclerite : وتوجد بين الصدغ وبين الفك العلوى ويتمفصل بمخافتها البعيدة الفك العلوى .

٩ — مؤخرة الرأس Occiput وخلف الصدغ Postgena : أما مؤخر الرأس فهى المنطقة التى تكون معظم الجهة الخلفية للرأس من أعلى ، أما خلف الذقن فهى المنطقة الموجودة أسفل مؤخر الرأس وهى أيضا المنطقة التى تكون معظم الجهة الخلفية للرأس ، ويفصل كل من مؤخر الرأس وخلف الصدغ عن قمة الرأس والصدغين درز يسمى Occipital suture ، وفى كثير من الحشرات قد يكون هذا الدرز مضمحلا ويأخذ شكل خط رفيع جدا أو قد لا يكون موجودا بالمرءة وفى هذه الحالة تعرف منطقتا مؤخر الرأس وخلف الصدغ بالتقريب حسب موقعهما وتصبجان عندئذ متصلتان بقمة الرأس من أعلا والصدغين على الجانبين بدون تحديد .

١٠ — الصفيحة المحيطة بمخافة الثقب المؤخرى Postocciput : وتوجد هذه الصفيحة غالبا فى جميع الحشرات الكاملة ويفصلها عن مؤخر الرأس درز يسمى Postoccipital suture ، وتحمل هذه الصفيحة على كل جانب نتوءا يسمى Occipital condyle تتمفصل الرس مع صفائح الرقبة .

١١ — الجولا Gula : وتوجد فى كثير من الحشرات بين قاعدة الشفة السفلى وبين منطقة الثقب المؤخرى (شكل ١٩ د) ، وعندئذ يفصلها عن خلف الصدغ على كل جانب درز يسمى Gular suture ، وقد تضمحل صفيحة الجولا هذه عند كبر كل من صفيحتى خلف الصدغ حيث يلتحم درزا الجولا ويكونان ما يسمى بقنطرة خلف الصدغ Postgenal bridge .

الهيكل الداخلى فى الرأس : The Tentorium

تقوى الرأس من الداخل بهيكل شيتينى مكون من عدة أذرع Apodemes تكون بالانعاج إلى الداخل من جدار الجسم ، ويسمى هذا الهيكل Tentorium وقد يسمى Endoskeleton الرأس (شكل ١٨ ج) .

وفي الحشرات الأولية Apterygota يكون الهيكل الداخلى غير نامى جيدا ، أما في الحشرات الراقية Pterygota فيتكون هذا الهيكل من أربعة أجزاء رئيسية هى الأذرع الأمامية Anterior arms والأذرع الخلفية Posterior arms وجسم الهيكل نفسه Corporotentorium (وهو الجزء الوسطى من الهيكل) ثم الأذرع العلوية Dorsal or superior arms .

وتنبع الأذرع الأمامية للداخل من الـ Anterior tentorial pits التى توجد دائما على شكل شقين خارجيين موجودين على الدرز الجبى الدرق .

وتنبع الأذرع الخلفية للداخل من الـ Posterior tentorial pits الموجودة على الدرز Postoccipital ، أما جسم الهيكل فهو مكون من تقابل الأجزاء الداخلية من الأذرع الأمامية والخلفية والتحام هذه الأجزاء ببعضها البعض . أما الأذرع الظهرية فهى معتبرة كنموات ثانوية من الأذرع الأمامية لأنه لا يوجد أى أثر ظاهرى يبين انبعاثها من جدار الرأس نفسه عند مكان اتصال هذه الأذرع بالرأس وذلك بين نفرة قرن الاستشعار وبين العميون البسيطة على كل جانب ، وبطبيعة الحال يختلف شكل وحجم هذه الأذرع باختلاف الحشرات .

أجزاء الفم - parts The Mouth

أجزاء الفم في الحشرات هى المسؤولة عن التغذية وتتكون من الشفة العليا في الأمام واللسان في الوسط خلف فتحة الفم وينشأ من السطح العلوى للشفة السفلى التى تكون أرضية الفم ، وعلى الجانبين يوجد فكان علويان وفكان سفليان . وفي الحشرات الأولية كالكلوبولولا والبروتورا والدبلورا توجد أجزاء الفم داخل الرأس في تجويف ناشئ عن انبعاث الخدين للداخل ويطلق على أجزاء الفم هنا Entognathous بينما يطلق على أجزاء الفم الأخرى الموجودة في باقى الرتب الحشرية Ectognathous حيث تشاهد أجزاء الفم كزوائد خارجية بارزة أمام الرأس .

وعلى العموم فإن أجزاء الفم في الحشرات والمكونة من أزواج الفكوك العليا والسفلى والشفة السفلى تمثل كل منها تحورات زوج من أزواج الأطراف النموذجية لحيوان مفصلي الأرجل .

الشكل النموذجي لطرف من الأطراف في حيوان مفصلي الأرجل :

ويتكون من حلقة قاعدية Coxopodite تخرج من جانب أى حلقة من حلقات الجسم ، ويتصل بالحلقة القاعدية عدد من الحلقات الطرفية تعرف كلها مجتمعة باسم

Telopodite . ولكل حلقة من حلقات هذا الطرف في الحيوان مفصلي الأرجل القدرة على أن تنمو عليها زوائد على كل من جانبها الخارجى والداخلى وتسمى زوائد الجانب الخارجى Exites بينما زوائد الجانب الداخلى فتسمى Endites . وشكل (٢٠) يمثل رجل حيوان مفصلي أولى من صف الترايلوبيتا Trilobita وفيها نجد أن الحلقة القاعدية لها الزائدة الخارجية Exites التى تشبه الخياشيم بينما الـ Endite فهي عادية أما بقية حلقات الـ Telopodite فهي بسيطة وخالية من الزوائد .

زوج الفكوك العليا في الحشرات : The Mandibles

وهو الزوج الأمامى من أجزاء الفم الحقيقية في الحشرات ويقع خلف الشفة العليا مباشرة وهو من زوائد الحلقة Second Post-oral segment . والفكوك العليا صلبة شيتينية ولها أسنان مختلفة ، كما ينمو عليها شعر قد يكون كثيفا في بعض الأحيان . ويتمفصل كل فك مع الرأس عند حافته القاعدية الجانبية ما عدا في قليل من الحشرات الأولية حيث يتمفصل الفك العلوى كذلك قرب وسط هذه الحافة القاعدية .


والفك الحالى في الحشرات لا يدلنا على كيفية نشوئه وتحوره من طرف بسيط في حيوان مفصلي الأرجل الا بدراسة الفك العلوى في القشريات Crustacea (شكل ٢٠ ب) حيث أن فكها العلوى أولى جدا وتدل عضلاته على أنه نشأ من طرف يشبه رجل حيوان صف الترايلوبيتا المذكورة سابقا ولكنه حدث فيه أن أصبحت الحلقة القاعدية كبيرة الحجم وقوية كما وأن زائدة الجهة الداخلية Endite أصبحت منطقة مستنة للهرس وفقدت زائدة الجهة الخارجية Exite ، أما عن الـ Telopodite فقد اضمحل كثيرا . وفي الفك العلوى للحشرات (شكل ٢٠ ج) تلاشت الـ Telopodite كلية وأصبح الفك العلوى مكونا من الحلقة القاعدية فقط محوره ومعها زائدها الداخلية Endite .

زوج الفكوك السفلى في الحشرات : The Maxillae


وتقع مباشرة خلف الفكوك العليا وهو زوائد الحلقة Third Post-oral segment ، وتظهر لنا عضلات الفك السفلى في الحشرة أن منشأة كمنشأة الفك العلوى تماما ولكن مع وجود الاختلافات الآتية :

- (١) لا يوجد التمثيل الوسطى .
- (ب) الـ Telopodite باق ويعمل كعضو لمس ويسمى ملمس فكى .
- (ج) الحلقة القاعدية Coxopodite مقسمة إلى الكاردو والساق .

(د) تمت الزائدة الداخلية Endite للحلقة القاعدية إلى فصين ظاهرين متحركين هما الجاليا واللاسينيا .



شكل (١٨) : (أ) رأس الجراد (منظر أمامي).
(ب) رأس الجراد (منظر جانبي)
(ج) الهيكل الداخلي في الرأس.




شكل (١٩) : الدروز والصفائح الرئيسية الموجودة في رأس الحشرات.

(أ) شكل عام.

(ب) الذبابة المنزلية.

(ج) الزنبور *Vespula*.


(د) خنفساء.



شكل (٢٠) : (أ) رسم توضيحي لزائدة من زوائد معضليات الأرجل .
 (ب) فك علوى فى حيوان قشرى .
 (ج) فك علوى فى نطاط .

وعلى العموم فأجزاء الفك السفلى فى الحشرات (شكل ٢١) هى كما يلى :

- ١ — الكاردو **Cardo** : وهى الصفيحة القاعدية المثلثة الشكل والتى تلتصق بالرأس ، وهى المفصلة التى يتحرك منها كل الفك السفلى .
- ٢ — الساق **Stipes** : وهو الجزء الوسطى المركزى فى جسم الفك السفلى وغالبا ما يكون شكله مستطيلا . ويقع الساق فوق الكاردو ومنه تخرج جميع زوائد الفك السفلى الأخرى .
- ٣ — الجاليا **Galea** : وهى الفص الخارجى الذى يتمفصل مع نهاية الساق ، وتنمو الجاليا دائما كصفيحة عريضة حسية أو قد تغطى الجاليا بغطاء كله أعضاء حسية .
- ٤ — اللاسينيا **Lacinia** : وهى الفص الداخلى ويتمفصل أيضا مع طرف الساق وتشبه اللاسينيا الفك العلوى فى أنها تحمل أسنانا أو أشواكا على طول حافتها الداخلية .
- ٥ — الملمس الفكى **Maxillary palp** : وهو مقسم إلى حلقات ويخرج من الجانب الخارجى للساق ويتكون غالبا من خمسة عقل محمولة على قاعدة **Palpifer** وفائدته حسية .




شكل (٢١) : أجزاء الفم القارضة في الصرصار الأمريكي.

الشفة السفلى في الحشرات : The Labium

وتقع خلف الفكين السفليين وهي زوائد الحلقة 4th Post-oral segment ، وتظهر الشفة السفلى وكأنها قطعة أو وحدة واحدة ولكنها في الواقع مكونة من الزوج الثاني من الفكوك السفلى بعد أن التحما من الوسط ليكونا عضوا واحدا ، وعلى ذلك فأجزاء الشفة السفلى تقابل وتشابه مثيلاتها في الفكوك السفلى ، واستدل على هذه الأجزاء في الشفة السفلى وما قبلها في الفكوك السفلى من دراسة عضلاتها وأماكن اتصال الأحيوة بالشفة السفلى . وفيما يلي وصفا لأجزاء الشفة السفلى :

١ — مؤخر الذقن **Postlabium** : وهو الجزء القاعدي من الشفة السفلى والذي يتم فصل مع أغشية الرأس . وتقسم مؤخر الذقن بدورها إلى جزء قاعدي هو تحت الذقن **Submentum** وآخر طرفي هو الذقن **Mentum** .

٢ — مقدم الذقن **Prelabium** : وهو الجزء الطرفى من الشفة السفلى والجزء المركزى أو الوسطى منه هو جسم مقدم الذقن **Prementum** والذي يسمى أحيانا **Stipula** . ويحمل مقدم الذقن هذا زوجا من الملامس الشفوية **Labial palps** على كلا جانبيها ، وكل ملمس مكون عادة من ثلاث عقل محمولة على قاعدة صغيرة **Palpiger** . أما الجزء الطرفى من مقدم الذقن فهو غالبا ما يكون على هيئة لسان ولذلك فهو يسمى **Ligula** ، ولا تختلف هذه اللجيولا كثيرا فى التركيب ولكنها دائما مقسمة إلى زوجين من الفصوص هما الجلوستين **Glossae** للداخل والباراجلوستين **Paraglossae** للخارج .



شكل (٢٢) : أجزاء فم قارضة فى الجراد الصحراوى .

وفى كثير من الحشرات كما فى رتبة غشائية الأجنحة (شكل ٢٣ ب) نجد أن الجلوستين قد التحمتا وكونتا عضوا واحدا وسطيا بين الباراجلوستين يسمى الاجلوسا **Alaglossa** ، وفى حالات أخرى تلتحم الباراجلوستا وتكونان فصا واحدا صلبا يسمى توتوجلوسا **Totoglossa** (شكل ٢٣ ج) كما فى رتبة غشائية الأجنحة أيضا .

وفيما يلي مقارنة بين أعضاء الفك السفلى وما يقابلها من أعضاء الشفة السفلى :

الفك السفلى	الشفة السفلى
الكاردو	مؤخر الذقن (تحت الذقن) تقابل الكاردو ولكن لا يوجد ما يؤكد ما يقابل الذقن .
الساق	مقدم الذقن
الملامس الفكية	الملامس الشفوية
اللاسينيا	الجلوسا
الجاليا	الباراجلوسا

اللسان : The Hypopharynx

وهو يخرج من أرضية الرأس الغشائية ، ويتكون من فص يخرج ممتدا إلى الأمام أو مرفوعا لأعلى . وفي الحشرات عموما يتصل اللسان دائما بقاعدة الشفة السفلى حيث يظن أنه جزء منها . واللسان لا يعتبر زائدة أو طرف كأجزاء الفم الأخرى المذكورة سابقا بل يعتبر كنمو خارجي عديم الحلقات من جدار الجسم .

الأشكال الرئيسية لأجزاء الفم :

تحورت أجزاء فم الحشرات إلى أشكال عدة حتى تستطيع تناول أنواع مختلفة من الغذاء بطرق مختلفة ، وسنذكر فيما يلي الأنواع المختلفة الرئيسية ، علما بأنه توجد أنواع أخرى كما توجد أيضا أنواع وسطية بين الأنواع التي سنذكرها هنا :

١ - اجزاء الفم القارضة : The Biting or Chewing mouth-parts

في هذا النوع نجد أن للفكوك العليا حافة قاطعة لطحن الغذاء الصلب ، وتستعمل الفكوك السفلى والشفة السفلى لدفع الغذاء داخل البلعوم . ويوجد هذا النوع من أجزاء الفم في أنواع النطاط والجراد والصراصير ويرقات رتبة حرشفية الأجنحة (شكل ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤) . وهذا النوع هو المنتشر في الحشرات ومنه نشأت وتحورت جميع أجزاء الفم الأخرى ، ويؤكد ذلك أنه يشبه إلى حد كبير أجزاء فم الحيوانات المفصليّة الأرجل التابعة لصف السمفيليا وصف ذوات المائة رجل وهي أقرب صفوف مفصليات الأرجل

للحشرات . كما يؤيد ذلك أيضا أن هذا النوع عام في جميع رتب الحشرات كما في رتبة مستقيمة الأجنحة ورتبة السمك الفضى وبقوات العائلات الأولية في رتب الحشرات كاملة التطور ، كما أنه يوجد في نفس الحشرات الكاملة لهذه الرتب كاملة التطور ولكن ربما مع تحول بسيط جدا كما هو واضح في رتب غشائية الأجنحة وغمدية الأجنحة .

٢ — أجزاء الفم اللاعقة : The Sponging or Lapping mouth-parts

يوجد هذا النوع (شكل ٢٥) في أنواع كثيرة من الذباب مثل الذبابة المنزلية ، وهو مخصص لتناول الغذاء السائل أو الغذاء الذى يمكن إذابته في لعاب الحشرة . وتتكون أجزاء الفم هنا من خرطوم بنهايته الشفوية الأسفنجية الشكل ، وتوضع هذه الشفوية في الغذاء السائل الذى يدخل في القصيبات الكاذبة المنتشرة على سطحها فيصعد الغذاء إلى أعلى ليدخل في فتحة الفم المحاطة بصفيحة تسمى Discal sclerite ، ومن فتحة الفم يصعد في أنبوبة الغذاء الموجودة بين الشفة العليا وسقف الحلق من الأمام واللسان من الخلف ، ومن أنبوبة الغذاء يخترق الصفيحة المسماة Theca ثم إلى البلعوم . وتحمل الشفة العليا واللسان وأنبوبة الغذاء داخل تجويف مقدم الذقن (Theca) . وتعلق الذبابة الأغذية الصلبة كالسكر بعد أن تسقط عليها نقطة من لعابها وهذا يذيب السكر وبعدئذ يمتص خلال القصيبات الكاذبة ويصعد إلى أعلى في هيئة سائل . هذا وتسير الغدة اللعابية داخل اللسان مخترقة إياه لتنتهى عند نهايته القريبة من الشفوية .

٣ — أجزاء الفم القارضة اللاعقة : The Chewing- lapping mouth-parts

يأخذ هذا النوع من أجزاء الفم الغذاء لأعلى ويوجد في النحل (شكل ٢٦) وبعض الزنابير . الفكوك العليا والشفة العليا هنا من النوع القارض ، وفائدة الفكوك العليا هي هرس الطعام أو مضغ الشمع أو أى غذاء آخر موجود في الخلية ، أما الفكوك السفلى والشفة السفلى فأصبحت صفائح مفلطحة وطويلة حيث أن الجلوسيتين التحتيتا وكونتا عضوا طويلا اسطوانيا ليكنه الدخول داخل الأزهار لتناول الرحيق ، وبهذه الأسطوانة الطويلة تجويف كبير لتزول اللعاب . ويمكن لصفائح الشفة السفلى الأخرى والفكوك السفلى الانطباق على الجلوسيتين الملتحمتين ، ويصعد الرحيق في الأنبوبة المكونة من السطح الخارجى للجلوسيتين الملتحمتين ومن السطح الداخلى للملمسين الشفويين وجاليتى الفكين السفليين .

٤ — أجزاء الفم الماصة : The Sucking mouth- parts

ويوجد هذا النوع في الحشرات الكاملة لرتبة حرشفية الأجنحة (أى دقيق

والفرشاشات) التى تتغذى على الرحيق ومواد سائلة أخرى ، وهذا الرحيق يمتص لأعلى بخرطوم طويل مكون من اتحاد جاليتين الفكيتين السفليين ، وهاتان الجاليتان تكونان أنبوبة تفتح من أعلى فى البلعوم (شكل ٢٧ ا) .

٥ - أجزاء الفم الناقبة الماصة : The piercing- sucking mouth-parts

هنا تحورت أجزاء الفم لثقب الانسجة وامتصاص العصارة منها ، وهى توجد فى الحشرات التى تمتص عصارة النباتات مثل المن والحشرات القشرية وغيرها من الحشرات التابعة لرتبتي نصفية ومتساوية الأجنحة (شكل ٢٧ جـ) وتوجد أيضا فى الحشرات التى تمتص عصارات زميلاتها من الحشرات الأخرى ومن الحيوانات الصغيرة ، وتوجد كذلك فى البعوض (٢٧ هـ) والقمل والبراغيث والتى تتغذى على دم الثدييات والطيور .

وفى هذا النوع من أجزاء الفم نجد أن الفكوك العليا والفكوك السفلى وأحيانا الشفة العليا واللسان اسطوانية الشكل وطويلة ويمكنها جميعا الانطباق على بعضها لتكوين إبرة حادة مجوفة ، أما الشفة السفلى فتكون غمدا سميكا لتحوى داخلها هذه الإبرة الواخزة ، ويطلق على جميع الأجزاء السابقة خرطوم . وللتغذية تضع الحشرة خرطومها كله على العائل المراد التغذية على عصارتها أو دمه ثم تغرس الحشرة الإبرة فى نسيج العائل ثم تمتص العصارة التى تصعد لأعلى خلال الإبرة ومنها إلى البلعوم .

٦ - أجزاء الفم المفترسة : The predaceous mouth- parts



وتوجد فى الحشرات النافعة التى تخلصنا من الحشرات الضارة كما فى حورية الرعاش التى تعيش فى الماء وفيها أجزاء الفم من النوع القارض Predaceous chewing (شكل ٢٨ ا) ولكن تحورت الشفة السفلى لتناسب وظيفة اقتناص الحشرات والحيوانات الصغيرة من على مسافة من الحشرة أثناء عوم الأنخية فى الماء ، وكما فى يرقة أسد النمل (شكل ٢٨ ب) من رتبة شبكية الأجنحة حيث تطول الفكوك العليا والسفلى وتصبح مدببة لاختراق جسم الفريسة التى يصعد دمها فى مجرى بين الفك العلوى والفك السفلى على كل جانب من جانبي رأس يرقة أسد النمل ، وعلى هذا فاجزاء فم اليرقة الأنخية تعتبر أجزاء فم مفترسة بالامتصاص .

الرقبة The Cervix or Neck

وهى منطقة غشائية توجد بين الرأس والصدر وكان يظن سابقا أنها تكون حلقة مستقلة من حلقات الجسم تسمى Microthorax ولكن لا يوجد ما يؤيد ذلك وعلى

ذلك فالغالب أنها تتكون من جزء من الرأس (هو حلقة الشفة السفلى) وجزء من الحلقة الصدرية الأمامية وذلك لتكون منطقة مطاطة متحركة بينهما .




وتوجد على كل من جانبي الرقبة صفيحتان Cervical sclerites فائدتها أنهما تكونان محور المفصل بين الرأس والصدر الأمامي ، وتلتصق الصفيحتان ببعضهما البعض مكونتان قطعة واحدة تتمفصل مع بروز مؤخر الرأس المسمى Occipitalb condyle في الأمام والصدر الأمامي في الخلف . وقد تتحد صفائح الرقبة مع بلورا الصدر الأمامي وعندئذ لا يوجد مثل هذه الصفائح على منطقة الرقبة كما في الخنافس .



شكل (٢٣): (أ) رأس يرقة من رتبة حرشفية الأجنحة (منظر علوي).

(ب) جزء من الشفة السفلى في حشرة من رتبة غشائية الأجنحة.

(ج) الشفة السفلى والفكان السفليان في حشرة أخرى من رتبة غشائية الأجنحة.





شكل (٢٥): (أ) رأس وخرطوم الذبابة المنزلية.

(ب) قطاع عرضي في الخرطوم.

(ج) خرطوم الذبابة المنزلية.

(د) بعض الحلقات الشيتينية التي تقوى القصيات الكاذبة في الشففة.





شكل (٢٨) : (أ) أجزاء فم مفتوحة بالقرص في حورية الرعاش.
(ب) أجزاء فم مفتوحة بالإمتصاص في يوقة أسد النمل.

ثانيا : الصدر The Thorax

وهو المنطقة الواقعة بين الرأس والبطن ، وهو يتكون من ثلاثة حلقات هي الصدر الأمامى Prothorax والصدر المتوسط Mesothorax والصدر الخلفى Metathorax على التوالي .

وفي الحشرات الأولية التى لا تنمو لها أجنحة بالمرة Apterygota نجد أن هذه الحلقات الثلاثة متشابهة فى التركيب (شكل ٢٩ أ) ، فالترجة Tergum (وهى الصفيحة الشيتينية العلوية) والاسترنة Sternum (وهى الصفيحة الشيتينية السفلية) توجدان على هيئة صفائح عرضية ، أما صفائح البلورا Pleura or Subcoxal sclerites (وهى التى تصل الترجة بالاسترنة) فهى صغيرة ومكونة من ثلاثة صفائح أو مختزلة .

أما فى رتب الحشرات المجنحة فنجد أن الثلاثة حلقات تختلف كثيرا فى تركيبها ، فالصدر الأمامى يكون تركيبه كالحالة العادية الموضحة فى شكل (٢٩ ب) حيث تكون الصفائح الموجودة عليه متحدة لدرجة قد يصعب معها تحديدها ومعرفتها وفيه أيضا تصبح صفائح البلورا الثلاث مثبتة فى جدار الحلقة وغير متحركة لتكون قاعدة صلبة تتمفصل عليها الرجل العاملة إذ تتحد الصفيحة الوسطى من صفائح البلورا مع الاسترنة ، أما الصفيحتان الجانبيتان فتبقيان كصفيحتان مفلطحتان متجاورتان لتقوية منطقة البلورا . أما الصدران المتوسط والخلفى فدخلتا فى تطور أكثر وذلك بسبب وجود عضلات كثيرة بكل منهما للقيام بالميكانيكية اللازمة للجري والطيران معا ، وعلى ذلك فقد يضاف إلى كل من هاتين الحلقتين الصدريتين صفائح جديدة أو قد تندثر كثير من الصفائح الموجودة أصلا . وعلى العموم لا يحدث فى ترجة أو استرنة الحلقة الصدرية المجنحة تغير كبير ولكن يحدث التغير الأساسى فى البلورا . وعلى ذلك فتكون مكونات الحلقة الصدرية المجنحة فى الحشرات الموجودة حاليا (شكل ٢٩ ب) كالآتى :

١ - الترجة : The Tergum or Notum

وهى مقسمة إلى صفيحتين رئيسيتين ، الأمامية وتسمى Alinotum والخلفية وتسمى Postnotum ، وللاينوتوم هيكل شيتينى أمامى يسمى فراجا Phragma كما قد تكون مقسمة إلى صفائح أخرى مختلفة تبعا لاختلاف الحشرات .

أما الصفيحة الخلفية Postnotum فتحمل كذلك فراجا خلفية وتتصل من

الجانبين بصفيحة الـ Epimeron في البلورا لتكوين قنطرة خلف الجناح . وفي الواقع تعتبر الـ Postnotum جزء من الحلقة التالية ولكنها أصبحت جزءا عاملا في الحلقة الموجودة أمامها .

٢ - الاسترنة : The Sternum


وهذه تتصل من الأمام والخلف بالبلورا وبذلك ينشأ تجويف Socket تقع فيه حرقفة الرجل ، والجزء الوسطى من الاسترنة يسمى Eusternum وله في الوسط انبعاج Furrow بسيط يدل على مكان انبعاج جدار الجسم في هذه المنطقة ليكون صفيحة متفرعة هي الفوركا Furca وهي إحدى صفائح الهيكل الداخلى للحلقة الصدرية (شكل ٣٠) . ويوجد خلف الـ Eusternum صفيحة صغيرة تسمى Spinasternum ، تحمل أيضا من الداخل إحدى صفائح الهيكل الداخلى في الحلقة الصدرية الغير متفرعة والمسماة Spina . هذا وتنشأ الـ Spinasternum من الغشاء الموجود بين الحلقات Intersegmental membrane ولكنها تتبع دائما الحلقة الموجودة أمامها .

٣ - البلورا : The Pleuron


وهذه الصفيحة قد كبرت مكونة صفيحة جانبية ظاهرة . وللبلورا زائدة حرقفية سفلية Coxal process وعليها تتمفصل حرقفة الرجل ، كما توجد للبلورا أيضا زائدة جناحية علوية Wing process . وتقسم البلورا إلى منطقة أمامية Episternum وأخرى خلفية Epimeron وذلك بواسطة درز بلورى Pleural suture يمتد من زائدة الحرقفة حتى زائدة الجناح ، وينبعج جدار الجسم إلى الداخل على هيئة صفيحة رقيقة بارزة داخل الجسم تسمى Pleurodema عند مكان وجود هذا الدرز . وتتحد البلورا من الأمام ومن الخلف بالاسترنة ولكن مع وجود أماكن عدم اتصال لتكوين فراغ الحرقفة Coxalcavity كما ذكر من قبل .

الهيكل الداخلى للحلقة الصدرية المجنحة :

تعمل صفيحة الفوركا وصفيحتا الـ Pleurodema السابق ذكرها كهيكل داخلى في الحلقة الصدرية المجنحة وفائدتها أنها تعمل كأعضاء تتصل بها عضلات الأرجل والأجنحة ، ويكون وضع وتجاور الصفائح المذكورة بحيث يتكون منها جميعا صفيحة واحدة مستمرة كما في (شكل ٣٠) .



شكل (٢٩) : (أ) حلقة صدرية في حشرة من رتبة بلعكوتيرا Plecoptera
 (ب) حلقة صدرية غوزجية (فصل أجنحة).



شكل (٣٠) : قطاع عرضي توضيحي للحلقة الصدرية مبيناً الهيكل الداخلى .

الأرجل The Legs

تتكون الرجل الصدرية النموذجية في الحشرة من ستة أجزاء هي الحرقفة Coxa والمدور Trochanter والفخذ Tibia والرسغ Tarsus والرسغ الأقصى Pretarsus (شكل ٣١) . والحرقفة هي الحلقة التي تتمفصل مع الجسم وقد تحمل فصاً خلفياً يسمى Meron . والرسغ قد يكون مكوناً من عقلة واحدة كما في البق أو أكثر من عقلة (غالباً خمسة) كما في الحشرات الكاملة . والرسغ الأقصى يظهر في رتبة ذات الذنب القافز (الكوليبولا) على أنه حلقة طرفية صغيرة مستقلة ، أما في الرتب الأخرى فيمثل الرسغ الأقصى بجهاز معقد مكون من مغالب وبمجموعة من الصفائح الدقيقة وذلك في نهاية الرسغ (شكل ٣٢) .

وفي العادة نجد أن أرجل الحشرات بسيطة ومهيأة للمشي أو الجري (قدرت سرعة جري الصرصار الأمريكى بنحو ٤,٥ كم في الساعة) ، ولكن تحورت هذه الأرجل كثيراً

لتناسب القيام بوظائف أخرى مختلفة كثيرة كالقفز حيث يكبر الفخذ كما في النطاط أو يكبر هذا الفخذ مع وجود جهاز داخلي يساعده على القفز كما في الخنفساء البرغوثية .

وقد تتحور الرجل للقص حيث يصبح الفخذ مجوفا ومحاطا بأشواك قوية كما يوجد على الساق أشواك قوية كذلك كما وعند القص توضع الفريسة بين الساق والفخذ بقوة فلا تستطيع الافلات كما في فرسة النبی ، أو قد تتحور للعم فتتفلطح أجزاؤها وينمو عليها شعر طويل كما في الحشرات المائية ، أو قد تتحور الرجل للحفر فتصبح أجزاؤها قصيرة مندبجة قوية ومسنة كما في الحفار ، أو لجمع حبوب اللقاح فيتحور الساق وحلقة الرسغ القاعدية في الرجل الخلفية لأداء هذه العملية كما في شغالة نخلة العسل حيث توجد صفوف من الأشواك على السطح الداخلي للحلقة الرسغ الأولى تقوم بجمع حبوب اللقاح من على جسم النحلة ثم تدفع تلك الحبوب بواسطة أشواك موجودة على نهاية الساق الطرفية والتي يطلق عليها اسم Rack للرجل الخلفية المقابلة إلى السطح العلوي العريض لحلقة الرسغ القاعدية والذي يسمى Pollen press وتحرك تلك الحلقة القاعدية للخارج ولأعلى تنقل حبوب اللقاح إلى السطح الخارجى للساق والذي يسمى بسلة حبوب اللقاح Pollen basket . وقد تتحور الرجل لتنظيف قرن الاستشعار كما في الرجل الأمامية للفراسات وأى دقيق أو كما في الرجل الأمامية للنحل والتمل والزناير حيث توجد شوكة في نهاية الساق تقفل على تجويف نصف دائرى موجود على الحلقة الأولى للرسغ ، وعند تنظيف قرن الاستشعار يوضع القرن بين الشوكة والتجويف ثم يسحب للخارج لتنظيفه من الأوساخ العالقة به .

والرجل الصدرية في اليرقات مكونة من الحرقفة والمدور والفخذ والساق والرسغ أيضا ولكن يتكون الرسغ هنا من حلقة واحدة ويحمل مغلبا واحدا أيضا . كما تحمل بعض الحلقات البطنية في يرقات رتبتي حرشفية الأجنحة وغشائية الأجنحة زوائد لحمية هي الأرجل البطنية الكاذبة التي تحمل في الرتبة الأولى أشواكا Crochets تعلق بها اليرقة بالأسطح التي تسير عليها .

المشى في الحشرات :

لكثير من الحشرات القدرة على القفز وذلك بفرد ساق الرجل الخلفية فجأة كما في الحشرات القافزة من رتبة مستقيمة الأجنحة والبراغيث والخنفساء البرغوثية ، أو تقفز الحشرة بمساعدة أعضاء خاصة بذلك كما في خنافس فرقع لوز وحشرة الكولمبولا ، أما في أغلب الحشرات فالمشى هو طريقها الوحيدة في التنقل من مكان إلى آخر كما هو واضح في الحشرات الأرضية .




شكل (٣١) : تحورات الأرجل في الحشرات.

وعند سير الحشرة تستعمل أرجلها الأمامية كأعضاء جذب وأرجلها الوسطية كدعامات لحمل جسمها وأرجلها الخلفية لدفعها إلى الأمام . وتسير الحشرة دائما في خط متعرج على شكل Z ، وذلك بتحريك الرجل الأمامية والخلفية في جهة مع الرجل

الوسطية في جهتها الأخرى إلى الأمام وذلك على التوالي ، وتعمل الثلاثة أرجل الأخرى الثابتة عندئذ كدعامات لحمل جسم الحشرة وهكذا . وفي حشرات أخرى تتحرك الرجل الأمامية والوسطية في جهة مع الخلفية في الجهة الأخرى على التوالي وهكذا . وعموما لا بد للحشرة من أن تتركز عند سيرها على ٣ — ٥ أرجل من أرجلها الست .

وبعض الحشرات تستعمل زوجين فقط من أرجلها في المشي مثل فرسة النبي حيث تخطو الرجل الأمامية في جهة مع الرجل الخلفية في الجهة الأخرى وهكذا بالتبادل ، وفي يرقات رتبة حرشفية الأجنحة وغيرها من يرقات الحشرات الأخرى تلعب البطن بحركات عضلاتها وزوائدها دورا هاما اثناء سير هذه اليرقات .

وهناك بعض الحشرات القادرة على السير على سطح الماء إذ أن رسغ الأرجل في تلك الحشرات يكون مزودا بشعيرات غير قابلة للبلل ويمنع كسر الغشاء الخارجى لسطح الماء ويؤدي فقط إلى وخزه ، وهناك أيضا بعض أنواع الخنافس المائية والتي يمكنها أن تسير بسرعة ٢,٥ كم في الساعة على سطح الماء وذلك عن طريق إفراز مادة من غدة قريبة من فتحة الشرج تعمل على تقليل ظاهرة التوتر السطحي للماء مباشرة مما يؤدي إلى دفع الحشرة إلى الأمام .



شكل (٣٢) : (أ) الرسغ الأقصى في ذبابة .
(ب) الرسغ الأقصى في الصرصار الأمريكي .

الأجنحة The Wings

أجنحة الحشرات عبارة عن غموات خارجية من جدار الجسم على طول الحافتين الجانبيتين للترجة . وللحشرات المجنحة زوجان من الأجنحة ، زوج متصل بالحلقة الصدرية الثانية والزوج الثاني متصل بالحلقة الصدرية الثالثة ، والصدر الأمامي دائما غير مجنح . هذا مع العلم بأنه يوجد على الصدر الأمامي في قليل من الحفريات الحشرية زائدتان جانبيتان Flaps ولكن لا توجد أدلة بالمرءة على وجود أجنحة فعالة على الحلقة الصدرية الأولى للحشرات في أى حقب من أحقاب تطورها ، كما لم يوجد حتى الآن طور وسطي بين أجنحة الحشرات المجنحة Pterygota والحشرات الأولية عديمة الأجنحة Apterygota . وأغلب حفريات الحشرات المجنحة المعروفة ذات أجنحة نامية جدا كأجنحة رعاشات يومنا هذا .

وفي سلم التطور نشأت الأجنحة الأمامية قبل الأجنحة الخلفية ، ومثل هذه الأجنحة الأولى اكتسبت أول حركة لها مثل الأنطواء مثلا وذلك لتوجيه الحشرة كالدفعة ، ثم تطورت وظيفة الأجنحة فأصبحت تستعمل في الطيران واحتاج ذلك إلى نشوء وصلة مرنة بين الجناح والجسم . وفي بعض الحشرات كالرعاشات مثلا وقف تطور الطيران عند هذا الحد ، ولكن في أغلب الحشرات الأخرى نشأ جهاز لثنى الأجنحة للخلف فوق سطح الجسم عند عدم الاستعمال .



تركيب الجناح :

أجنحة الحشرات هي امتدادات من جدار الجسم ، ويتكون الجناح من غشاء رقيق علوي وآخر سفلي تجرى بينهما العروق Veins (شكل ٣٣) .

وتتصل قاعدة الجناح بالجسم بواسطة غشاء توجد فيه مجموعة من الصفائح الضغيرة تسمى بالأصلااب الابطية Axillary sclerites ، وهذه الأصلااب الابطية تتمفصل مع حافة الترجة ، ويوجد بجوار الأصلااب الابطية وملازما لها صفيحتان صغيرتان هما الصفيحة الأبطية القاعدية Basalar sclerite والصفيحة تحت الابطية Subalar sclerite .

والعروق الطويلة Veins في الجناح تجرى من قاعدته إلى طرفه ، كما توجد عروق عرضية Cross veins تصل ما بين هذه العروق الطويلة . ويطلق على نظام توزيع العروق الطويلة والعرضية اسم التعريق Venation . ويبدو مؤكدا أن العروق الطويلة والعرضية نشأت أصلا من قصبات هوائية آتية من جسم الحشرة وذاهبة إلى الجناح لمدته

بالأكسجين اللازم أثناء نموه ، ثم تصلبت هذه القصبات وانفصلت من عند قاعدة الجناح ثم أصبحت تستعمل كدعامة للجناح عند تمام نموه .



شكل (٣٣) : (أ) قطاع عرضي في جناح عادى .
(ب) قطاع عرضي في جناح غمدى (خنفساء) .

ويختلف التعريق كثيرا في الرتب الحشرية المختلفة ، وهذا الاختلاف هام جدا في التصنيف إذ أنه ثابت في الرتبة والعائلة . وفي الأجنحة الأولية كما في ذبابة مايو نجد أن العروق متفرعة كثيرا جدا وبدون نظام عند أطرافها ، وتكثر جدا العروق العرضية ، وتظهر العروق الرئيسية واضحة ومحددة عند قاعدة الجناح فقط . ويزيادة تطور الجناح تقل العروق العرضية ويقل أيضا تفرع العروق الطويلة كما في رتبة غشائية الأجنحة ، ثم قد تندمج بعض العروق الطويلة مع بعضها البعض كما في التريس . وليكن من المعلوم أن كل أنواع التعريق نشأت من النوع البسيط الموضح في شكل (٣٤) والذي قد لا يوجد في أى حشرة الآن بالضبط إلا أنه هو الأساس في كل تعريق ، وكل عرق له إسم خاص به كما أن كل

عرق له اختصار علمى دولى يعرف به ، والعروق حسب ترتيبها من الحافة الأمامية للجناح هى :

١ — Costa ورمزه (C) ويكون الحافة الأمامية السمكية للجناح ، وهو غير متفرع .

٢ — Subcosta ورمزه (SC) ويجرى دائما فى تجويف بين ال Costa وال Radius ، وهو متفرع إلى فرعين (Sc1 , Sc2) .

٣ — Radius ورمزه (R) وهو سميك ويتصل عند قاعدته بصفيحة إبطية ، وهو مقسم إلى فرعين رئيسيين هما R1 , Rs (Radial sector) ، والأخير مقسم غالبا إلى أربعة فروع (R2 - R5) .

٤ — Media ورمزه (M) ويتمفصل مع بعض صفائح الأضلاع الإبطية الوسطية الصغيرة ، وقاعدة هذا العرق دائما فى انخفاض ، وهو مقسم إلى أربعة أفرع هى (M1 - M4) .

٥ — Cubitus ورمزه (Cu) ويتمفصل أيضا مع الأضلاع الإبطية الوسطية ، وله فرعان رئيسيان هما Cu1 , Cu2 ، والجزء القاعدى من Cu2 يوجد فى انخفاض ، أما Cu1 فيجرب على طول درز Ridge وهو مقسم بدوره إلى فرعين Cu1a . Cu1b .


٦ — Cubital Furrow ورمزه (CF) وهو مكان ثابت ومعروف وعنده ينشئ الجناح . وهو ليس بعرق ولكنه مهم جدا فى تحديد ال Cubital veins ، ال Anal veins التى يفصل بينها .

٧ — Anal veins (A1 , A2 , A3 — ألتخ) وهى تكون مجموعة تتحد كلها أو تتقارب وتلتصق عند القاعدة . وتلازم هذه المجموعة الصفيحة الإبطية الثالثة .

٨ — Jugal Furrow وتفصل ال Anal Fold عن ال Jugal Fold والأخيرة بها عرقين قصيرين هما (J1 , J2) .

٩ — العروق العرضية Cross veins : وقد أعطيت أيضا أسماء محددة بنيت على أسماء العروق التى تصل بينها . وهذه العروق العرضية أيضا اختصارات ثابتة ولا تكتب إلا بالحروف الصغيرة باستمرار . وإذا وجد أكثر من عرق عرضى واحد بين عرقين طويلين فيضاف إلى العرق العرضى رقم يدل عليه مثل 2nd costa 3rd costa وهكذا . ويوجد عرق عرضى واحد يشذ عن هذه القاعدة هو العرق العرضى الواقع بين ال Costa (C) وال Subcosta (Sc) عند قاعدة الجناح فيسمى humeral ويرمز له بالرمز (h) . ويسمى العرق العرضى الذى يصل بين R1 , R2 باسم radia ويرمز له بالرمز (r)

أما العرق العرضي الذي يصل بين R3 , R4 فيسمى suctorial ويرمز له بالرمز (s) .
وفي رتبة حرشفية الأجنحة Lepidoptera ورتبة ترايكيترا Trichoptera تختزل العروق العرضية كثيرا .




شكل (٣٤) : التعريق النموذجي في جناح .

والجدول التالى يبين أسماء العروق العرضية الموجودة فى التعريق النموذجى للجنح .

رمز العرق العرضى	اسم العرق العرضى	العروق الطولية التى يصل بينها العرق العرضى
c	costal	Radius إلى Subcosta أو Costa
r	radial	فروع ال Radius
r - m	radio - medial	Media إلى Radius
m	medial	فروع ال Media
m - cu	medio - cubital	Cubitus إلى Media
cu	cubital	فروع ال Cubitus
cu - a	cubito - anal	Anal إلى Cubitus
a	anal	مختلف عروق ال Anals

تحورات الأجنحة :

تتحور الأجنحة (شكل ٣٥) فى الحشرات المختلفة حسب استعمالها ، ففى رتبة مستقيمة الأجنحة مثلا نجد أن الجناح الأمامى جلدى Leathery ويسمى Tegmina ولا يستعمل فى الطيران والجناح الخلفى فقط وهو غشائى Membranous رقيق يستعمل فى الطيران . وفى رتبة غشائية الأجنحة وغيرها من الرتب الأخرى نجد أن الأجنحة الأمامية والخلفية غشائية . والجناح الأمامى فى رتبة نصفية الأجنحة يسمى جناح نصفى Hemi-elytron or Hemelytron وفيه تكون الجهة القاعدية للجناح جلدية سمكية بينما يكون جزءه الطرفى غشائى رقيق . وفى رتبة غمدية الأجنحة (الخنافس) يكون الجناح الأمامى قرنى سميك Horny ولا يستعمل فى الطيران ويسمى Elytron . وتغطى الأجنحة الأمامية والخلفية فى رتبة غشائية الأجنحة بالحراشيف ولذا تسمى بالأجنحة الحرشفية Scaly . ويمثل الجناح الخلفى فى رتبة الذباب وذكور الحشرات القشرية من رتبة متشابهة الأجنحة بزايدة اسطوانية تسمى دبوس التوازن Haltere .




شكل (٣٥) : محورات الأجنحة في الحشرات .

آلة شبك الأجنحة : The Wing Coupling-apparatus

الأصل في منشأ الأجنحة أن يتحرك الجناح الأمامي حركة مستقلة عن الجناح الخلفي في كل جانب من جانبي الصدر ، ومازالت هذه الظاهرة باقية حتى الآن في الرعاشات . ولما ارتقت الحشرات اشتبك الجناح الأمامي مع الجناح الخلفي بواسطة آلة شبك الأجنحة وأصبحا يتحركان معا في وقت واحد ، ومن أجهزة شبك الأجنحة في الحشرات الأنواع الآتية :

١ — **Frenate or Frenulate Type** : ويوجد في كثير من أنواع الفراشات ويتكون من عدة شعرات أو أشواك قوية تختلف عددها من ١ في الذكر إلى ٢ — ٩ في الأنثى (شكل ١٣٦ ، ب) . وتسمى الشوكة الواحدة من هذه الأشواك فربيولم **Frenulum** ، وتوجد على الحافة الأمامية لقاعدة الجناح الخلفي ، وتشتبك هذه الشوكة (أو الأشواك) مع خصلة أو خصلتين من الشعر (في الأنثى) أو مع خطاف وأحيانا

مع خطاف وخصلة من الشعر أيضا (في الذكر) موجودة على السطح السفلي لقاعدة الجناح الأمامي ، وتسمى خصلة الشعر أو الخطاف Retinaculum .
 ٢ - Jugate Type : ويوجد في بعض أنواع الفراشات التابعة لعائلة Hepialidae ، فتخرج من الحافة الخلفية لقاعدة الجناح الأمامي زائدة (أو بروز) Jugum تمتد أسفل الجناح الخلفي (شكل ٣٦ ج -) .



شكل (٣٦) : آلة شبك الأجنحة في الحشرات .

٣ — **Hamulate Type** : ويوجد في الحشرات غشائية الأجنحة كالتل والنحل والزناير (شكل ٣٦ هـ) وكذلك في المن ، فيخرج من الحافة الأمامية للجناح الخلفى خطاطيف Hamuli تشتبك مع ثنية سميكة Frenal fold موجودة على الحافة الخلفية للجناح الأمامى .

٤ — **Clip Type** (عن توفيق ، ١٩٧٢) : ويوجد في حشرات رتبة نصفية الأجنحة حيث يوجد قابض شيتينى صلب أسفل الجناح الأمامى وبالقرب من منتصف حافته الداخلية (الخلفية) . ويتركب هذا القابض من نتوءين صغيرين موازيين لحافة الجناح ويميلان نحو الخلف ليقبضا أثناء الطيران على مرتفع ظاهر في الحافة الأمامية للجناح الخلفى . وينزل هذان النتوءان بسهولة في أخدود يقع أسفل هذا المرتفع ويتوازي مع هذه الحافة الأمامية للجناح الخلفى (شكل ٣٦ د) .

ميكانيكية الطيران :

تتأثر حركة الجناح أثناء الطيران (شكل ٣٧) بنوعين من العضلات هما :


١ — عضلات غير مباشرة : وهذه هي أكبر العضلات في جسم الحشرة وتتصل بالصدر فقط ولا تتصل بقاعدة الأجنحة . وتحرك هذه العضلات الجناح من أعلى إلى أسفل وبالعكس . والعضلات غير المباشرة نوعان :

(أ) عضلات طويلة تبتدىء من مقدم الصدر الأول وتنتهى عند مؤخرة الصدر الثالث .

(ب) عضلات عمودية (رأسية) وتتصل ما بين الترجة والاسترنة في كل من الصدر الثانى والثالث .

٢ — عضلات مباشرة : وهذا النوع من العضلات يحرك الجناح من الأمام إلى الخلف وهى تتصل ما بين البلورا والاسترنة وتتصل بقاعدة الجناح .

وطريقة الطيران في الحشرة هو أنه عند انقباض العضلات غير المباشرة العمودية تقترب الترجة من الاسترنة فيرتفع الجناحان (أ) ، وعند انقباض العضلات غير المباشرة الطولية ترتفع الترجة فينخفض تبعاً لذلك الجناحان (ج) . أما العضلات المباشرة المتصلة بقاعدة الجناح مباشرة فهى التى تحرك الجناح من الأمام إلى الخلف ، فعند انقباض هذه العضلات يرجع الجناحان إلى الخلف ، وعند انفراج العضلات يعود الجناحان إلى الأمام ثانية (ب) ، وهكذا .



شكل (٣٧) : رسم توضيحي للأوضاع المتعاقبة للأجنحة أثناء الطيران .

وتختلف الحشرات في سرعة طيرانها ، فبينما تصل خفقات (ضربات) الأجنحة في بعض أنواع أبو دقيق إلى ٥ أو ٦ في الثانية فانها تصل في بعضها إلى أكثر من ٢٠٠ خفقة في الثانية كما هو مبين في الجدول التالي :

جدول (٢) : خواص الطيران في بعض الحشرات

اسم الحشرة	عدد ضربات الجناح في الثانية	سرعة الطيران بالميل في الساعة	مسافة الطيران بالميل
نحلة العسل	٢٥٠	٧,٥	٢٩
الذباب المنزلي	١٩٠	٤,٥	—
الجراد الصحراوي	٢٠	٥,٦	٢١٧
الرعاش	٢٠	٢٢	—

ثالثا : البطن The Abdomen

وهو الجزء الثالث أو المنطقة الخلفية من جسم الحشرة . والبطن بسيطة التركيب نسبيا إذا ما قورنت بالصدر . وتتكون البطن أوليا من ١٢ حلقة ، ولكن لا توجد هذه الحالة إلا في رتبة برتيورا Protura وبعض الأطوار الجانبية فقط ، ولكن في العادة تتكون البطن من ١٠ — ١١ حلقة ، وفي حالات أخرى يحدث نقص كبير في عدد حلقات البطن كما في رتبة ذات الذنب القافر Collembola حيث تتكون البطن من ست حلقات فقط . وفي كثير من الحشرات تتحور الحلقات الأخيرة من البطن لتكون آلة السفاد في الذكر وآلة وضع البيض في الأنثى ، وفي مثل هذه الحالات تكون هذه الحلقات المتحورة مختفية دائما ومتداخلة داخل الحلقات التي تسبقها من الأمام .

وتتكون الحلقة البطنية النموذجية من الترجة (أو الصفيحة العلوية) والاسترنة (أو الصفيحة السفلية) وغشائين جانبيين (البلورا) يوصلان الترجة بالاسترنة . وفي الغالب يوجد على غشاء البلورا بكل جانب ثغر تنفسي ، وقد يوجد على غشاء البلورا أيضا في بعض البوقات والحشرات الكاملة بعض الصفائح التي تمثل بدون شك آثار صفائح تحت الحرقفة Subcoxal sclerites في الحلقة الأولى .

زوائد البطن The abdominal appendages

تقسم زوائد البطن إلى قسمين هما :

١ — زوائد لا تتصل بالتكاثر أو التناسل .


٢ — زوائد تتصل بالتكاثر أو التناسل .

١ — الزوائد التي لا تتصل بالتكاثر أو التناسل (شكل ٣٨) :

في كثير من الحشرات الكاملة نجد أن زوائد البطن غير موجودة ما عدا على الحلقات البطنية الأخيرة . وفي حشرات أولية قليلة توجد آثار أرجل مضمحلة ممثلة بملامس Styli كما في السمك الفضي (رتبة Thysanura) ، كما توجد على الحلقات البطنية الأولى والثالثة والرابعة في الكوليبولا زوائد لاصقة وقابضة وقافزة على التوالي .

أما زوائد الحلقة الحادية عشرة البطنية فتوجد في أغلب الحشرات وتمثل بالقرون الشرجية Cerci (شكل ٣٨) وهي زوائد حسية باللمس أو قد تصبح جزءا من آلة السفاد في الذكر كما في ذكور ذباب الكاديس Caddis flies (رتبة ترايكيترا) ، ويبدو

القرن الشرجي وكأنع تابع للحمقة العاشرة أو التاسعة البطنية إذا ما كانت الحلقة الحادية عشرة أو العاشرة البطنية مختزلة أو مضمحلة .



شكل (٣٨) : القرون الشرجية في بعض الرتب الحشرية.

وفي اليرقات والحوريات توجد زوائد بطنية كثيرة كأرجل يرقات رتبة حرشفية الأجنحة وخياشيم حوريات ذبابة مايو May Fly والزوائد الموجودة على جانبي الحلقات البطنية ليرقة Sialis التابعة لرتبة شبكية الأجنحة .

٢ — الزوائد التي تتصل بالتكاثر والتناسل :

وهي تشمل زوائد الحلقتين البطنيتين الثامنة والتاسعة في الأنثى Female والتاسعة البطنية فقط في الذكر Male .


(١) الزوائد التناسلية في الأنثى (آلة وضع البيض) (شكل ٣٩) : The

Ovipositor

تخلو بعض الحشرات كالحشرات الأولية والقمل والرعاشات من آلة وضع البيض فتفتح الفتحة التناسلية للخارج مباشرة أو في مجمع مع المستقيم . وفي الفراشات وأبي دقيق Lepidoptera وفي بعض الذباب لا توجد أيضا آلة وضع البيض بل تتداخل حلقات البطن الخلفية في بعض كالتلسكوب وتمتد عند وضع البيض . وفي حشرات رتبة مستقيمة الأجنحة إما أن تنطبق الثلاثة أزواج من الصمامات على بعضها مكونة آلة وضع البيض (شكل ٣٩) أو أن زوج الصمام الثاني (زوج الصمام الخلفي) أو العلوي يكون مرشدا قصيرا لوضع البيض . وتشبه آلة وضع البيض في بعض حشرات رتبة نصفية الأجنحة مثلتها في رتبة مستقيمة الأجنحة إلا أنها تتكون في رتبة نصفية الأجنحة من زوجين فقط من الصمامات تابعين للحلقتين البطنيتين الثامنة والتاسعة . وفي رتبة هذبية الأجنحة تكون آلة وضع البيض مضمحلة تقريبا في تحت رتبة Tubulifera (كما في ترس القرنفل) أما في تحت رتبة Terebrantia (كما في ترس القمح أو ترس القطن) فتتكون آلة وضع البيض من زوجين من الصمامات الرفيعة المنشارية يتبعان الحلقتين البطنيتين الثامنة والتاسعة . وفي رتبة غمدية الأجنحة تتكون آلة وضع البيض من زوائد استرنتي الحلقتين البطنيتين الثامنة والتاسعة ويوجد ملمسان Styli واضحان وقضيب شيتيني Rod مزدوج . وفي بعض حشرات رتبة غشائية الأجنحة تكون آلة وضع البيض عادية ومكونة من الثلاثة أزواج من الصمامات ولكن في البعض الآخر تتحور آلة وضع البيض للسع كما في النحل (شكل ٤٠) وبعض الزنابير .

وعلى العموم تتركب آلة وضع البيض النموذجية (شكل ٣٩) من ثلاثة أنصال Blades تسمى بالصمامات Valvulae ، زوج الصمام الأول (الأمامي أو السفلي) ويخرج من زوج من الصفائح Valvifers موجود على الاسترنة الثامنة البطنية ، وكل من

زوجي الصمامين الثامن (الخلفى أو العلوى) والثالث (الداخلى) فيخرج من زوج من الصفائح موجود على الأسترنة التاسعة البطنية . وربما يمثل كل صمام Valvula والصفائح التى يخرج منها Valvifer (وهى تمثل الصفائح القاعدية Coxopodite) الحلقات الطرفية Telopodite فى الحلقة النموذجية للحيوان المفصلي الأرجل .




شكل (٣٩) : (أ) منظر جانبي لنهاية بطن الصرصار الأمريكى .
 (ب) آلة وضع البيض فى الصرصار الأمريكى .
 (ج) قطاع عرضى لآلة وضع بيض الصرصار الأمريكى .

(ب) الزوائد التناسلية فى الذكر (آلة السفاد) (شكل ٤١ ، ٤٢) :



The Male Genitalia

تختلف آلة التلقيح الخارجية فى ذكور الحشرات فى التركيب من نوع إلى نوع مما جعل لها أهمية كبيرة فى تصنيف الحشرات ، كما تختلف أسماء أجزائها فى الرتب المختلفة وتبعاً لعالم التقسيم نفسه ، لهذا أخذت الأسماء المذكورة فى وصف تركيب آلة التلقيح

الخارجية عن العالم الحشري سندجراس (عن ديفي Davy ١٩٦٥ ، Snodgrass ، ١٩٣٥) وذلك منعا للالتباس .




شكل (٤٠) : (أ) آلة اللسع في شغالة نحلة العسل (منظر سفلي).
 (ب) قطاع عرضي في الغمد والرحيمة.
 (ج) آلة اللسع في شغالة نحلة العسل (منظر جانبي).



شكل (٤١) : رسم تخطيطي يوضح تطور الجهاز التناسلي الخارجي في الذكور.

- (أ) رتبة ذبابة مايو.
- (ب) السمك الفضي.
- (ج) رتب أخرى د، هـ.
- الرتب العليا.



شكل (٤٢) : آلة التلقيح في ذكر فراشة .

(أ) منظر جانبي .

(ب) منظر سفلي .

تنشأ آلة التلقيح الخارجية في ذكور الحشرات من نموين خارجيين Ectodermal من جدار الجسم على السطح السفلي لنهاية الاسترنة البطنية الثامنة للحورية أو اليرقة ، ويسمى هذان الهوان Phallic lobes وهما اللذان يكونان القضيبين Penes في رتبة ذبابة مايو Order Ephemeroptera حيث يفتح في طرف كل قضيب القناة التناسلية Genital duct الميزودرمية المنشأ (الوعاء الناقل) . وفي رتبة ذات الذنب الشعري Or. Thysanura يلتحم القضيبان المذكوران ليكونا قضيبا Penis وسطيا واحدا . أما في

الرتب الأخرى فينقسم كل من القضيبين السابق ذكرهما في رتبة ذبابة مايو انقساما طوليا وينتج عن كل فص ميزومير Mesomere للداخل وبارامير Paramere للخارج ، وتنشأ قناة قاذفة Ejaculatory duct كانبعاث للداخل من جدار الجسم أى Ectodermal بين فصى الميزومير لتتصل بالقناتين التناسليتين الميزودرميتين (أى الوعائين الناقلين) وحيث يفتح فى القناة القاذفة المذكورة غدد زائدة Accessory glands . ويلاحظ أنه فى رتبة مستقيمة الأجنحة Or. Orthoptera ينقسم كل من البارامير والميزومير عدة انقسامات وليس انقساما واحدا مما يجعل تركيب آلة التلقيح الخارجية معقدا فى الرتبة المذكورة . وفى الوقت نفسه نجد أنه فى الرتب الأعلى يلتحم زوج الميزومير لتكوين أنبوبة واحدة مجوفة تسمى Aedeagus مما يجعل القناة الداخلية للأنبوبة المذكورة والتي تسمى إندوفالس Endophallus امتدادا للقناة القاذفة ، وعندئذ توجد الفتحة التناسلية الخارجية الحقيقية Gonopore عند تلاقى القناة القاذفة بالاندوفالس ، بينما تسمى الفتحة الطرفية للـ Endophallus بالفالوتريم Phallotreme والذي يحدث بالفعل هو بروز أنبوبة الـ Endophallus إلى خارج الـ Aedeagus خلال فتحة الـ Phallotreme إلى أن تصبح فتحة الـ Gonopore موجودة عند الطرف النهائى الخارجى للـ Aedeagus ، أما عن زوج البارامير فغالبا ما يتحول إلى زوج من المقابض Claspers فى ذكور الحشرات .

الباب الرابع

الغدد أو أعضاء الإفراز

The Glands or Organs of Secretion

تتكون الغدد في الحشرات من خلية واحدة أو من عدة خلايا متخصصة في إفراز مواد تستعملها الحشرة داخل جسمها أو تطردها إلى خارج جسمها . ويوجد نوعان رئيسيان من الغدد المفترزة ، أولهما الغدد غير الصماء Exocrine glands وهي الغدد التي بها قناة يخرج عن طريقها الإفراز الغدى إلى خارج جسم الحشرة أو إلى فراغ جسمها من الداخل أو إلى القناة الداخلية لجهاز أو أكثر من أجهزة الحشرة الداخلية ، وثانيهما الغدد الصماء Endocrine glands وهي الغدد التي ليس لها قناة وإفرازها ، وهو الهرمونات ، ينتشر من خلال جدرانها إلى الدم الذي ينقله بدوره إلى أعضاء الجسم المختلفة .

وسنكتفى في هذا الباب بذكر الغدد غير الصماء وسنترك الكلام عن الغدد الصماء مع الجهاز العصبي السمبثاوى .

الغدد غير الصماء


The Exocrine Glands

قد تتكون الغدة غير الصماء من خلية واحدة تصب في قناة أو فتحة واحدة أو تكون مكونة من عدد محدود من الخلايا ولكنها مع ذلك تصب أيضا في فراغ أو قناة واحدة كما في شكل (٤٣ ج) ، أو قد يكون لكل خلية من الخلايا المكونة للغدة قناة تصب فيها الخلية إفرازها ويتجمع إفراز جميع خلايا الغدة في تجويف واحد ثم يخرج الإفراز الكلى إلى خارج الغدة خلال فتحة أو قناة واحدة .

وعلى العموم فالخلية في الغدة غير الصماء تكون عادة كبيرة الحجم ونواتها يعضاوية أو متفرعة ويحوى السيتوبلازم ميتوكوندريا وجهاز جولجى وحبيبات وفراغات ، وتغلف الغدة من الخارج بغشاء من نسيج ضام وتبطن من الداخل بالشيتين Intima .

ومن الأنواع الرئيسية التابعة لهذا النوع من الغدد هي غدد الشمع Wax Glands وغدد اللاك Lac Glands والغدد المجاورة للشعور للتنفسية Peristigmatic Glands

والغدد الموجودة في رأس الحشرة Cephalic glands وغدد الحرير Silk Glands والغدد الجاذبة الالاجنسية Attractant Glands والغدد الطاردة Repugnatorial Glands والغدد المفرزة للمواد السامة Poison Glands والغدد الزائدة التابعة للجهاز التناسلي في ذكر وأنثى الحشرات Accessory Glands .



شكل (٤٣) : (أ) الغدد الشمعية في شغالة نحلة العسل .
 (ب) قطاع طولي في خلية شمعية من خلايا الصفيحة الشمعية في من
 التفاح الرغبي .
 (ج) غدة عديدة الخلايا تصب كلها في قناة واحدة .

وستتكلم فيما يلى عن كل نوع من الأنواع المذكورة فيما عدا الغدد الزائدة فى الجهاز التناسلى والتى سنتناولها بالذكر عند شرح ووصف الجهاز التناسلى فى الحشرات .

١ — غدد الشمع : وهى الغدد المفرزة للشمع كما فى الحشرات القشرية التابعة لرتبة متشابهة الأجنحة Homoptera حيث يوجد بهذه الحشرات غدد وحيدة أو عديدة الخلية مبعثرة فى جهات متفرقة من جدار الجسم . ويفرز الشمع فى هذه الحشرات القشرية إما على شكل مسحوق دقيقى فوق جسم الحشرة أو على هيئة طبقات شمعية رقيقة . ويوجد ببعض أنواع المن (كما فى من النقاخ الزغبى Eriosoma lanigerum) غدد شمعية (شكل ٤٣ ب) ولو أنها فى الواقع غدد دهنية وليست شمعية تفرز الشمع على هيئة مسحوق أو على هيئة خيوط .

وفى شغالة نخلة العسل يتحور بعض خلايا هيودرمس استرنات الحلقات البطنية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى غدد شمعية (شكل ٤٣ أ) تفرز الشمع الذى يستعمله النحل فى بناء العيون السداسية ويستعمله الانسان فى أغراض نافعة مختلفة .


٢ — الغدد المفرزة لمادة اللاك : تفرز إناث الحشرة القشرية Laocifer laeca (التابعة لعائلة Lacciferidae) مادة اللاك بكميات وفيرة تكفى لتسويقها تجاريا على نطاق واسع . وتفرز الاناث هذه المادة كغطاء للحماية فوق أجسامها بواسطة خلايا غدنية موزعة فى جدار جسمها . وتتكون مادة اللاك كيميائيا من الراتنج Resin ومواد ملونة وشمع وبروتين ومواد أخرى .

٣ — الغدد المجاورة للشغور التنفسية : وهى توجد فى جميع يرقات الذباب مجاورة للشغور التنفسية ، وهى غدد هيودرمية مكونة من عدد من الخلايا الكبيرة والتى تصب إفرازها فى قناة الغدة التى تفتح للخارج بجوار الشغور التنفسى ، وفائدة إفرازها كما يذكر ريتشارد (Richard ، ١٩٥١) هو ترطيب الشغور التنفسى .

٤ — الغدد الموجودة فى رأس الحشرة : توجد برأس الحشرة غدد كثيرة منها الغدة الجبهية Frontal Gland الموجودة فى رتبة متساوية الأجنحة Isoptera ، وغدد قرون الاستشعار Antennal Glands التى لا يعرف وظائفها حتى الآن والتى توجد فى النحل والصرصار ، والغدد الفككية Mandibular Glands ، وغدد الفك السفلى Maxillary Glands ، وغدد الشفة السفلى Labial Glands وهى المعروفة عند اكثنا فى أغلب الحشرات باسم الغدد اللعابية Salivary Glands أو باسم غدد الحرير Silk Glands فى حشرات أخرى . وأخيرا يوجد برأس الحشرات غدد تسمى بالغدد المغذية Food

Glands كما في شغالة نخلة العسل . وستكلم بالتفصيل فيما يلي عن أهم هذه الغدد :

(١) غدد الفكوك العليا : وهي غدد تفتح عند أو قرب قاعدة الفك العلوى وذلك في الحشرات بسيطة التطور Apterygota وفي حشرات رتبة مستقيمة الأجنحة وغمدية الأجنحة وغشائية الأجنحة . وتكرر هذه الغدد في الحجم كثيرا في يرقات رتبة حرشفية الأجنحة (شكل ٤٤ ج) إذ أنها تقوم بإفراز اللعاب بدلا من غدد الشفة السفلى (أو الغدد اللعابية الحقيقية) التي أصبحت في مثل هذه اليرقات متخصصة في إفراز الحرير المكون لجدار الشرقة التي تحيط بالعذراء .



شكل (٤٤) : (أ) غدد الشفة السفلى في الصرصار الأمريكى (غدد لعابية) .

(ب) فص مكبر من فصوص الغدة اللعابية في الصرصار .

(ج) غدة الفك العلوى (غدة لعابية) في يرقة من رتبة حرشفية الأجنحة .

وفي ملكة نحلة العسل (رتبة غشائية الأجنحة) تفرز الغدد الفكية (شكل ١٤٥) نوعي من الإفرازات هما :

١ — oxodecenoic acid - 9 وعندما تلتصق الشغالة من فوق جسم الملكة يوقف نمو مبايضها كما يجعل الشغالة دائما تحيط بالملكة وكذلك يمنع الشغالة من بناء بيوت ملكات جديدة .

٢ — 9-hydroxydecenoic acid وهي مادة جاذبة جنسية تجذب ذكور النحل للحاق بالملكة وتلقيحها أثناء الطيران ، أما في شغالة نحلة العسل تفرز هذه الغدد الفكية مادة 2- heptanone عندما تلدغ الشغالة أى عدو لها لتبقى هذه المادة على جسم العدو لتمييزه بواسطة زملاء الشغالة الآخرين لتتبع هذا العدو ، كما تفرز الشغالة مادة Iso-amyl acetate من الغشاء بين الحلقات الموجودة عن قاعدة آلة اللسع لمساعدة المادة السابقة في تتبع العدو الذى لسعته الشغالة بواسطة زملائها ، هذا علما بأن المادة الأخيرة توجد في المادة اللاذعة التى تفرزها آلة اللسع نفسها . وفي النمل القاطع للأوراق Atta sexdens تفرز الغدد الفكية مادة سترال التربين Terpene citral فائدتها طرد الأعداء وتخدير أفراد المستعمرة وكذلك العمل على جمع شمل المستعمرة (وجلزوت ، ١٩٦٤) .

(ب) غدد الفكوك السفلى : في الحشرات الكاملة التابعة لرتبة ذات الذنب القافر ورتبة برتيورا وفي يرقات رتبة شبكية الأجنحة ورتبة غمدية الأجنحة توجد غدة أنبوبية الشكل تفتح عند أو قرب قاعدة الفك السفلى وفائدتها إفراز اللعاب أى أنها تعمل كغدة لعابية .

(ج) غدد الشفة السفلى : وهى الغدد اللعابية الحقيقية وتتكون من زوج من الغدد موجودة عادة في الصدر على جانبي القناة الهضمية الأممية ، وتتحد قناة كل غدة مع قناة الغدة الأخرى لتكونا سويا قناة مشتركة تفتح على الشفة السفلى قرب قاعدة اللسان .

وتوجد هذه الغدد في أغلب الرتب الحشرية ولو أن تركيبها يختلف من رتبة إلى أخرى . ففي رتبة مستقيمة الأجنحة تتكون الغدة الواحدة من عدد كبير من الفصوص وكل فص مكون من مجاميع من الخلايا الغدية ولكل غدة مخزن وتتحد قناتا الخزانين في قناة واحدة مشتركة وتنصب القناة المشتركة لقناتى الغدتين اللعابيتين في قناة الخزانين المشتركة (شكل ١٤٤) . وفي رتبة نصفية الأجنحة تتكون كل غدة من عدد قليل من الفصوص

(١ - ٤) . ولكل غدة خزان أيضا . وفي الحشرات الكاملة من رتبة حرشفية الأجنحة يوجد زوج واحد من هذه الغدد الأنبوية الشكل (شكل ٤٥ ب) . وفي رتبة الذباب نجد أن زوج هذه الغدد الأنبوية الشكل أيضا وقد يطول جدا حتى يزيد على طول جسم الحشرة بكثير كما في عائلة Muscidae . وفي نحلة العسل (رتبة غشائية الأجنحة) يوجد من الغدد اللعابية زوجان ، زوج في الرأس والآخر في الصدر ويصب الزوجان بفتحة واحدة مشتركة (شكل ٤٥ ج) .

والوظيفة الرئيسية لغدد الشفة السفلى هو إفراز اللعاب فيما عدا جميع أعمار الطور اليرق لرتبة حرشفية الأجنحة ورتبة تريكتيرا وكذلك في العمر الأخير ليرقات الزنابير التابعة لتحت رتبة سمفينا (من رتبة غشائية الأجنحة) حيث أن الغدد في هذه اليرقات المذكورة فائدتها إفراز الحرير فقط (كما هو مذكور في غدد الحرير) .

وعلى العموم فاللعاب إفراز مائي متعادل الحموضة وظيفته تسهيل مرور الطعام عند التغذية ، كما أنه يحوى بكثرة إنزيمى الأميليز الذى يحول النشا إلى مالتوز والانفرتيز الذى يحول السكروز إلى جلوكوز وفركتوز كما يحوى أيضا إنزيمى البروتير والليباز ولكن بنسب ضئيلة . وتحوى الغدد اللعابية في نحلة العسل إنزيم جلوكوز أكسيداز وظيفته تحويل الجلوكوز إلى حامض الجلوكونيك الذى لا تعرف وظيفته في النحلة . كما يحوى لعاب الحشرات نصفية ومتجانسة الأجنحة على إنزيم الدياستير وبروتين وكيتين وبروتين دهنى وجليكوبروتين . وتقوم هذه الانزيمات بهضم الطعام إما خارج جسم الحشرة أو داخل القناة الهضمية الأمامية . ويحتوى لعاب بعض (وليس كل) الحشرات التى تمتص دم الانسان والحيوان على مواد تسبب الألم للانسان عند امتصاص الحشرة لدمه . ويحوى لعاب الحشرات التابعة لعائلة Miridae (رتبة نصفية الأجنحة) والتى تتغذى على عصارة النباتات موادا لها تأثير سام على أنسجة النباتات . وتفرز الغدد اللعابية في ذكور رتبة ميكوبترا موادا تلتهمها الاناث أثناء التزاوج حيث تكون غدد الذكور اللعابية هذه متضخمة .

وتتكون الغدد اللعابية عامة سواء أكانت تابعة للفك العلوى أو السفلى أو الشفة السفلى من خلايا طلائية كبيرة تحيط بفرغ الغدة الداخلى وتبطن الخلايا من جهة الفراغ بطبقة من الشيتين تسمى انتيما Intima وتغلف من الخارج بغلاف بريتنى مكون من نسج ضام ، وتظهر المنطقة الداخلية من خلية الغدة اللعابية مخططة Striated .


(د) غدد الغذاء : Food or Hypopharyngeal glands

توجد في شغالة نخلة العسل غدتان — واحدة على كل جانب — في الرأس (شكل ٤٥ د) ، وتتكون كل غدة من عدة فصوص تصب في قناة رئيسية تنتهي على جانب الرأس بين اللسان والشفة السفلى . وتفرز الغدد المذكورة المادة المسماة بالغذاء الملكي Royal Jelly والذي تغذى به الشغالات اليرقات التي ستصبح ملكات طوال عمرها كيرقة وتغذى يرقات الشغالات لمدة الثلاثة أيام الأول فقط ، ويحتوى هذا الغذاء الملكي على ٤٠ ٪ مواد جافة كل مكوناتها بروتينات دهنية وجليسيريدات متعادلة وأحماض دهنية حرة وسكر وأحماض أمينية وإدينين Adenine وجوانوزين Guanosine وأدينوزين Adenosine وفوسفات أحادية Monophosphates وجميع أنواع فيتامين ب ومواد أخرى ، كما يحوى الغذاء الملكي على نسبة عالية من الاستيتال كولين (بنسبة ١ ملم / جرام) . والغذاء الملكي هذا غنى في حمض البنتوثونيك Pentothenic acid وحمض الفوليك Folic acid والبيوترين Piapterine . ويعزى للغذاء الملكي علاج بعض الأورام السرطانية والشيخوخة والاليميا عند الأطفال وبعض أمراض الجهاز العصبي وغيرها من الأمراض :

٥ — غدد الحرير : وكما سبق القول تفرز الغدد اللعابية في يرقات رتبة حرشفية الأجنحة ورتبة ترايكيترا ويرقات العمر الأخير لبعض حشرات رتبة غشائية الأجنحة (تحت رتبة سمفيتا) الحرير بدلا من اللعاب وذلك لتكوين الشرائق حول العذارى ، ويفرز الحرير من الغدة على هيئة خيط متين ومرن مكون من الفيبروين Fibroin الذى لا يذوب في الماء بنسبة ٧٥ ٪ ومحاط من الخارج بطبقة طلائية قابلة للذوبان في الماء هي السريسين Sericin بنسبة ٢٠ — ٢٥ ٪ ، والسريسين هذا ما هو إلا بروتين جيلاتيني ، أما عن الفيبروين فهو بروتينات مطاطة Elastic مثل الجليسين Glycine (٣٦ ٪) والألانين Alanin (٢١ ٪) والتيروسين Tyrosine (١٠ ٪) (تفرز الغدد المساعدة Lyonet's glands مواد تساعد على التصاق خيطى الحرير أو ربما لترطيبهما فقط) . وتفرز بعض يرقات رتبة شبكية الأجنحة الحرير من أنابيب ملبىجي ، كما يفرز هذا الحرير في حشرات رتبة اميوبترا Embioptera (شكل ٤٦) وفي ذكور حشرة Hilara sp. (عائلة Empidiidae من رتبة الذباب) من غدد هيودرمية موجودة في رسغ الأرجل الأمامية . ولاناث خنفساء Hydrophilus sp. (عائلة Carabidae من رتبة الخنافس) القدرة على إفراز شرنقة من الحرير حول البيض الذى تضعه وذلك بواسطة الغدد الزائدة التابعة لجهازها التناسلي .



شكل (٤٥) : (أ) غدة الفك العلوى فى ملكة نحلة العسل (غدة جاذبة جنسية).
 (ب) غدة الحرير فى يرقة من رتبة حرشفية الأجنحة.
 (ج) غدد لعابية فى رأس وصدر شغالة نحلة العسل.
 (د) غدة الغذاء الملكى فى رأس شغالة نحلة العسل.



شكل (٤٦) : (أ) غدة الحرير في رسغة حشرة Embia (رتبة Embioptera) .
 (ب) قطاع في جزء من حلقة (الرسغ الأولى في حشرة Anisembia
 texzana (رتبة Embioptera) .

٦ — الغدد الطاردة : تفرز كثير من الغدد الهيودرمية الموجودة في المناطق المختلفة لجسم الحشرة افرازات ذات روائح طاردة للحشرات الأخرى وبالأحرى فهي ذات وظائف دفاعية . فالغدد التي تفرز الروائح الكريهة والتي تقع بين بعض الترجات في حوريات بعض حشرات رتبة نصفية الأجنحة ومثيلاتها التي تفتح على بلورا الحلقة الصدرية الثالثة في بعض الحشرات الكاملة لنفس الرتبة هي من هذا النوع من الغدد . وفي رتبة غمدية الأجنحة توجد مثل هذه الغدد ولكنها تفتح قرب فتحة الشرج خاصة تحت رتبة أديفاجا . وفي يوقات رتبة حرشفية الأجنحة توجد غدد طاردة تفتح بين الأرجل الصدرية الأمامية .

ويفرز النطاظ Dictyophorus sp. مادة رغوية لها وظيفة طاردة من الثغور التنفسية أو من غدد خاصة .

وتتركب هذه الغدد هستولوجيا من خلايا طلائية عادية مغلقة من الخارج بغشاء من نسج ضام ومبطنة من الداخل بالشيتين (إنتيما) ، كما وأن السطح الداخلى للخلايا الطلائية والمجاور للانتيما مخطط Striated . كما هى الحالة فى خلايا الغدد اللعابية ، والنواة فى خلية الغدة الطاردة إما أن تكون عادية الشكل أو متفرعة .

٧ — الغدد الجاذبة الجنسية : تمتلك ذكور وإناث أبى دقيق والفراشات غددا تفرز رائحة لجذب الجنس الآخر لأجل التزاوج ، ويختلف شكل ومكان هذه الغدد باختلاف النوع والجنس ، ففي ذكور بعض الفراشات توجد حراشيف خاصة على الأجنحة تسمى Androconia توجد إما مجتمعة أو موزعة بين الحراشيف الأخرى (شكل ٤٧ أ) ، ويوجد عند قاعدة كل من هذه الحراشيف الخاصة خلية واحدة أو عدة خلايا غدية لافراز المادة الجاذبة الجنسية . وفى ذكور فراشات أخرى مثل Hepialus sp. ينتفخ ساق الرجل الخلفية ويحمل فوق المكان المنتفخ حراشيف خاصة توجد عند قواعد خلايا الغدية التى تفرز المادة الجاذبة الجنسية (شكل ٤٧ ب) ، وفى ذكور فراشات أخرى توجد هذه الغدد الجاذبة الجنسية على أماكن أخرى من الأرجل أو فى مؤخرة البطن .

وتفرز ذكور بعض أنواع النحل الانفرادى Bumble bees من جنس Bombus إفرازات من غدد فى الرأس وذلك عند أماكن تجمعها حتى تجذب إليها ذكورا أخرى من نفس النوع .

أما فى إناث الحشرات الكاملة فى أبى دقيق والفراشات فتوجد هذه الغدد التى تفرز المادة الجاذبة الجنسية إما على الأجنحة عند قواعد حراشيف خاصة أو فى مكان الغشاء بين الحلقات Intersegmental membrane الموجود بين الحلقتين الثامنة والتاسعة البطنيتين (شكل ٤٧ ب) .

هذا ولقد ثبت وجود هذه الغدد الجاذبة الجنسية فى أغلب الرتب الحشرية الآن (جاكوبسون ، ١٩٦٧) .

هذا وفيما يلى التركيب الكيماوى للمواد الجاذبة الجنسية للحشرات التى أمكن دراسة هذه المواد فيها (عن جاكوبسون ، ١٩٧٢) :

Periplaneta americana

١ — الصرصار الأمريكى

2,2- dimethyl - 3- isopropyl idenecyclopropyl propionate (1)

Anagasta kuhniella

٢ — فراشة دقيق حوض البحر الأبيض المتوسط

Cis - 9, trans - 12-tetradecadien - 1 -o1 acetate

: *Bombyx mori*

٣ — فراشة الحرير

a) trans-10, cis-12-tetradecadien-1 o1, 100

b) trans-10, cis-12- hexadecadien- 1-o1, 10-13

c) trans-10, cis-12-octadecadien 1-01, 10-6

Spodoptera eridania

٤ — الفراشة

a) cis-9, tetradecen -1-01 acetate

b) cis-9, trans-12-tetradecadien-1-01 acetate

Heliothis zea

٥ — فراشة الذرة الأمريكية

a) cis-9, tetradecen-1-01 acetate, 10-6'

b) trans-5-tetradecen-1-01 acetate 10-8

c) cis-7-tetradecen-1-01 acetate, 10-18

d) trans-7-tetradecen-1-01 acetate, 10-18

e) cis-9-tetradecen-1-01 acetate. 10-15

f) trans-9-tetradecen-1-01 acetate 10-3. cos-11

tetradecem-1-01-acetate.

Laspeyresia pomonella

٦ — فراشة ثمار التفاح :

trans-8, trans-10 dodecadien-1 -o1.

Pectinophora gossypiella

٧ — فراشة اللوز القرنفلية :

10- propyl-trans-5, 9-tridecadien-1 -o1 acetate (propylure)

Trichoplusia ni

٨ — الفراشة نصف القياسية

cis-7- dodecen-1 -o1 acetate

Plodia interpunctella

٩ — فراشة الدقيق الهندية

a) cis - 7 - tetradecen -1-o1 acetate

b) cis- 9- tetradecen- 1-o1 acetate

Ips confusus

١٠ — خنفساء القلف

a) (-)-2- methy 1-6 -methylene- 7-octen -4-o1, (+) -cis -verkenol

b) (+) - 2-methy 1-6- methylene- 2,7-octadien -4-o1.

Musca domestica

١١ — الذبابة المنزلية

cis- 9-tricosene (muscolure)

وعن Levinson وآخرون (١٩٨١) تفرز خنفساء السجائر *Lasioderma serricorne* مادتي *Serricornin* , *Anhydroserri cornin* بينما وجد شومان وآخرون (١٩٧٩) أن الأنثى تفرز مادة : *4,6- dimethyl- 7-hydroxynonan- 3-one* (والمسماه *Serriconin*) . ووجد Levinson وآخرون أيضا (١٩٨١) أن أنثى خنفساء السجائر تفرز كذلك مادة : *2,6- diethyl-3,5- dimethyl- 3,4- dihydro- 2- h- pyrane* ، وعن Levinson وآخرون كذلك (١٩٨٠) أن أنثى خنفساء الصعبد *Trogoderma granarium* تفرز مادة : *14- (Z)- and (E)- trogoderma methyl- 8-hexadecenal* (Levinson, Hoppe (١٩٧٩)) أشربة لاصقة تشبك بها أنبوبة بلاستيك صغيرة بها ٥٠ ميكروجرام من المادة الجاذبة الجنسية لفراشات البلح من عائلة *Phycitidae* (تكفي لمدة شهرين تقريبا) وتعلق تلك الأشربة في أسقف مخازن البقيق أو الشيكولاته أو التمر أو غيرها لجذب الفراشات التي تلتصق بالأشربة حتى يمكن اكتشاف وجودها ومعرفة أنواعها ومواعيد ظهورها ، والمادة الجاذبة التي توضع في الأنابيب البلاستيك هي : *(Z,E)- 9,12- tetradecadien- 1- ylacetate (TDA)* .

ولقد حظي إفراز هذا النوع من الغدد في إناث الحشرات بانتباه كثير من الحشريين والكيميائيين فقاموا بدراسات كثيرة لمعرفة تركيبة الكيماوى بل وحضروا الكثير منه صناعيا *Synthetically* في المعامل الكيماوية وبيع الآن في الأسواق بأسعار زهيدة . ويستعمل هذا الإفراز المحضر صناعيا بوضع كيماويات ضئيلة جدا داخل مصائد خاصة من الكرتون أو من الزجاج أو من البلاستيك وذلك لجذب الذكور كنوع من أنواع المقاومة الحيوية للحشرات .

والمواد الجاذبة الجنسية التي أمكن تحضيرها صناعيا هي كما يلي (Hall ،

: (١٩٦٣)

١ — ميثايل يوجينول *Methyl Eugenol* لجذب ذبابة الفاكهة الشرقية *Dacus*

. sp.

٢ — كيوليور *Cue - lure* لجذب ذبابة البطيخ *Dacus* sp.

٣ — أنيزايل أسيتون *Anisyl acetone* لجذب ذبابة البطيخ *Dacus* sp.

٤ — سيجلور *Sig lure* لجذب ذبابة حوض البحر الأبيض المتوسط المعروفة بذبابة

الفاكهة *Ceratitis capitata* .

٥ — مدلور *Med lure* لجذب ذبابة الفاكهة أيضا *C. capitata* .


- ٦ — تريمدلور Trimedclure لجذب ذبابة الفاكهة وذبابة Pteranderus sp .
 ٧ — جيبلور Gyplure لجذب فراشة الغجر Gypsy moth .
 ٨ — بوميكول Bombykol لجذب فراشة الحرير Bombyx mori .
 ٩ — هكسالور Hexalure لجذب فراشة دودة اللوز القرنفلية P. gossypiella .
 ١٠ — بوتاييل سوربيت Butyl sorbate لجذب Amphemallon majalis .
 ١١ — ميثايل ليولينت لجذب خنفساء القلف Ips sp. وخنفساء القلف Hyiurgops sp.

وليبيان رخص استعمال المواد المذكورة سابقا سنذكر للقارئ على سبيل المثال أن الرطل الواحد من مادة جيبلور Gyplure يباع تجاريا بمبلغ حوالى ٣٠ دولارا أمريكيا (أى ٣٥٠ قرش صاغ مصرى ، أو ١٠٠ ريال سعودى) علما بأن المصيدة الواحدة تحتاج فقط إلى ٠,٢٥ , ملليجرام ، وعلى هذا فالرطل الواحد من هذه المادة يكفى لأن يوضع فى ٥٠,٠٠٠ مصيدة كل عام ولمدة ٣٠٠ سنة متواصلة وينصح جاكوبسون (١٩٦٧) بإضافة أى مييد حشرى أو أية مادة معقمة كيميائية Chemosterilant إلى المادة الجاذبة الجنسية فى المصيدة لقتل أو لتعقيم ذكور الحشرات المنجذبة .

وينجذب الذكر للأنثى بواسطة قرن الاستشعار كما فى الفراشات وبعض الخنافس ، وفى خنافس أخرى تشتم الذكور إناثها بواسطة شعيرات خاصة موجودة على الملمس الفكى .

٨ — الغدد الجاذبة غير الجنسية : تفرز بعض الخنافس التى تعيش فى عشوش التمل العادى أو التمل الأبيض مواد ذات رائحة جذابة وذلك من غدد هيبودرمية خاصة موجودة عند قواعد مجاميع من الشعيرات المنتشرة على أجزاء مختلفة من جدار جسمها وذلك لجذب التمل . وتوجد عند نهاية بطون بعض يرقات عائلة Lycaenidae من رتبة حرشفية الأجنحة انتفاخات تحمل أشواكا فائدتها إفراز مادة جاذبة يلعبها التمل الذى تعيش معه هذه اليرقات .


ويوجد بمقدم ترجمة الحلقة البطنية السابعة فى شغالة نخلة العسل غدد تعرف بغدد ناسانوف Nassanoff تفرز رائحة خاصة (المركب الفعال فيها هو مادة الجيرانبول Genaniol ومعه حمض النيروليك Nerolic والجيرانيك Geranic لجذب زميلاتها الأخرى من الشغالة لجعلها تتجه إلى مكان معين غنى بالرحيق الزهرى (شكل ٤٨ ، ب) كما تعتبر وسيلة من وسائل إتصال أفراد الطائفة ببعضها البعض والتعرف على خلية الطائفة .



شكل (٤٧) : (أ) قطاع عرضي في جناح ذكر فراشة لبيان غدد الرائحة (غدد جاذبة جنسية).

(ب) الغدة الجاذبة الجنسية في نهاية بطن أنثى فراشة.

(ج) قطاع عرضي في نهاية ساق الرجل الخلفية في حشرة *Hepialus*



شكل (٤٨) : (أ) غدة الرائحة في نهاية بطن شغالة نحلة العسل.
 (ب) خلايا مكبرة من غدة الرائحة.
 (ج) غدة السم في شغالة نحلة.

٩ - الغدد السامة : توجد هذه الغدد في أنواع النحل والنحل والزناير وهي مرتبطة دائما مع أعضاء وضع البيض أو أعضاء اللسع (التي هي أعضاء وضع بيض متحورة) .
 وتتكون الغدد السامة في النحل من نوعين من الغدد هما :

(١) الغدد الحمضية Acid glands التي تفرز مزيجا من الإفرازات أهم مكوناتها حمض الفورميك ونوع من البروتين القاعدي (PH 8.7) المسمى بالمليتين Melittin

والذى له تأثير واضح على كرات الدم الحمراء ، وكذلك إنزيم الفوسفور ليباز Phospholipase A والمسمى أيضا Lecithinase والذى له تأثير ضعيف على الدم ، كما يوجد أيضا إنزيم الهيالورونيداز Hyaluronidase والذى له تأثير على السكريات فى الدم والتي تتأثر أيضا نظرا لوجود مواد ناشئة عن تفاعل حامض الستريك Citric acid الموجود فى الأنسجة . كما يوجد بافراز الغدد الحمضية حمض الايدروكلوريك وحمض الازثوفوسفوريك والهستامين والكولين والتريبتوفين . ومن العناصر يوجد فوسفات المغنسيوم والكبريت والنحاس والكالسيوم . ويعزى الألم عن لسع النحلة إلى أيقاف تحلل حامض اللكتيك .

وتفرز الأغشية الموجودة عند قواعد صفائح آلة اللسع فى شغالة نخلة العسل مادة Iso-amyl acetate وعند ترك المادة المذكورة فى مكان لدغ الفريسة تنجذب للفريسة شغالات أخرى للدغ هى الأخرى ، هذا علما بأن المادة المذكورة لا توجد فى إفرازات الغدة الحمضية لآلة اللسع .

ويحوى إفراز الغدد الحمضية فى الزنابير التابعة لعائلة Vespidae مادة الهستامين Histamine ومادة السيروتونين (5-hydroxy- tryptamine) Serotonin وإنزيم الهيالورونيداز وربما أيضا الأستاييل كولين .

وفى الزنابير الانفرادية مثل زنابير عائلة Sphecidae والتي عند لدغها لفريستها من العناكب أو يرقات رتبة حرشفية الأجنحة وجد أن العقد العصبية للفريسة تتحلل نتيجة للدغ مما يدل على أن مادة لسع الزنابير تحوى موادا لها تأثير سام على الجهاز العصبى Neurotoxic .

وتفرز الغدد الحمضية فى النمل Formica sp. حمض الفورميك Formic acid (الذى يكون نسبة تتراوح بين ٢١ — ٧١ ٪ من وزن الجسم الكلى) ، ويمكن للنمل المذكور قذف حمض الفورميك هذا لمسافة ٣٠ سم خارج جسمه ويمكنه عمل ذلك بشئ بطنه للأمام ورش السم المذكور فوق الجرح الذى يحدثه النمل بفريسته بواسطة فكوكه العليا .

(ب) الغدد القلوية Alkaline glands : ووظيفة إفرازها تسهيل حركة صفائح آلة اللسع وتنظيفها أو لحام غطاء (Cap) العيون السداسية عند تحول البقرة إلى عذراء أو عند ملئها بالعسل أو لصق البيض بقواعد أو جدران العيون السداسية .

ويوجد نوع آخر من أنواع الغدد السامة وذلك في كثير من يرقات رتبة حرشفية الأجنحة حيث توجد على سطح جسم هذه اليرقات أشواك أو شعيرات خاصة مجوفة تملك عند قواعدها غدد هيبيودرمية تفرز موادا سامة ، وعند كسر هذه الأشواك أو الشعيرات داخل جسم الانسان تنطلق المادة السامة الآتية من الغدد خلالها وتسبب آلاما وأوراما .

ومن الافرازات السامة التى تفرزها بعض الحشرات مادة الكنثارادين **Cantharadin** (ك ١ يد ٣ أ ٤) والذى تفرزها خنافس من عائلة **Meloidae** وتوجد المادة المذكورة فى دم هذه الحشرات وكذلك فى الغدد الزائدة للأجهزة التناسلية .

١٠ — الغدد الزائدة بالجهاز التناسلى : وسأتى ذكرها بالتفصيل مع الجهاز التناسلى .

الباب الخامس

الجهاز العصبي

The Nervous System

يتكون الجهاز العصبي في الحشرات من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي السطحي .

أولا : الجهاز العصبي المركزي

The Central Nervous System

ويتكون من سلسلة مزدوجة من المراكز الحسية المسماة بالعقد العصبية والمرتبطة ببعضها البعض بأعصاب طويلة مزدوجة تسمى Connectives (شكل ٤٩) ، كما وأن كل زوج من أزواج العقد العصبية يرتبط ببعضه البعض بأعصاب عرضية أيضا تسمى Commissures .

ويوجد في الحشرات الأولية عقدة عصبية مزدوجة في كل حلقة من حلقات الجسم تقريبا (شكل ٤٩) ، في حين أنه في الحشرات الراقية يقل عدد هذه العقد المزدوجة لدرجات متفاوتة نظرا لاتحادها مع بعضها البعض (شكل ٤٩ ب د) ، كما وأن زوج العقد العصبية (المكون للعقدة العصبية المزدوجة) قد اندمج في كل حلقة لدرجة كبيرة وبذلك لا ترى عندئذ الأعصاب العرضية ، وكذلك فإن الأعصاب الطولية ترى دائما زوجية في الحشرات الأولية في حين أنها في الحشرات الراقية تبدو وكأنها عصب واحد سميك .

ويتكون الجهاز العصبي المركزي من المخ والحبل العصبي البطني .


١ - المخ : (The Brain (or Supraoesophageal ganglion)

يقع المخ فوق المريء ويتكون من اتحاد ثلاثة أزواج من العقد العصبية وهي عقد الثلاث حلقات الأولى من جنين الحشرة ، ويبدو المخ ظاهريا مقسما إلى هذه الثلاث أزواج من العقد المذكورة (شكل ٥٠ ، ٥١) ويسمى الزوج الأول من العقد أو الجزء الأعلى من


المخ بالمخ الأول Protocerebrum وهو زوج عقد الحلقة الأولى أو الحلقة العينية من حلقات رأس الجنين وهو أكبر أجزاء المخ ، ويغذى بطبيعة الحال العيون المركبة والعيون البسيطة ، ويمتد كل من فصي هذا المخ الأول جانبيا ليكون فصا كبيرا هو الفص البصري Optic lobe وهو مركز أعضاء الابصار ، كما يعتبر أيضا مسئولاً عن سلوك الحشرة .

والزوج الثاني من العقد هو المخ الثاني Deutocerebrum وهو زوج عقد الحلقة الثانية من رأس الجنين ، ويوجد بالمخ الثاني مراكز الحس الخاصة بالشّم لذا يخرج من كل جانب عصب يذهب إلى قرن الاستشعار الموجود في جهته .

والزوج الثالث من العقد هو زوج عقد الحلقة الثالثة من حلقات رأس الجنين هو المخ الثالث Tritocerebrum وهو أصغر أجزاء المخ جميعا ويغذى الشفة العليا والقناة الهضمية الأمامية بالأعصاب ، ويتصل فصا هذا المخ الثالث بعصب يسمى Post-oesophageal commissure .



شكل (٤٩) : أشكال مختلفة للجهاز العصبي المركزي في بعض الحشرات .



شكل (٥٠) : منظر أمامي للمخ في الحشرات.


وعلى العموم فالمخ هو المكان الرئيسي للاحساس بالضوء وعلى هذا فإذا أزيل المخ أو قطعت رأس الحشرة فإنها تستطيع السير بل وحتى الطيران ولكنها لا تستطيع البحث عن طعامها . ولكن إذا وضع الأكل ملامسا لها فإنها تستطيع تناوله إذا كانت أجزاء فمها سليمة والعقدة تحت المرء التي تتحكم عصبيا في أجزاء الفم موجودة وسليمة . ولقد وجد كذلك أن المخ يسيطر ويتحكم في تنظيم وتوازن عمل العضلات الموجودة على جانبي الجسم ، وعلى هذا فإذا قطع المخ طوليا وأبعد أحد نصفيه فإن الحشرة لا تستطيع التحكم في العضلات في الجهة المنزوع منها نصف المخ بل تقوم الحشرة بحركات دائرية تجاه النصف الذي لم ينزع منه نصف مخه .


الحبل العصبي البطني : The Ventral nerve-cord

ويتكون من سلسلة من العقد العصبية المزدوجة الموجودة في الخط الوسطى السفلى للحشرة وتحت القناة الهضمية ويتصل بالجزء الثالث من المخ Tritocerebrum بواسطة زوج من الأعصاب هما الـ Para-oesophageal connectives . وأول عقدة من عقد الحبل العصبي البطني هي العقدة تحت المرء Sub-oesophageal ganglion المتكونة

من اتحاد أزواج عقد الحلقات الرأسية ٤ ، ٥ ، ٦ في الجنين وهي حلقات الفكين العلويين والفكين السفليين والشفة السفلى ، وعلى هذا فيخرج من هذه العقدة على الجانبين أعصاب تغذى هذه الاجزاء المذكورة من أجزاء الفم . وبلى العقدة تحت المريء ثلاث عقد صدرية ثم عدد من العقد العصبية البطنية تبلغ في أقصى عددها ثمانية . وليكن من المعلوم أن العقدة العصبية البطنية الأولى غالبا ما تتحد مع العقدة العصبية الصدرية الثالثة ، كذلك فإن العقدة العصبية البطنية الأخيرة هي في الواقع تمثل عقدة كبيرة مركبة أى مكونة مما لا يقل عن عقد الثلاث حلقات البطنية الأخيرة . وفي رتبة نصفية الأجنحة Hemiptera مثلا نجد أن العقدتين العصبيتين الصدرية الثانية والثالثة وجميع العقد العصبية البطنية اتحدت كلها في عقدة واحدة (شكل ٤٩ ج) ، وفي رتبة الذباب Diptera نجد أن العقد العصبية الصدرية والبطنية اتحدت كلها في عقدة واحدة مركبة (شكل ٤٩ د) . وتغذى العقد العصبية الصدرية الأرجل والأجنحة بينما نجد أن كل عقدة عصبية بطنية هي في الواقع مركز حسي موضعي مستقل يتركز فيه كل الاحساسات الخاصة بالحلقة البطنية الموجودة بها العقدة ، ومما يدل على ذلك أنه يمكن لبطن مفصولة من حشرة حية أن تضع بيضا طالما أن العقدة العصبية البطنية الأخيرة موجودة وهي العقدة المسئولة عن إمداد الحلقات البطنية التي تحتوى على الجهاز التناسلى بالأعصاب .



وتتكون العقدة العصبية (شكل ٥٣) من خلايا عصبية متخصصة Nerve cells (شكل ٥٣ ا) إحدى هذه الخلايا وتسمى Perineural cells والتي تحوى ميتوكوندريا Mitochondria كثيرة وتعمل كمخزن للجليكوجين تحيط بالعقدة كلها أسفل النسيج الضام المتين والمسمى باسم Neural lamella والذي يترسب في طبقات تأخذ اتجاهات مختلفة . والنوع الثانى من خلايا العقدة العصبية المتخصصة هو النوع المسمى Glial cells وهي خلايا غير عصبية (Non-nerve cells) وهي تعمل كمخزن للبروتينات والجليكوجين والدهون الذى تغذى به الخلايا العصبية وأعصابها ، وكل خلية غير عصبية تحيط بخلية عصبية Nerve cell or Neurone ، وتمتد زوائد الخلية الغير عصبية (Glial cell) دائما للداخل لتحيط بعصب الخلية العصبية (Sensory nerve) ، ويوجد من الخلايا الغير عصبية (Glial cells) أربعة أشكال مختلفة كما هو واضح في الشكل . هذا وتخرج من الخلايا الغير عصبية كذلك زوائد مفلطحة بها ميتوكوندريا ، وكثير من تلك الخلايا الغير عصبية يحيط بالحزمة العصبية المركزية Neuropile الموجودة في مركز العقدة العصبية مرسله زوائدها لتحيط بالنهايات الدقيقة للأعصاب المركزة داخل هذه الحزمة العصبية المركزية .





شكل (٥٢) : ثلاثة أشكال للخلايا العصبية (Neurons Nerve cells).

هذا وتحتوي كثير من العقد العصبية للحبل العصبى البطني بما فيها العقدة تحت المرىء خلايا عصبية خاصة مفرزة للهرمونات Neurohormones التي تؤثر على ضربات القلب وتقلصات الجهاز الهضمي والنشاط اليومي والموسمي للحشرة مثل الانسلاخ وتصلب جدار الحسم والتغير الفسيولوجي في اللون (تبعاً لتغير البيئة من حرارة ورطوبة وغيرهما كالذى يحدث عادة أثناء فترات التلقيح) وتوازن الماء وإفراز انزيم البروتينيز من المعدة . والهرمونات العصبية المذكورة من أصل بروتيني Peptide كما هو الحال في هرمون التنشيط Activation hormone ولو أن تأثير الهرمون الأخير يختلف عن تأثير تلك الهرمونات العصبية المذكورة .



شكل (٥٣) : (أ) خلية غير عصبية (Glial cell) موجودة بالعقدة العصبية .
 (ب) جزء من عقدة عصبية .

ثانيا : الجهاز العصبي الحشوى أو السمبثاوى The Visceral or Sympathetic Nervous System

ويتكون هذا الجهاز بدوره من الثلاثة أقسام التالية :

١ - الجهاز العصبي السمبثاوى المرئى : The Stomatogastric or Oesophageal Sympathetic Nervous System

وهو ينشأ فى الجنين من الجدار العلوى للقناة الهضمية الأمامية ، ويتكون كما فى (شكل ٥٤) من عقدة جبهية Frontal ganglion تقع أمام المخ مباشرة وتتصل بعصب على كل جانب يأتى من المخ الثالث Tritocerebrum (وجد فى بعض الحشرات عقدتان جبهيتان بدلا من عقدة واحدة) ، ويخرج من العقدة الجبهية عصب رئيسى هو العصب الراجع Recurrent nerve يمر للخلف فوق جدار المرئ وتحت

القلب ويتصل بقعدة عصبية وسطية تسمى بالعقدة خلف المخ Hypocerebral ganglion وذلك خلف المخ مباشرة ، ثم يستمر هذا العصب الراجع فى السير إلى الخلف لينتهى إما بعقدة عصبية واحدة تسمى بالعقدة الحشوية Ventricular ganglion موجودة عند اتصال الحوصلة بالمعدة (شكل ٥٤ أ) ، أو قد يتفرع هذا العصب الراجع بعد خروجه من عقدة خلف المخ إلى فرعين ينتهى كل منهما بعقدة حشوية على كل جانب من جانبي الحوصلة (شكل ٥٤ ب) . ويتصل بالعقدة خلف المخ كذلك على كل جانب عقدة تسمى Corpora cardiacum (CC) وهذه تتصل بدورها بعقدة أخرى تسمى Corpora allatum (CA) ، وتتصل عقدة ال Corpora cardiacum من الأمام بعصب يأتى من المخ الأول ، كما تتصل أيضا كل من عقدتي ال Corpora allata بالعقدة تحت المرئ بعصب ، كما ترسل كل من العقدتين الأخيرتين عصباً أو عصيين يسيران ملاصقان للجهاز الهضمى للاتصال بالعقدة الحشوية .

ويحوى الجهاز العصبي السمبثاوى أيضاً أعصاباً مستقبلية Sensory nerves وأخرى موصلة Motor nerves ، أى أن عقد هذا الجهاز تعمل أيضاً كعقد الحبل العصبي البطنى أى كمراكز حسية مستقلة ، ويغذى هذا الجهاز العصبي السمبثاوى القلب والقناة الهضمية الأمامية .


٢ - الجهاز العصبي السمبثاوي التلسمى : The Spiracular Symp. N.

System

ويتكون من أعصاب مستعرضة متصلة بكل عقدة عصبية من عقد الحبل العصبى البطنى (شكل ٥٤ ج) ، وفائدة هذه الأعصاب تغذية الثغور التنفسية الموجودة فى الحلقات البطنية الموجودة بها هذا الجهاز السمبثاوى المذكور ، وكما ذكر نوفاك (Novac ، ١٩٧٥) أنه يؤثر فى ضربات القلب وتكوين جدار الجسم والنشاط اليومى والموسمى للحشرة .

٣ - الجهاز العصبي السمبثاوي الطرفى :

وهى الأعصاب السمبثاوية التى تخرج من آخر عقدة عصبية لعمد الجهاز التماسلى والقناة المضمية الخلفية بالأعصاب السمبثاوية اللازمة (شكل ٥٥) .



شكل (٥٥) : الجهاز العصبي السمبثاوي الطرفى .

الغدد الصماء The Endocrine Glands

١ — عقد الـ CA , CC (شكل ٥٦ ب ، ٥٨) :

بين كازال (Cazal ، ١٩٤٨) أن نظام وترتيب عقدى الـ Corpora cardiaca والـ C. allata يتبع أربعة أشكال رئيسية ، وأضاف عليها هنتون (Hinton ، ١٩٥١) نوعا أو شكلا خامسا (وهو النوع الجانبي الوسطى) ، وهذه الأشكال الخمسة هي :

(أ) المركزى الجانبي : وفيه يلتحم زوج الـ CC تحت الأورطة ولكن يبقى زوج الـ CA منفصلا دون التحام وعلى جانبي الأورطة (شكل ٥٦ أ) ، ويوجد هذا النوع فى رتب ذبابة مايو والرعاشات ومستقيمة الأجنحة ومطبعة الأجنحة وميجالبترا Megaloptera وغشائية الأجنحة وطويلة الأجنحة وبعض الذباب من عائلات Psychodidae Culicidae .

وتختلف رتبة ذباب مايو عن باقى الرتب المذكورة فى أن عقدى الـ CA تتصل بالعقدة تحت المرىء بدلا من اتصالها بعقدى الـ C. cardiaca .


(ب) الجانبي المركزى : وفيه نجد أن زوج الـ CC منفصل ويوجد تحت الأورطة ، أما زوج الـ CA فملتحم ويوجد أيضا تحت الأورطة (شكل ٥٦ ب) ، ويوجد هذا النوع فى رتب جلدية الأجنحة وقمل الكتب .

(ج) الجانسي : وفيه يكون موقع زوجى عقد الـ CC , CA جانبيا بالنسبة للأورطة ، وكل عقدة من عقد الـ CC والـ CA توجد إما ملتحمة أو منفصلة على كل جانب من جانبي الأورطة . ويوجد هذا النوع فى رتب ذات الذنب الشعرى وبعض متشابهة الأجنحة وغمدية الأجنحة وشعرية الأجنحة وحرشفية الأجنحة والبراغيث وبعض الذباب (عائلة Tipulidae) (شكل ٥٦ ج) .

(د) المركزى : وفيه يوجد زوجا الـ CC , CA ملتحم تحت الأورطة كما فى رتبة Embioptera وكثير من رتبة نصفية الأجنحة (شكل ٥٦ د) .

(هـ) الحلقي : وفيه يوجد عقدى الـ CC ملتحما تحت الأورطة بينما يوجد زوج عقدى الـ CA فوق الأورطة كما فى بعض أنواع الذباب (تحت رتبة Cyclorrhapha وكذلك تحت رتبة Brachycera) (شكل ٥٦ هـ) .

وعلى العموم ففي صف الحشرات لا توجد عقدتا ال CC في رتبة ذات الذنب الشعرى ، بينما في رتبة الدبلورا *Diplura* وباقي الرتب الحشرية فيها كل من عقدتي ال (C. allata, C. cardiaca)



شكل (٥٦) : الاختلافات في ترتيب عقدتي ال Corpora cardiaca (CC) وال Corpora allata (CA) في الرتب الحشرية المختلفة .


غدة الصدر الأولى في الحشرات : The Prothoracic Gland

وهي تنشأ في الجنين من انبعاث للداخل من هيودرمس حلقة الشفة السفلى في الرأس ، وتوجد هذه الغدة في الحلقة الصدرية الأولى (شكل ٥٧ ، ٥٨) في الأطوار الغير كاملة لكثير من حشرات رتبة حرشفية الأجنحة والصراصير وغشائية الأجنحة والخنائس وميكيترا، وإن وجدت في الجهة السفلى من الرأس فإنه يطلق عليها اسم الغدة السفلية . Ventral gl.

كما هو الحال في رتب جلدية الأجنحة والسماك الفضي وذباب مايو والحشرات العضوية والرعاشات ومستقيمة الأجنحة ، وفي الأطوار الغير كاملة لبعض أنواع الذباب

توجد خلايا الغدة الصدرية مرتبطة مع خلايا الـ CA, CC حيث يكونون ثلاثتهم الأذرع الجانبية لحلقة وايزمان ، وتظهر خلاياها في حالة إفراز في أوقات الأنسلاخ . ولا توجد هذه الغدة في الحشرات الكاملة إلا في الحشرات التي تنسلخ فيه الحشرة الكاملة حيث تحوى مثل هذه الحشرات غدة الصدر الأمامى وعقدتى CA, CC في حلقة وايزمان . وتفرز خلايا خاصة مفرزة Neurosecretory cells موجودة في مقدم المخ الأول هرمونا منشطا Activation hormone ينبه غدد الصدر الأمامى ليجعلها تفرز بكثرة هرمونا يسمى (Ecdyson) Moulting hormone تجعل اليرقات تنسلخ أو تتطور وفي هذا الوقت بالذات يقل إفراز عقدتى الـ CA, CC والمسمى بهرمون الشباب Juvinile hormone . وليكن من المعلوم أن هرمون الأكدايزون هذا ينبه أيضا خلايا هيودرمس جدار الجسم لتكوين الكيوتيكل الجديد وإفراز سائل الأنسلاخ ، كما وأن هرمون الشباب مسئول أيضا عن فعالية الغدد الصدرية الامامية .

المصراصير



شكل (٥٧) : غدد الصدر الأمامى في أربعة رتب مختلفة من الرتب الحشرية .

٣ — حلقة وايزمان Weismann's Ring (شكل ٥٨ ب) :

في يرقات كثير من أنواع الذباب الذى يقع تحت رتبة سيكلورافا Cyclorrhapha لا يوجد الجهاز العصبى السبثاوى السابق وصفه بل يوجد بها بدلا منه حلقة تسمى حلقة وايزمان أو الغدة الحلقية Ring gland or Weismann's ring ينفذ منها الأورطة (كما فى الرسم). وتحتوى هذه الحلقة على ثلاثة أنواع من الخلايا أحدها يقوم بنفس وظيفة عقدتى الـ CC وثانيها وظيفته تشابه وظيفة عقدتى الـ CA والنوع الثالث عمله يشابه عمل غدة الصدر الأمامى فى الحشرات .

وتثبت حلقة وايزمان فى مكانها داخل جسم اليرقة بالقصببات الهوائية . هذا ولقد وجدت فى يرقات الذباب التابعة لتحت رتبة براكسرا Brachycera حالة وسطية بين الحالة العادية المذكورة فى الجهاز العصبى السبثاوى العادى والموجود فى يرقات الذباب التابعة لتحت رتبة نيماتوسيرا Nematocera وبين الحالة الموجودة فى يرقات الذباب التابعة لتحت رتبة سيكلورافا Cyclorrhapha والتى توجد بها حلقة وايزمان .

٤ — الغدد اللمفاوية : The Lymph Glands

وجد الشاتورى (١٩٥٥) وغريو ٥ — ٦ أزواج من الغدد ملتصقة بجدار الأورطة والقلب فى يرقة ذبابة الدروسوفيليا . وتتكون كل غدة منها من عدد قليل من الخلايا الكبيرة الحجم ، والخلية الواحدة شكلها كروى أو مثلثى وتحوى نواة واحدة وأحيانا نواتين وتحاط الغدة الواحدة كلها بنسيج ضام . وتختلف هذه الغدد بدون شك عن الخلايا المحيطة بالقلب والمعروفة فى الحشرات باسم الخلايا الجار قلبية Pericardial cells .

والغدد اللمفاوية من الغدد الصماء التى تفرز هرموناتها فى الدم وهذه الهرمونات تتحكم فى نمو براعم الحشرة الكاملة Imaginal buds الموجودة بالفعل فى طور اليرقة والتى ستكون الاعضاء المختلفة فى الحشرة الكاملة كالأجنحة والأرجل والأعين والصدر والبطن وغير ذلك .

٥ — الغدد السفلية فى الرأس : The Ventral Head - glands (شكل ٦٣)

وصف هذا النوع من الغدد العالم الحشرى Pflugfelder فى الحشرات العنصرية (Fam. Phasmidae) ، ولكنه ذكر أنها لا توجد فى حشرات رتبة نصفية الأجنحة (Hemiptera) وجميع الحشرات كاملة التطور (Holometabola) ، وهى تتلاشى فى الأيام الأولى من حياة الحشرة الكاملة (Adult) كما هو الحال فى غدتى الصدر الأمامى

(Prothoracic Glands) . ويسرع إفراز الغدد السفلية الرأسية المذكورة من عملية الانسلاخ كما هو الحال في إفراز غدتي الصدر الأمامي كذلك ، وتركيب الغدد السفلية المستولوجي يشابه تركيب غدتي الصدر الأمامي ، وإفرازاتها بروتينية تتحكم في إفراز هرمون الأكدايزون (هرمون الانسلاخ) الذي تفرزه غدتا الصدر الأمامي ، وربما تفرز تلك الغدد السفلية أيضا هرمونا مشابها لهرمون الأكدايزون هذا أو هرمونا يختلف عنه كلية .

٦ — الغدد الجار قلبية : The Pericardial glands (شكل ٦٣)

توجد هذه الغدد في أزواج عند مقدم الوعاء الظهري (Dorsal Vessel) وتشبه في تركيبها المستولوجي تركيب غدتي الصدر الأول ، ولقد وصف Pflugfelder تلك الغدد الجار قلبية بالتفصيل في الحشرات العصوية (١٩٣٨ — ١٩٤٩) .



٧ — غدد القصبات الهوائية : The Peritracheal glands

وصف هذه الغدد كل من Possompés (١٩٤٩ — ١٩٥٣) ، Thomson (١٩٥١) في بعض عائلات رتبة الذباب (Diptera) ، وإفرازاتها علاقة بعملية الانسلاخ ، كما يتشابه تركيبها المستولوجي مع تركيب غدتي الصدر الأمامي .

٨ — الغدد الصدرية العلوية في يرقات حرشفية الأجنحة :

The Dorsal thoracic glands

وجد كل من Hintze (١٩٦٨ — ١٩٦٩) ، Büchmann (١٩٦٧) زوجا من الغدد الصماء في المنطقة العلوية من كل من الخلفتين الصدريتين الأولى والثانية وذلك في بعض يرقات رتبة حرشفية الأجنحة ، وتسير كل من هاتين الغدتين في محاذاة القصبة الهوائية الظهرية الرئيسية الطولية ، ويتفرع الطرف الأمامي لكل من الغدتين المذكورتين إلى فرعين ليذهب أحدهما ليرتكز على Apodeme عضلات الفك العلوى لليرقة بينما يذهب الفرع الآخر ليتصل بعقدة ال Corpora allatum (شكل ٥٩ ب) ، وتشبه خلايا تلك الغدد الصدرية العلوية مثيلاتها في غدتي الصدر الأمامي ، ويعتقد أن لإفراز تلك الغدد الصدرية العلوية علاقة بعملية الانسلاخ في اليرقة . هذا وتزول الغدد الصدرية العلوية المذكورة تماما عند نهاية العمر اليرقي الأخير .



شكل (٥٨) : (أ) غدة الصدر الأمامي.
(ب) حلقة وايزمان في عذراء الذبابة *Eristalis*.

٩ — العضو المتفرع أو عضو (ر) : The Ramified (Branched) organ

اكتشف Lahargue (١٩٦٧) وجود أنسجة طويلة متصلة على هيئة خيوط متفرعة بكثرة بدون قناة داخلية في يرقة دودة الحرير *Bombyx mori* بجوار الثغور التنفسية وممتدة على جانبي اليرقة من الحلقة الصدرية الأمامية وحتى نهاية البطن بين الجسم الدهنى والقصبات الهوائية (شكل ١٥٩) . ويتكون كل فرع من أفرع نسيج العضو المذكور من صف واحد من الخلايا الكبيرة ذات النواة المتفرعة بخلاف نواة خلية الجسم الدهنى ، وتمتلئ خلية النسيج المذكور بالفراغات خاصة عند الانسلاخ . ويستمر وجود العضو المذكور أثناء طورى العذراء والحشرة الكاملة . ويعتقد العالم Bounhial (١٩٧١) أن عمل العضو المذكور قد يكون امتصاص هرمون الاكدايزون (وهو إفراز غدة الصدر الامامى) ثم يقوم بدوره بعد ذلك بتوزيعه على جميع أجزاء الجسم .



١٠ — الأعضاء الحلقية العصبية الدموية :

The metameric (Perisymphathetic) neurohaemal organs

لم يكن معروفا من الأعضاء الحلقية العصبية الدموية Metameric neurohaemal organs (perisymphathetic) خلاف عقدتى ال CC إلى أن اكتشفت العالمة راى (Raabe ، ١٩٦٥) ثخانات Thickenings موجودة في أزواج على الأفرع المستعرضة للجهاز العصبى السمبثاوى الحشوى الوسطى الخارجى من العقد العصبية للحلقات الصدرية والبطنية والتي تغذى الثغور التنفسية وبعض عضلات البلورا في الحشرتين *Clitummus extradentatus* ، *Carau sius morosus* (من رتبة الحشرات العنكبوتية) ، ثم بعد ذلك وجدت نفس العالمة ومساعدوها الأعضاء الحلقية العصبية الدموية في أغلب الرتب الحشرية .

وتميز تلك الأعضاء (شكل ٦٠) بلونها الأبيض المزرق اللامع (مشابهة في ذلك لون عقدتى ال CC) ، ويتركب العضو هستولوجيا من نسيج عصبى يحوى في مركزه أليافا عصبية متفرعة ويحاط من الخارج بالخلايا الغير عصبية المسماة بال Glial cells . ويتجمع إفراز تلك الأعضاء على سطحها الخارجى على هيئة Droplets يمكن صبغها بسهولة بصبغة الأزوكارمين ، ويعتقد أن هذا الإفراز يحوى بروتينات Peptides مع مجموعات إندول Indole ، بيرول Pyrrole . وتذكر العالمة راى Raabe أن إفرازات عقد الحبل العصبى البطنى Ventral nerve cord تتجمع في تلك المجمامع العصبية الدموية


ومنها تذهب تلك الافرازات إلى الدم حيث تؤثر تلك الافرازات على نبضات القلب وديغ
كيوتيكال جدار جسم الحشرة .




ب

شكل (٥٩) : (أ) عضو متفرع (Ramified) في يرقة الحرير .
(ب) غدة الصدر العلوية في يرقة Cirura vinula (رتبة حرشفية
الأجنحة).


Periplaneta
americana




Locusta
migratoria



Galleria
mellonella



Vespa
crabro



شكل (٦٠) : أربعة أشكال مختلفة للأعضاء الحلقية العصبية الدموية Metameric Nearohaemal Organs)

الهرمونات والجهاز العصبي (عن نوفاك Novak ، ١٩٧٥)

١ - هرمون المخ : Brain hormone

لاحظ كوبيك Kopec (١٩١٧) أنه عند إزالة المخ في بداية العمر اليرق الأخير لا يمكن لتلك اليرقة التحول إلى عذراء ، مما يشير إلى أن هناك افراز يؤثر على عملية الانسلاخ والتطور يفرز من المخ ، ويرجع الفضل في اكتشاف هذا الافراز أو الهرمون إلى العالم الحشرى وجلزورث Wigglesworth (١٩٣٤) والذي سماه هرمون الانسلاخ

Moulting hormone والمعروف حالياً باسم هرمون التنشيط (AH) Activation hormone . ويفرز هرمون المخ هذا من خلايا خاصة عصبية مفرزة Neurosecretory cells ، ويقوم بعملية تنشيط لغدق الصدر الأمامى Prothoracic glands (اللتان تفرزان هرمون الانسلاخ أو الإكدايزون) بالإضافة إلى عدة فوائد أخرى (سيأتى ذكرها فيما بعد) ولكن أهمها التحكم فى تنشيط أو تثبيط غدق ال Corpora allata (Girardie ، ١٩٦٤) أى أن هرمون المخ هذا هو الهرمون الذى يبدأ فى تنشيط غدق الصدر الأمامى وهو الهرمون الذى يتحكم فى إفرازات غدق ال C. allata هذا ولا بد من معرفة أن هرمون المخ لا بد وأن يمر خلال عقدق C. cardiaca قبل ذهابه إلى الدم حيث أن إفرازات العقدتين الأخيرتين تزيد فى نفس الوقت من تأثير هرمون المخ (أو هرمون التنشيط) . ويعتقد بعض العلماء أن هرمون التنشيط المذكور من أصل بروتينى Peptide ولو أن البعض الآخر يعتقد أنه من أصل دهنى Steroid . ووجد العالم Gersch (١٩٦٢) أن هرمون المخ (AH) يحوى عاملين (Factors) مختلفين ، أولهما AH^1 وفائدته تنشيط وتنبية جميع أنواع ال RNA ، فى حين أن ثانيهما AH^2 فهو يزيد من شفاية أغشية الخلايا ، كما يعمل العاملان المذكوران سوياً على تنبيه وتنشيط بعض الغدد لإنتاج إفرازاتها ، (مثل الغدد الزائدة فى الذكور والخلايا الطلائية المحيطة بفروع المبيض Follicular cells لتكوين البيض) وعملية التمثيل الغذائى (وذلك بالتأثير على إفراز إنزيم البروتينيز Proteinase فى المعدة وإنزيم الاستريز Esterase فى القناة الهضمية الخلفية) والتوازن المائى والسكون Diapause والتأثير على بعض الصفات المورفولوجية للحشرة (كطول الأجنحة) وعلى كمية الجليكوجين المخزنة فى الجسم الدهنى وعلى تكوين الأشكال Phase differentiation فى الجراد الصحراوى . ومن الممكن أن يكون كل من العامل الأول AH^1 والعامل الثانى AH^2 هرمونين مختلفين يقوم بإفراز كل منهما خلايا عصبية مختلفة .

وتتكون الخلايا العصبية المفرزة لهرمون المخ من مجموعتين وسطيتين ومجموعة أخرى على كل جانب من جانبي المخ الأول Protocerebrum (شكل ٦١) . وتتكون كل من المجموعتين الوسطيتين من ٤ — ١٥ خلية والخلايا لونها أبيض لبنى أو مزرق وتتصل بعصب بعقدق ال C. cardiaca وال C. allata الموجودتين على الجهة الأخرى من الجسم فى حين تتكون كل من المجموعتين الجانبيتين من ٢ — ٤ خلايا تتصل بعصب بال ca , cc الموجودة فى نفس الجهة من الجسم . هذا وتنقسم الخلايا العصبية المفرزة لهرمون المخ إلى أربعة أنواع تبعاً لاختلاف ألوانها عند صبغها مما يدل على أن كل نوع من

تلك الأنواع الأربعة له وظيفة إفرازية خاصة ، والأنواع الأربعة هي (شكل ٦٢) :

(أ) الخلايا أ (A cells) : وتصبغ باللون الأحمر القرمزي الداكن أو الأزرق الداكن عند صبغها بصبغة البارالد هيد فوكسين Paraldehyde fuchsin أو باللون الأزرق المسود عند صبغها بصبغة الكروم هيماتوكسيلين (جومورى) Gomori chrome haematoxylin (الخلايا الحية لونها أزرق مبيض لامع) ، وتحتوى الخلية حبيبات كثيرة كبيرة الحجم ، والخلية كمثوية الشكل أو غير منتظمة أحيانا ، وتوجد تلك الخلايا تحت غشاء النيرولما . هذا ولقد وجد أن إبعاد هذا النوع من الخلايا يقلل من خصوبة الحشرة ويؤخر — ولكن لا يمنع — وضع البيض كما تصغر: غدتا الـ ca في الحجم .

(ب) الخلايا ب (B cells) : وتصبغ باللون الأخضر أو الأخضر المزرق عند صبغها بصبغة البارالدهيد فوكسين وباللون الأحمر عند صبغها بصبغة جومورى كروم هيماتوكسيلين ، والخلية هنا أصغر من النوع الأول في الحجم وأقل انتظاما في الشكل من النوع الأول .

(ج) الخلايا جـ (C cells) : وتصبغ باللون الأحمر القرمزي عند صبغها بصبغة البارالدهيد فوكسين وباللون الأحمر عند صبغها بصبغة جومورى كروم هيماتوكسيلين . ويوجد هذا النوع من الخلايا مع خلايا النوع الثانى فى منطقة واحدة ، والخلية هنا فى هذا النوع الثالث غير منتظمة الشكل والسيتوبلازم مملوء بالحبيبات الدقيقة الكثيرة .

(د) الخلايا د (D cells) : السيتوبلازم فى هذا النوع مملوء بالحبيبات الدقيقة التى تصبغ باللون الأحمر القرمزي الفاتح بصبغة البارالدهيد فوكسين وباللون الأزرق المسود الفاتح بصبغة جومورى كروم هيماتوكسيلين ، الخلية هنا أكبر من النوع الأول .


٢ — هرمون الانسلاخ : Moulting hormone أو الأكديزون

(MH) Ecdyson


ويرجع اكتشافه إلى العالم الحشرى فوكودا Fukuda (١٩٤٠ — ١٩٤٢) إذ وجد أنه عند ربط يرقة دودة الحرير Bombyx mori من منتصفها فان النصف الأمامى لليرقة يتحول إلى عذراء. بينما يظل الجزء الخلفى على ما هو عليه مما يشير إلى أن هناك هرمونا يفرز من منطقة الصدر ويؤثر مباشرة فى عملية الانسلاخ عن طريق تأثيره على خلايا الابدريس، ومصدر هذا الهرمون هو غدتا الصدر الأمامى اللتان توجدان بالمنطقة السفلية الجانبية للحلقة الصدرية الأمامية فى يرقات الحشرات كاملة التطور أو مشابهاها مثل غدد القصبات الهوائية Peritracheal glands والغدد الجار قلبية Pericardial glands وغدد

الرأس السفلية Ventral head glands في الحشرات ناقصة التطور والتي سبق ذكرها ، بل وقد وجد الأكدايزون في برار بعض الحشرات كالجراد الصحراوى ودودة الحرير وذبابة الكاليفورا . *Calliphora sp.*

ولقد توسع وليامز Williams (١٩٤١ — ١٩٥٢) في دراسة هذا الهرمون كما عزله كبللورات نقية كيماويا العالمان Karlson ، Butenandt (١٩٥٤) وذلك من عذارى دودة الحرير *Bombyx mori* (انظر التركيب الكيماوى للأكدايزون في شكل ١٥) وبمقدار ٥ ملجم لكل ١٠٠ كجم من العذارى وقد شخص هذا الهرمون كيماويا كالأقى :
2,3,14,22,25- Pentathydroxy - 7- cholestene- 6-one .



شكل (٦١) : المخ والعقدة تحت المريء لبيان الخلايا المفرزة في مخ حشرة الكوليبولا .



شكل (٦٣) : الأماكن الرئيسية لإفراز الهرمونات في جسم الحشرة.

هذا وقد تمتد غدتا الصدر الأمامي في بعض الحشرات وغالبا ما يوجدان متصلان بالقصبه الهوائية الرئيسية الجانبية قرب الثغر التنفسي في الصدر الأمامي . وفي بعض أنواع البق الرودنيس (Rhodnius) توجد كل غدة من غدتى الصدر الأمامي على شكل سلاسل من الخلايا الشفافة داخل فصوص الجسم الدهنى ، وتشبه محتويات خلايا كل من غدتى الصدر الامامى محتويات خلايا عقدتى الـ Corpora cardiaca ويصغ السيتوبلازم فيها بأزرق الميثيلين أو بالأحمر المتعادل . وخلايا كل من غدتى الصدر الأمامى طويلة ذات زوائد برنشيمية ، وأحيانا توجد الخلايا بعيدة عن بعضها البعض ولكنها ترتبط مع بعضها بقنوات ، كما أن إفرازاتها ذات طبيعة دهنية Steroid . هذا وتضمحل الغدة

كلية في خلال عدة أيام بعد خروج الحشرة الكاملة . وتتأثر كل من غدق الصدر الأمامي بهرمون التنشيط (AH) بعد نحو ٣ ساعات من إفراز الهرمون الأخير والذي يؤثر بدوره في غدق الـ Corpora allata بعد نحو ٣ ساعات أخرى ، ويمكن من المعلوم أن هرمون الشباب (JH) يؤثر أيضا على غدق الصدر الأمامي وعلى غدق الـ C. allata . ولكل هذا التأثير يكون على غدق الـ C. allata قبل غدق الصدر الأمامي .

٣ — هرمون الشباب : Neotenin أو Juvenile hormone (JH)

ويرجع اكتشافه إلى العالم الحشرى وجلزورث Wigglesworth (١٩٣٥ — ١٩٣٦) وتفرضه عقدتا كل من الغدتين Corpora allata (ca) ، و Corpora cardiaca (cc) والعقدة الواحدة من غدق غدة الـ C. allata إما أن يكون شكلها مستديراً أو بيضاوياً أو مفلطحاً ومتصلة بعقدة غدة الـ cc الموجودة جهتها بعصب قد يكون طويلاً أو قصيراً أو قد تتصل عقدتا الغدتين ببعضهما البعض ، وتغلف العقدة بنسيج ضام وتكون من عدة أنواع من الخلايا بعضها فقط هي الخلايا المفرزة لهرمون الشباب .

ووجد أن الهرمون المستخلص من حشرة Hyalophora سائل يرتقلى اللون والعنصر الفعال في هذا السائل هو Farnesol ومشتقة الألديهيدى Farnesal وتشخيصه الكيماوى كالآتى :

Methyl trans trans, eis- 10- epoxy- 7- ethyl- 3,11, dimethyl- 2,6- tridecadienoate.

ولقد وجد أكثر من نوع من هرمون الشباب في الحشرات ، واطلق عليها اسماء JH I ، JH II ، JH III ، والهرمون الأول والثاني عبارة عن هرمونات تركيبية (Morphogenetic) بينما الثالث فله وظيفة تناسلية (انظر الدكرزلى ، ١٩٨٢) .

وبالإضافة إلى العديد من الفوائد لهذا الهرمون مثل نمو المبايض في الاناث وبالتالي التأثير في كمية البيض التى تضعها الاناث وكذلك تنشيط عمل عضلات جدار القلب ، فانه يؤثر على عملية الانسلاخ عن طريق تأثيره على خلايا ابدرمس جدار الجسم التى تستجيب لمحصلة التوازن بين الأكدايزون (MH) وهرمون الشباب (JH) إذ أن هرمون الشباب يزداد في بداية العمر اليرق الواحد ويقل في نهايته أما الأكدايزون فانه يزيد عند نهاية العمر اليرق ، والتوازن بين الهرمون يؤثر في نوع الطور الناتج عن عملية الانسلاخ .

أما عن عقدتي الـ Corpora cardiaca (cc) فتحوى إفرازى هرمون التنشيط AH^1 , AH^2 ومواد أخرى عديدة البروتينات Polypeptides .

هذا وابتداء من عام ١٩٦٦ بدأ إنتاج مواد لها فاعلية هرمون الاكدايزون تسمى Ecdysoides (مثل مواد B - ecdyson الموجودة فى الحيوانات القشرية ، Ponasterone الموجودة فى النباتات السرخسية 20- hydroxysteroides, Ferns المحضرة صناعيا كمواد أخرى لها فاعلية مواد هرمون الشباب Juvenoids المستخرجة من أنسجة النباتات والحيوانات مثل مادة Farnesal (ذات الأصل النباتى) وذلك من مصادر أخرى خلاف الحشرات وهى النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة أو بتحضيرها صناعيا Synthetically ، ويتنظر فى القريب إنتاج مواد شبيهة فى مفعولها بمفعول هرمون التنشيط وذلك من بعض الحيوانات الفقرية .

٤ — الهرمونات الأولية : Pre- or Proto- hormones

وهى هرمونات تؤثر فى نفس الغدة التى أفرزتها وبذلك تختلف عن الهرمونات الأخرى التى تنتقل عن طريق سوائل الجسم بعد إفرازها من غددها لتؤثر فى أجهزة بعيدة عن تلك الغدد المفرزة ، ويوجد نوعان من تلك الهرمونات الأولية هى :

(١) The neurohumoral factors : وهى إفرازات الخلايا العصبية نفسها مثل مواد الأسيتايل كولين Acetylcholine (تعادل كميتها فى الصرصار ١٥ مرة مثيلتها فى الفقرات) ، Noradrenaline الموجودة عند نهايات الأعصاب Synapses ، ويطلق عليها اسم هرمونات لأنها إفرازات من خلايا معينة ولها تأثير فسيولوجى داخل العضو المفرز نفسه .

هذا كما يوجد أيضا إنزيم Acetylcholinesterase بكميات كبيرة داخل الخلايا العصبية المفرزة وكذلك عند نهايات الأعصاب Synapses وفى غلاف العقدة العصبية وفى الخلايا العصبية الغير مفرزة Glial cells ، ويحمى هذا الإنزيم الجهاز العصبى المركزى من دخول مادة الأسيتايل كولين Acetylcholine من الخارج ، ويبدأ ظهور هذا الإنزيم فى الجنين مع ظهور الخلايا العصبية الأولية Neuroblasts فى البيضة المخصبة .

وخلاف الفقرات فإن هذا الإنزيم لا يوجد فى الحشرات فى نهايات الأعصاب التى تغذى العضلات وعلى ذلك فهو لا ينقل التأثير العصبى للعضلات .

كما توجد مادة السيروتونين Serotonin (5 - hydroxytryptamine) بكميات لا بأس بها في العقد العصبية للحشرات وفي عقدى ال CC وربما تفرز من خلايا عصبية خاصة بها ولها فوائد منبهة أو مثبطة في أنسجة مختلفة من أنسجة الجسم في الحشرات مثل تنشيط ضربات القلب وتقلصات القناة الهضمية في الصرصار الأمريكى وتنبيه أو تثبيط نقل الأحساس العصبى للعضلات Neuromuscular transmission وإسراع عملية الطيران الليلية في الفراشات وتنبيه عمليات الإفراز في الغدد اللعابية في ذبابة الكاليفورا Calliphora ، هذا ولقد وجدت المادة المذكورة في قلب الجراد الصحراوى وعقده العصبية .

أما عن مواد ال Cate Cholamines فلقد وجدت أيضا في الحشرات حيث توجد بكثرة مادة الدوبامين Dopamine (3 - hydroxytyramine) كما توجد بقلّة مادتي الأدرينالين Adrenaline ، النورادرينالين Noradrenaline وتنشط المواد المذكورة الجهاز العصبى المركزى في الصرصور ويعقب هذا التنشيط غلق نهايات الأعصاب Synapses ، كما أن لها تأثير عكسى على ضربات القلب وتقلصات القناة الهضمية وأنايب ملبىجي وقتوات المبيض .

(ب) هرمونات العوامل الوراثية Gene hormones : والتي تعتمد في إفرازها على جينات معينة وتؤثر على صفات وراثية معينة . وفي الواقع فإن مادة RNA (الرسول) والمسئولة عن تكوين الهرمونات المذكورة هى نفسها الهرمون الوراثى Gene hormone وهذا الهرمون مسئول عن ظهور اللون الأسود في العين المركبة لفراشة الدقيق Anagasta Kühniella ، وألوان العيون المركبة في ذبابة الدروسوفيلا . والتركيب الكيماوى لهذا الهرمون هو مادة L - Kynurenine وتتكون تلك المادة عند تأكسد الحامض الأميى ترتوفينى Tryptophane بالانزيمات .

هذا وقد وجد هرمون جينى آخر يتحكم في عدد العينات (Ommatidia) Facets في العين المركبة لذبابة الدروسوفيلا اذ يجعل عدد العينات في بعض الذباب ٥٠ — ٦٠ عينة فقط بدلا من ٦٠٠ — ٦٥٠ عينة ، ولم يعرف التركيب الكيماوى لهذا الهرمون حتى الآن ولكن يحدث هذا الهرمون نفس التأثير الذى يحدث عن استخدام مواد مثل الهستيدين Histidine ، والكرياتين Creatine ، وال Methyl hydantion .


ثالثا : الجهاز العصبي السطحي : The peripheral nervous system

وهو مكون من خلايا حسية Sensory cells كثيرة مستطيلة الشكل منتشرة تحت جدار جسم الحشرة ويخرج من كل من هذه الخلايا أعصاب حسية هي في الواقع أعصاب مستقبلية Sensory nerves . وتتجمع كل مجموعة من هذه الأعصاب بعد مسافة ما داخل جسم الحشرة في عصب واحد مثلا يتصل بدوره بأى عصب رئيسي ذاهب إلى أحد عقد الحبل العصبي البطنى أو الجهاز العصبي السمبثاوى .

رابعا : أعضاء الحس : The Sense Organs

من خواص الحشرات قدرتها على تكيف أفعالها حسب ظروف البيئة المحيطة بها ، ويمكن للحشرات ذلك لأنها تملك مجاميعا من الخلايا على سطحها الخارجى تتأثر بهذه المؤثرات الخارجية ، وتعرف هذه المجاميع المذكورة بأعضاء الحس Sense organs . وتخرج من الخلايا الحسية المستقبلية Sensory cells والتي تستقبل المؤثرات الحسية الخارجية والمكونة لعضو الحس أعصاب تسمى بالأعصاب المستقبلية Sensory nerves تمتد لداخل الجسم لتذهب إلى الجهاز العصبي المركزى . وتوجد مجموعة أخرى من الأعصاب الموصلة Motor nerves ولكنها تخرج من خلايا موجودة بعقد الحبل العصبي المركزى نفسها وتذهب إلى عضلات الجسم وأعضائه المختلفة . وتوجد مجموعة ثالثة وسطية تسمى بالأعصاب الرابطة Association nerves تصل نهايات الأعصاب المستقبلية بجذور الأعصاب الموصلة وذلك داخل عقد الجهاز العصبي المركزى كولو أن الأعصاب الطويلة Axons لهذه الخلايا الرابطة تعبر الأعصاب الموصلة بين العقد العصبية Commissures لتنتهى ، وهذه الطريقة توجد دائرة مستمرة بين أعضاء الحس الموجودة على السطح الخارجى لجسم الحشرة والتي تستقبل المؤثرات الخارجية وتوصلها إلى عقد الحبل العصبي المركزى ثم خروج هذه الإشارة المرسله من عقد الحبل العصبي المركزى إلى الجهاز الذى يراد منه أن يستجيب لهذه المؤثرات الخارجية فيؤدى هذا الجهاز الأخير عمله المطلوب من إفرازات وغير ذلك من الأعمال (شكل ٦٤) .

وجميع مكونات الجهاز العصبي اكنودرمية Ectodermal ، وتحاط جميع الأعصاب والمخ وكذلك العقد العصبية من الخارج بغلاف من نسيج ضام يسمى Perineurium .



شكل (٦٤) : رسم يوضح انعكاس المؤثر خلال الخلايا العصبية.

وعلى هذا فكل عقدة من عقد الجهاز العصبي تحتوى على سطحها الخارجى على تجمعات من الخلايا العصبية بعضها خلايا موصلة والبعض الآخر خلايا رابطة وفى مركز العقدة توجد كتلة من الألياف العصبية ، ويوجد خلاف ذلك خلايا أخرى متفرعة ذات شكل غير منتظم .

وتنقسم أعضاء الحس فى الحشرات عموما إلى أربعة أقسام وهى :

١ - أعضاء حس ميكانيكية Mechanoreceptors ومنها أعضاء الحس باللمس Touch أو الضغط Tension وأعضاء حسية تتأثر بالموجات الصوتية Sound والتوازن Balance .

٢ - أعضاء الحس الكيماوية Chemoreceptors : كأعضاء الشم Smell والذوق Taste .


٣ - أعضاء الحس الضوئية Photoreceptors : كالعيون البسيطة والعيون المركبة .

٤ - أعضاء حسية تتأثر بالتغيرات فى الحرارة والرطوبة :

أعضاء الحس الميكانيكية :

نظرا إلى صلابة جدار جسم الحشرة فلقد زودت معظم الشعرات المغطية له بخلايا حسية عند قواعدھا ، ويخرج من هذه الخلايا أعصاب الحس التى تذهب إلى الجهاز العصبى المركزى . وتتأثر هذه الشعرات بالطبع بالهواء أو بالتيارات المختلفة أو باللمس أو بغيره . وعلى هذا فتعتبر الشعرة والخلية (أو عدة خلايا) الحسية الموجودة أسفلھا

والعصب الخارج من هذه الخلية بعضو الحس Sense organ باللمس أو بالضغط .
ومثل هذه الشعرات الحسية موجودة ومنتشرة على جسم الحشرة كلها وزوائد وكذا
على قرون الاستشعار . وليكن من المعلوم أن بعض هذه الشعرات الحسية تتأثر بالموجات
الصوتية Sound waves أى تعمل كأعضاء سمع .



شكل (٦٥) : عضو شم من قرن استشعار نطااط (Basiconic peg).

Organs of Equilibrium : أعضاء التوازن في الحشرات

تمتلك بعض الحشرات أعضاء حس خاصة تمكنها من التحكم في حسها واتجاه جسمها أثناء سيرها على الأرض أو أثناء حركتها في الماء إذا كانت من الحشرات المائية أو أثناء طيرانها .

فيوجد في نهاية بطن يرقة Ephelia كيسان ، كل كيس (شكل ٦٦ ج) يحتوى على شعرات حسية وحبيبات . ويمتلئ داخل هذا الكيس بالماء إذا كانت اليرقة متجهة في الماء إلى أسفل ويفرغ إذا كانت متجهة جهة السطح ، وعلى هذا فعند امتلائه تسقط الحبيبات على الشعرات الحسية وعند تفريغه تبتعد تلك الحبيبات عن الشعرات ثانية ، ومن هذا يمكن لليرقة المذكورة الاحساس باتجاهها داخل الماء عن طريق الجهاز المذكور .

وفي بعض حشرات رتبة نصفية الأجنحة يوجد بجانب كل من خطى الثغور التنفسية على كل من جانبي الجسم شعيرات حسية حيث يكثر وجود الهواء المستمر مع مثيله الموجود داخل القصبات الهوائية ، وعلى هذا فأى حركة للحشرة داخل الماء يتسبب عنها تغير في الضغط الذى تشعر به وتسجله هذه الشعرات الحسية ، وبما أن هذا الضغط يزداد أو يقل تبعاً لعمق الحشرة في الماء ، إذن فمن الممكن للحشرة أن تعرف اتجاهها وموقعها داخل الماء بواسطة هذا الجهاز المذكور .

والحشرة الكاملة Aphelocheirus بخلاف أكثر الحشرات المائية الأخرى ، أثقل من الماء ولا يمكنها تخزين فقاعات الهواء تحت الشعر الذى يغطى جسمها ، ولكن يمكن لهذه الحشرة معرفة اتجاه حركتها في الماء إذ أنها تمتلك زوجاً من الانخفاضات على الاسترنة البطنية الثانية بجوار زوج الثغور التنفسية لهذه الحلقة ، وعلى كل انخفاض توجد شعيرات تحمل كل شعرة فيلماً من الهواء وذلك بمعدل ٦٠,٠٠٠ شعرة على المليمتر المربع الواحد ، وبين الشعيرات المذكورة توجد شعيرات حساسة تتحرك كلما تغير الضغط الموجود عند نقطة تقابل فقاعات الهواء بالماء .

والشعيرات الحسية المختلفة الموجودة على الأجنحة والمتركة في الغالب عند قواعد العرقين Radius, Subcosta (ولو أنها قد توجد أيضاً على أطراف الأجنحة) هى في الغالب شعيرات تساعد الحشرة في ضبط توازنها أثناء الطيران كبل وثبت وجود علاقة مطردة بين عدد هذه الشعيرات على الأجنحة وبين القدرة على التوازن . ولقد تركزت حاسة التوازن هذه أثناء الطيران في أغلب رتبة الذباب في دبوس التوازن Haltere (شكل ٦٦ أ ، ب) ، ويمكن لذباب مسرى Family Tabanidae الطيران بدون دبوس التوازن بخلاف الذباب التابع لعائلة Family Calliphoridae الذى لا يمكنه الاحتفاظ بتوازنه أثناء طيرانه إذا ما نزع منه دبائيس التوازن (شكل ٦٧) .

٢ — أعضاء الحس الكيماوية : أما الأعضاء الحسية الخاصة بالشم Olfactory والذوق Taste فهى عبارة عن شعيرات رقيقة الجدر قصيرة نوعاً ومميكة ولذا فيطلق عليها

اسم Peg-Like (شكل ٦٥) أو على شكل أطباق حسية Sense plates (شكل ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠) ولثل هذه الشعيرات أو الأطباق الحسية القدرة على التأثر بالمواد الموجودة في السوائل (الذوق) أو في الهواء (الشم) . وكل شعيرة من هذه الشعيرات أو كل طبق حسي تغذيها خلايا عصبية أسفلها وترسل هذه الخلايا لأعلى عصباً رفيعاً يمتد بداخل الشعيرة . وتوجد أعضاء الحس الشمية على قرون الاستشعار ، أما أعضاء الحس بالذوق فهي موجودة على أجزاء الحشرة الكبيرة من الفم كسقف الحلق والملاصق الفككية والشفوية وغيرها ، وتستطيع بعض الحشرات أن تحس الذوق بقرون استشعارها بل ويرسغ أرجلها .

وعلى العموم فبدراسة سطح قرن الاستشعار من الخارج يلاحظ أن أكثر أعضاء الحس المنتشرة على سطحه هي على شكل اسطوانات أو صفائح حسية ببيضاوية تسمى Sense plates أو Sensillae ويوجد أسفل كل صفيحة من هذه الصفائح مجموعة من الخلايا العصبية فائدتها شمية كذلك . وفي نحلة العسل أمكن حصر عدد ٥ - ٦ آلاف صفيحة من الصفائح الحسية المذكورة على شمروخ الشغالة ، ٢ - ٣ آلاف على شمروخ الملكة في حين أنه وجد منها حوالى ٣٠ ألف على شمروخ الذكر .


وفائدة أعضاء الشم الحسية هامة لحياة الحشرة إذ بواسطتها تستدل على أماكن غذائها ، وبواسطتها أيضاً تستطيع الأنثى العثور على مكان ملائم لوضع البيض ، كما وأن الذكر يمكنه أن يجد الأنثى بعد أن يشم المادة التي تفرزها الأنثى لتجذبه . وفي الحشرات الاجتماعية (كالنحل والنحل والزناير والنمل الأبيض) تستطيع أفرادها أن تتعرف على الجماعات التابعة لمستعمراتها بواسطة حاسة الشم كما وأنها عند سيرها من وإلى عشها إلى مكان ما مثلاً تتبع طريق معين به رائحة أفراد مستعمراتها Odour trail .

٣ - أعضاء الحس الضوئية :


إن أعضاء الحس الضوئية المعروفة لدينا جميعاً في أى حشرة من الحشرات هي العيون البسيطة Simple eyes والعيون المركبة Compound eyes .

(١) العيون البسيطة :


تعتبر العيون البسيطة التي توجد في الحشرات الكاملة وفي الحوريات علوية الموضع Dorsal وهي التي يطلق عليها اسم Ocelli وعددها غالباً ثلاثة على شكل مثلث قاعدته لأعلى وهي موجودة على الجبهة Frons أو على قمة الرأس Vertex وتتغذى هذه العيون البسيطة المذكورة بأعصاب آتية لها من المخ الأمامى Protocerebrum .





شكل (٦٦) : (أ) دبوس التوازن في ذبابة (منظر علوي).
 (ب) دبوس التوازن في ذبابة (منظر سفلي).
 (ج) عضو التوازن في يرقة Ephelia.



شكل (٦٧) : (أ) تمثيل دبابيس التوازن في خط متعامد على المحور الطولي للجسم .
(ب) تمثيل دبابيس التوازن لإعادة توازن الذبابة .




شكل (٦٨) : صفيحة حسية (Plate organ) خاصة بالشحم من قرون استنشاخ أحد أنواع النمل.



شكل (٧٠) : عضو حس بالشم Coelocanic على قرن استشعار نطاظ.

أما فى اليرقات فتوجد العيون البسيطة على جانبى الرأس (شكل ١٧١) أى أنها عيون جانبية Lateral وتسمى Stemmata وعددها يختلف من ١ — ١٦ أو أكثر ، وقد لا توجد عيون بسيطة جانبية بالمرّة فى اليرقات ، وتتغذى العيون البسيطة فى اليرقة من أعضاء آتية من الفص العينى للمخ Optic lobe والمتصل بالمخ الأول أو الأمامى . والعيون البسيطة فى اليرقة هى التى يتكون العيون المركبة فى الحشرة الكاملة لنفس اليرقة .



ب

شكل (٧١) : (أ) منظر جانبى لرأس يرقة لإظهار العيون البسيطة الجانبية .
(ب) قطاع طولى فى عين بسيطة فى حشرة .

وتتكون أى عين بسيطة (شكل ٧١ ب) سواء أكانت من النوع العلوى أو الجانبى من عدسة خارجية Lens لتركيز الضوء الساقط عليها ، وتحت هذه العدسة توجد طبقة من الخلايا الشفافة المنفذة للضوء Corneagen layer ، ثم توجد أسفل الخلايا الشفافة خلايا حساسة للضوء هى خلايا الشبكية Retina cells والتي تتصل بأعصاب تصل إلى المخ ، وتحيط خلايا الشبكية بمجموعة بقضيب عيني Rabdomere (أو قد يتحد عدد من القضبان العينية يحيط بكل منها عدد من الخلايا الشبكية) ، وحول هذا العدد من الخلايا الشبكية وحول حافة العدسة من الخارج توجد خلايا محبة Pigmented cells فائدتها العمل على جعل الأشعة الضوئية منحصرة داخل العين وعدم تشتيتها إلى خارج العين .

وفائدة هذه العيون البسيطة هو التفريق بين الضوء والظلام كما يمكنها معرفة قوة الضوء وتمييز الجسم المرنى بصورة مشوشة ، ووجد أن العين المركبة ترى الأشياء أكثر وضوحا إذا ما وجدت معها العيون البسيطة مما يدل على أن العيون البسيطة هى المراكز الأولى للاحساس بالضوء ثم تقوم بدورها بتنبيه الحشرة بوجود أى أثر ولو بسيط من الضوء فتبدأ العيون المركبة وظيفتها على الفور بتتبع وفحص هذا الضوء المرنى .

ويوجد فى منطقة الرأس ليرقات الذباب عضوان لاستقبال الاحساسات الضوئية ، ويتكون كل عضو (شكل ٧٢) من مجموعة من الخلايا الحسية موجودة فى جيب على أحد جانبي الهيكل البلعومى . وتستجيب هذه الخلايا للضوء الأخضر ولا تستجيب للضوء الأحمر والضوء البنفسجى أو الأزرق الساطع .

مكانه ومبدأ عمله



شكل (٧٢) :

خلايا الإحساس بالضوء فى تجويف من تجاويف الصفائح البلعومية فى يرقة الذبابة .

(ب) العيون المركبة :

فى العين البسيطة توجد عدسة واحدة لكل خلايا الشبكية مجمعة فى حين تتكون العيون المركبة من عدسات كثيرة وتبعاً لذلك وجدت فواصل متعددة قسمت خلايا الشبكية فى العين المركبة إلى أقسام منفصلة كل قسم منها يسمى أو ماتيديم *Ommatidium* ، أى أن كل أو ماتيديم هو عبارة عن عضو بصرى مستقبل .


وقد يصل عدد الأوماتيديات فى العين المركبة الواحدة إلى ٣٠ ألف كما فى الرعاش أو ١٢ ألف كما فى الفراشات أو ٤ آلاف كما فى الذبابة المنزلية أو عدد قليل جداً يبلغ العشرات كما فى بعض شغالات النمل . هذا ويمكن للعين المركبة تحديد شكل وحركة واتجاه الجسم المرئى . والعين المركبة تمكن الحشرة من الرؤية فى جميع الاتجاهات تقريباً دون استدارة الرأس ، فقد يزيد مجال رؤيتها فى بعض الحالات عن ٢٥٠ ° . وعلى العموم فإن حدة الإبصار فى الحشرات تقل عنها فى الإنسان إذ قد تصل إلى ١ ٪ من حدة الإبصار فى الإنسان .

ويتتركب الأوماتيديم وهو الوحدة البصرية للعين المركبة (شكل ١٧٣) من عدسة خارجية *Lens* تنسلخ مع كل انسلاخ للحشرة ، وتفرز هذه العدسة بواسطة خلية *Corneagen layer* ، وتحت الخليتين الأخيرتين توجد أربعة خلايا شفافة مكونة ما يسمى بالخلايا المخروطية *Cone cells* إما أن تكون مملوءة بسائل أو مكونة جسماً أو مخروطاً بللورياً *Crystalline cone* ، وتحت المخروط البلورى توجد مجموعة من ٧ خلايا شبكية محبة ، وتفرز هذه الخلايا الشبكية المسماة *Pigmented visual cells* أو *Retinula cells* فى مركزها قضباناً بصرية تسمى رابدميرات *Rods or Cones* أو *Rhabdomeres* ، ويفصل كل أو ماتيديم عن جارتها مجموعتان من الخلايا المملوءة بالحبيبات *Pigmented cells* ، إحدى هاتين المجموعتين تحيط بالمخروط البلورى وتكون ما يسمى بال *Primary iris cells* وتحيط بالمجموعة الثانية بخلايا الشبكية مكونة ما يسمى بال *Secondary iris cells* ، ويقال أن الخلايا المحبة هذه من فوائدها تقليل حدة الضوء خاصة فى الحشرات النهارية .

ولقد وجد أنه يتكون فى العين المركبة الواحدة ثلاث مجاميع من المصور المتعاقبة ، الصورة الأولى ويظهر فيها الجسم المرئى مقلوباً وتوجد تحت العدسات مباشرة ، والثانية تظهر صورة الجسم المرئى معتدلة أى فى وضعها الطبيعى وتوجد عند النهاية الخلفية للجسم المخروطى ، والثالثة يظهر فيها التحام الصورتين السابقتين ولكن فى صورة واحدة معتدلة فى منطقة أبعد من نهاية الجسم المخروطى أى فى منطقة الخلايا الشبكية .

وبينما يرى الانسان الألوان وغيرها فيما عدا المنطقة فوق البنفسجية فإن الحشرات يمكنها تمييز اللون فوق البنفسجي ، وتقتصر رؤيتها على الألوان الطبيعية الأخرى حتى اللون البرتقالي بحد أقصى لموجة ضوئية قدرها ٧٠٠ ملليمكرون .

ومن هنا لا يمكن للحشرات رؤية الألوان الحمراء . وللحشرات القدرة على رؤية الشمس حتى لو اشتدت الغيوم والسحب بالسماء نظرا لقدرتها على رؤية الأشعة فوق البنفسجية (الابراشي ، ١٩٧٨) .



شكل (٨٣) : (أ) قطاع طولي في وحدة بصرية من وحدات العين المركبة .
(ب، ج) ترتيب القضبان البصرية في بعض الحشرات .

٤ — أعضاء الحس التى تتأثر بالحرارة والرطوبة :

(١) أعضاء الحس بالحرارة : (شكل ١٨٤) :

جميع الحشرات عندها حساسية للحرارة المرتفعة ودائما تبتعد عن الأماكن الحارة .
ومناطق الاحساس بالحرارة فى أنواع النطاط موزعة على جميع سطح جدار الجسم ولكنها
مركزة نوعا ما على النصف القاعدى من قرون الأستشعار وعلى رنغ Tarsus ووسادات
Pulvilli الأرجل الأمامية والخلفية . ويستقبل صرصار الغيط Liogryllus الاحساس
بالحرارة بقرون استشعاره ورنغ أرجله وأجنحته وبطنه وأماكن أخرى بجسمه . وتستقبل
حشرة Lygaeus (رتبة نصفية الأجنحة) الاحساس بالحرارة بالحلقة الطرفية من حلقات
قرون الاستشعار . وقرون الاستشعار أيضا هى أماكن الاحساس بالحرارة فى الحشرات
العصوية Phasmidae .

وتستدل الحشرات التى تمتص دم الثدييات كالبعوضة أنوفيليس على أماكن عوائلها
بواسطة قرون استشعارها التى تحس بالحرارة الصادرة من هذه العوائل بجانب حاسة الشم
أيضا . وفى أنواع القمل الماص يوجد هذا الاحساس بالحرارة منتشرا على جميع سطح
جسمها ولو أن هذا الاحساس يكون مركزا فى قرون استشعارها . وتضطر بقعة الفراش
Cimex وذبابة الاسطبلات Stomoxys إلى أن تغير اتجاهها وتنجذب إلى وسط آخر
أعلى بدرجة مئوية واحدة عن درجة عوائلها بواسطة حاستى الحرارة والشم معا . ولقد وجد
أن بقعة الفراش يمكنها معرفة حرارة الوسط الموجودة به وذلك إذا كانت على بعد ١ سم من
هذا الوسط الآخر .


ويحمل قرن استشعار بقعة الرودنيس Rhodnius بجانب شعراتها الطويلة الشمية
شعرات أخرى كثيرة أرفع من الشعرات الشمية وتحت كل من هذه الشعرات الدقيقة
مجموعة من ٥ — ٦ خلايا حسية ربما كانت مراكز الاحساس بالحرارة .

(ب) أعضاء الحس بالرطوبة :

تفضل بعض الحشرات الأماكن الرطبة لكى تعيش فيها كحشرة الكوليبولا ويرقات
خنافس فرقع لوز المعروفة بالديدان السلكية Family Elateridae وذلك بعكس حشرة
ابرة العجوزة وخنفساء جريش الذرة Tenebrio التى تبتعد دائما عن الأماكن الرطبة .
ويمكن لنحلة العسل وذبابة الاسطبلات الاحساس بوجود الماء من مسافة بعيدة بواسطة
أعضاء حسية خاصة على قرون الاستشعارها . وتتحاشى البعوضة كيولكس Culex
fatigans الأماكن التى تزيد فيها درجة الرطوبة النسبية عن ٩٥ ٪ حتى ولو كانت هذه

الزيادة ١ ٪ فقط بينما إذا كانت نفس البعوضة في مكان تتراوح فيه درجة الرطوبة النسبية بين ٣٠ — ٨٥ ٪ لا يمكنها أن تحس بزيادة أو بنقص درجة الرطوبة النسبية الأخيرة حتى ولو بلغت هذه الزيادة أو النقص ٤٠ ٪ .

ولقد أمكن اكتشاف أماكن الاحساس بالرطوبة في قرن استشعار قمل الانسان Pediculus وهي عبارة عن أربعة مجموعات من الخلايا الحسية وكل مجموعة تحمل أربعة شعيرات دقيقة (شكل ٨٤ ب) .



شكل (٨٤) : (أ) شعرة حسية بالحرارة على قرن استشعار بقعة الرودنوس Rhodnius .

(ب) عضو الإحساس بالرطوبة على قرن استشعار قملة الإنسان Pediculus .

الباب السادس

طرق إحداث الصوت ووسائل السمع في الحشرات

Sound Producing Mechanisms in Insects

أولاً : طرق إحداث الصوت

تتلخص طرق إحداث الصوت في الحشرات في الطرق الآتية :


- ١ — أصوات ناتجة بسبب اهتزازات أجنحة الحشرة أثناء الطيران .
- ٢ — أصوات ناتجة بسبب احتكاك جزء معين من أجزاء الحشرة بسطح جسم صلب خارجي آخر .
- ٣ — أصوات تحدث نتيجة قيام الحشرة بأعمال ميكانيكية خاصة مثل :
 - (أ) احتكاك جزء بجزء آخر في جسم الحشرة .
 - (ب) اهتزازات أغشية خاصة بالحشرة .
 - (ج) القيام بأعمال ينتج عنها مرور الهواء إلى داخل أو خارج الحشرة .
- ١ — الأصوات الناتجة بسبب اهتزازات أجنحة الحشرة أثناء الطيران :

وأوضح مثل لها هي الأصوات الناشئة عند طيران نحلة العسل أو البعوضة فتذبذب أو إهتزاز الأجنحة أثناء الطيران يسبب أيضا تذبذب الحلقات الصدرية . هذا ولقد وجد الحشريون أن الأصوات الناشئة عن تذبذب الحلقات الصدرية أكثر من تلك الناشئة عن تذبذب الأجنحة نفسها . ويعتقد البعض أن الصوت الذي تحدثه ذبابة Calliphora هو نتيجة اهتزازات أو ذبذبات الحلقات الصدرية بسبب احتكاكات قواعد الأجنحة بها عند اهتزازها أثناء الطيران . والأصوات التعبيرية المنبعثة من ملكة نحلة العسل سببها اهتزازات الصفائح الصدرية أيضا . وفي الجراد Cissosstera يعتقد أن الأجنحة ترتطم بسطح الجسم أثناء الطيران وينشأ الصوت نتيجة هذا الارتطام ، وصوت الجراد الصحراوي الناشئ عن اهتزازات أجنحته أثناء الطيران يكون ضعيفا ولكن اذا ما أراد هذا الجراد إحداث صوتا مسموعا فعليه أن يحرك السطح الداخلى لفخذ الأرجل الخلفية فوق الأجنحة (شكل ٨٥) .


ويتراوح عدد ضربات جناح الحشرة أثناء الطيران من ٤ — ١١٠٠ ضربة في الثانية .



صف أعضاء
إحداث الصوت



أعضاء
إحداث الصوت



(د) نهاية عذراء حشرة Eligma وعليها تضاريز أيضاً.
(هـ) مكان الاحتكاك بإحدى الحلقيتين البطنتين
في عذراء حشرة Eligma.



شكل (٨٥) : (أ) أعضاء إحداث الصوت في الجراد.
(ب) أعضاء إحداث الصوت في الجراد (مكبرة).
(ج) تضاريز إحداث الصوت على شرنقة حشرة Eligma.

٢ - الأصوات الناتجة بسبب احتكاك جزء من أجزاء الحشرة بسطح جسم خارجي صلب :

وأوضح مثل لها هو الصوت الذى تحدثه الحشرات الكاملة لخنافس الخشب Xestobium, Anobium والتي تعيش هي ويرقاتها داخل أنفاق في أخشاب الاثاث ، ويحدث هذا الصوت في أشهر أبريل ومايو أثناء موسم التلقيح ، وتحدث الحشرة الكاملة هذا الصوت بدق أرضية النفق بمقدم رأسها .

ويقوم النمل الأبيض المسمى Lucotermes tenuis بإحداث أصوات مماثلة داخل أنفاقها بدق جدران الانفاق وذلك بمعدل ١٠ دقات في الثانية . وهناك بعض أنواع النمل العادى تؤدي هذه الأصوات بدق الانفاق التى تعيش فيها برؤوسها . وبعض أنواع من قمل الكتب (رتبة Psocoptera) تعتبر من الحشرات التى تحدث فيها الاناث أصواتا مسموعة بدق الاسطح التى تعيش بداخلها أو عليها بواسطة بروزات خاصة موجودة على استرناات الحلقات البطنية الخلفية وذلك لأجل التلقيح .

وبعض حشرات مستقيمة الأجنحة تحدث أصواتا بدق الاسطح التى تعيش عليها برسغ أرجلها أو بأطراف بطونها .

وبعض الحشرات التابعة لرتبة Plecoptera تحدث أصواتها بدق الاسطح بنهايات بطونها حيث توجد أعضاء خاصة بالدق على الاسترنة التاسعة البطنية .

وبعض خنافس عائلة Tenebrionidae تحدث الأصوات بدق الأسطح بنهايات بطونها .

وبعض يرقات رتبة حرشفية الأجنحة كبيرة حشرة Drepawa تحدث أصواتا بحك شوكتين موجودتين على الحلقة البطنية العاشرة بأسطح أوراق النباتات التى تتغذى عليها . ويرقات الدبور الأحمر Vespa craba تحدث أصواتا بتمشية أجزاء فمها على جدران عيون خلايا العش .

٣ - الأصوات الناتجة بسبب قيام الحشرة بأعمال ميكانيكية خاصة :

(١) الأصوات الناتجة بسبب احتكاك أجزاء من الحشرة ببعضها البعض :

عضو احداث الصوت في الحشرة يتكون دائما من جزئين ، أولهما سطح تضابيز أو بروزات وهو سطح الاحتكاك File والآخر عبارة عن حافة Ridge لجناح أو حلقة من حلقات الجسم أو بروز Knob يسمى Scraper عند مروره على سطح الاحتكاك ينتج

عنه اهتزازات سطح الجسم فيحدث الصوت . ويوجد هذا النوع من أنواع أجهزة إحداث الصوت في رتبة مستقيمة الأجنحة (شكل ٨٦ أ ، ب) ونصفية الأجنحة وغمدية الأجنحة (شكل ٨٧) وفي اليرقات والعذارى والحشرات الكاملة لرتبة حرشفية الأجنحة (شكل ٨٥ ج ، د ، هـ) وفي بعض الحشرات التابعة لرتبة غشائية الأجنحة (شكل ٨٦ ج) والحشرات التابعة لرتبة قمل الكتب حيث تحتك أجزاء على الأرجل بأسطح الأجنحة ، وفي حوريات رتبة الرعاشات (شكل ٥٨٦ د) وذباب الفاكهة Dacus sp. حيث أنه عند اهتزاز الأجنحة تحتك منطقة الـ Cubito-anal بصفتين من الأشواك الطويلة الموجودة على كل من جانبي الترجة البطنية الثالثة .

وفي يرقات حرشفية الأجنحة قد يحدث الصوت باحتكاك زوج الفكوك العليا ببعضها البعض أو باحتكاك نهاية الرأس بالحافة الأمامية للحلقة الصدرية الأولى . ويمكن لعذارى هذه اليرقة إحداث الأصوات بأربعة طرق (هنتون ١٩٤٨) وهى :

- ١ — دق السطح الموجود عليه العذارى بيطنها .
- ٢ — احتكاك زوج أو أكثر من حلقات الجسم ببعضها .
- ٣ — احتكاك بطن العذراء بمخروطوها .
- ٤ — احتكاك التضاريز الموجودة على السطح الخارجى لجسم العذراء بمجدران الشرقة .

أما فى الحشرات الكاملة لأبى دقيقات والفرشات فكثير منها تختوى أجنحتها الأمامية والخلفية على عروق بارزة باحتكاكها بأسطح الجناح المقابل يحدث الصوت المطلوب . وفى فراشات أخرى يحدث الصوت باحتكاك بروزات على الأجنحة الأمامية أو الخلفية بأسنان أو أشواك أو تضاريز موجودة على أجزاء من الأرجل الوسطية أو الخلفية (الساق أو الرسغ) .

(ب) الأصوات الناشئة بسبب اهتزازات أو تذبذبات أغشية خاصة :

يوجد على كل من جانبي الحلقة البطنية الأولى فى حشرات سيكاذا (رتبة متشابهة الأجنحة) عضو خاص يتكون من غشاء رقيق دائرى تقريبا ومقوس للخارج ويسمى Tympanal organ وعلى حافته الخارجية توجد حلقة شيتينية ويتصل بمركزه من الداخل عضو خاص عند انكماشه يجذب معه الغشاء للداخل وعند انفراده يرجع الغشاء إلى وضعه الطبيعى محدثا هزة أو ذبذبة واحدة من الصوت ، ويتكرر انكماش وانفراج العضو المذكور يهتز الغشاء محدثا صوتا مسموعا ، هذا ولقد امكن تسجيل ١٢٠ — ٥٨٠ ذبذبة

في الثانية في هذا النوع من الأجهزة . وقد اكتشف هنتون (١٩٤٨) أعضاء مماثلة لتلك الموجودة في حشرات السيكاذا وذلك في الصدر الثالث لبعض الحشرات الكاملة التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة حيث تقوم صفيحة الـ *Episternum* في الحلقة الصدرية الثالثة مقام الغشاء *Tympanum* ، ويوجد تحت هذه الصفيحة فراغ كبير ، وتحدث اهتزازات تغير حجم هذا الفراغ وذلك عند انكماش وانفراج عضلات الطيران العمومية الموصلة بين ترجات الصدر الثالث ، وعلى هذا فإحداث الصوت في الحشرات المذكورة يحدث فقط أثناء طيرانها .

(ج) الأصوات الناتجة بسبب مرور هواء داخل أو خارج جسم الحشرة :


يحدث الصوت في بعض الفراشات وأى دقيقات من خروج أو دخول الهواء جسم الحشرة ، ففي فراشة السمسم مثلاً نجد أن المكان الرئيسي لأحداث الصوت هو البلعوم بمساعدة عضلاته التي تربطه بصفيحة الرأس الذى يعمل كطلعمة تمتص أو تطرد الهواء خلال الخرطوم على شرط أن يكون البلعوم خالياً من الغذاء ، ويصاحب امتصاص أو طرد الهواء خلال هذا الخرطوم إحداث صوت واضح (شكل ٨٨) .

وعند لمس الفراشتين *R. bupia*, *Rhodogastria bubo* تخرج كل منهما رائحة كريهة من الغدة الطاردة الموجودة بين الرأس والصدر الأمامى وتحدث كل منهما في نفس الوقت صوتاً مسموعاً نتيجة اهتزازات بلورا الحلقة الصدرية الثالثة ونتيجة لطرد الهواء بقوة خلال الثغور التنفسية .

ولقد وجد أن النطاط *Taeniopoda picticornis* وكثيراً غيره من حشرات رتبة مستقيمة الأجنحة تخرج رائحة كريهة من ثغورها التنفسية ويصحب خروج هذا السائل أصواتاً مسموعة ، وقد يكون سبب اخراج هذا السائل الكريه هو اللمس أو مسك النطاط باليد أو بأية وسيلة أخرى .

وعند مهاجمة الجمل *Brachynus ballistans* (رتبة غمدية الأجنحة) فإنه يعمل على إخراج رائحة كريهة من غدد خاصة بالبطن ويحدث صوتاً مسموعاً في نفس الوقت .

وإحداث الصوت نتيجة خروج الهواء من الثغور التنفسية ظاهرة قديمة معروفة منذ عام ١٩٦٧ في بعض حشرات رتب الذباب وغشائية الأجنحة وغمدية الأجنحة ، ويقال أن سببه إهتزازات مجموعة من الصفائح موجودة داخل القصبة الهوائية خلف فتحات بعض الثغور التنفسية نتيجة مرور الهواء عند تنفس الحشرة . وعلى العموم يحتاج هذا النوع من الأصوات إلى دراسات أخرى للتأكد من أسبابه ومصدره .




شكل (٨٦) : (أ) الجناح الأمامي الأيسر للنشاط Ephippiger (السطح العلوي).

(ب) الجناح الأمامي الأيسر للنشاط Ephippiger (السطح السفلي).


(ج) قطاع طولي في خصر النملة Myrmica.

(د) حورية الرعاش Epiophlebia.




شكل (٨٧) : أعضاء أحداث الصوت في يرقة *Passalus* (رتبة غمدية الأجنحة).
 (أ) الجزء الأمامي من اليرقة.
 (ب) الرجل الصدرية الوسطى المنحورة في اليرقة المذكورة.
 (ج) السطح الداخلي للرجل الصدرية الثالثة في نفس اليرقة.

وقف السحبة



وقف الزفير



شكل (٨٨) : رأس فواشة السمسم Acherontia لمعرفة طريقة إحداث الصوت.

ولقد نال الصوت الذى تحدته ملكة نحلة العسل أثناء طيرانها للتلقيح أو أثناء التطريد أو حتى داخل الخلية انتباه الكثير من الحشريين ، فاعتبره سند جراس (١٩٢٥) وغيره أنه نتيجة اهتزازات الصفائح الموجودة عند قواعد الأجنحة ، ولكن وجد وودز (Woods) فى عامى ١٩٥٦ ، ١٩٥٧ أن إحداث صوت ملكة نحلة العسل سببه اهتزازات الأجنحة بدرجة خاصة محددة تجعل فتحات الثغور التنفسية تنفتح بدورها بدرجة خاصة (فى هذه الحالة الخاصة ينفتح وينقل كل من الثغور التنفسية للملكة ٣٥٠ مرة فى الثانية) فيحدث الصوت نتيجة لخروج تيار من الهواء من تلك الثغور وكنتيجة لاهتزازات الأجنحة أيضا .

ثانيا : وسائل السمع فى الحشرات

يمكن القول بأن الحشرة تسمع عندما تتصرف وكأنها حددت مصدر الصوت الصادر من بعد ، وأعضاء السمع هى الحواس التى تيسر للحشرة سماع هذا الصوت . ويعتبر مولر (Muller ، ١٨٢٦) ، ونيوبورت (Newport ، ١٨٣٨) ، وزهولد (Siebold ، ١٨٤٤) وجرابر (Graber ، ١٨٨٢) من الحشريين الأول الذين وصفوا أعضاء السمع فى الحشرات .

وأبسط أعضاء السمع تتركب من غشاء على شكل الطبقة Sense plate يغذيه ثلاثة خلايا هى الخلية المغطاة Cap cell والخلية المغلفة Sheath cell والخلية الحسية الأولى Primary sense cell ، والذى يتصل بها قضيب حس Sense rod أو Scolopale ، ومن اسم القضيب الأخير سمى هذا النوع من أعضاء السمع باسم اسكولوبيديا Scolopidia . ويوجد هذا الأسكولوبيديا فى كثير من اليرقات والحشرات الكاملة لأغلب الرتب الحشرية منعكسا بين خلايا هيورمس جدار الجسم (شكل ٨٩ ج) . ووجود الأسكولوبيديا فى هذا الوضع يوضح أن وظيفته الأساسية هى تسجيل اهتزازات الجزء الموجود فيه من جدار الجسم ، وفى حالات أخرى كثيرة يكون هذا الجهاز ملازما لعضو السمع ذو الطبلة الخارجية Tympanal organ حيث يسجل اهتزازات غشاء الطبلة فى عضو السمع المذكور .

وعلى العموم فيوجد بالحشرات خمسة أنواع من أعضاء السمع هى :

- ١ — أعضاء السمع ذات الطبلة الخارجية Tympanal organs .
- ٢ — عضو جونستون (وهو عضو سمع بدون طبلة خارجية) Johnston's organ .

٣ — مجاميع الخلايا الحسية السمعية الموجودة على أرجل الحشرات (وبدون الطبلية الخارجية Subgenualorgana) .

٤ — الأطباق الحسية السمعية (وبدون الطبلية الخارجية) والمبعثرة على جدار الجسم . Scattered scolopale organs

٥ — الشعرات الحسية السمعية المنتشرة على سطح الجسم Scattered hair chordofonal organs


وستتناول فيما يلى شرح الأنواع الخمسة المذكورة :

١ — أعضاء السمع ذات الطبلية الخارجية :


هى فى الواقع أطباق حسية عليها طبلية أو غشاء خارجى دائما فى أزواج على جانبي الجسم فى رتبة مستقيمة الأجنحة وحرشفية الأجنحة ونصفية الأجنحة .

ففى رتبة مستقيمة الأجنحة توجد أعضاء السمع المذكورة فى الحوريات والحشرات الكاملة على السواء فى الذكور وفى الاناث وذلك على جانبي الحلقة البطنية الأولى فى فوق عائلة الجراد والنطاط Acridoidea وعلى رسغ الأرجل الأمامية فى فوق عائلتى الحفار وصراصير الغيط Grylloidea والجراد ذو القرون الطويلة فى فوق عائلة Tettigonioidea (شكل ٨٩ ب) . ويتركب العضو فى الجراد الصحراوى Locusta migratoria من طبلية غشائية معرضة للهواء ومحملة على حلقة شيتينية . وتوجد قرب الطبلية من الداخل مجموعة من الخلايا السمعية التى يطلق عليها اسم عضو مولر Muller's organ والذى يتصل بها عصب سمعى يذهب إلى العقدة العصبية للحلقة الصدرية الثالثة ، كما يوجد خلف السطح الداخلى للطبلية أكياس هوائية لابعاد اتصال غشاء الطبلية بالدم الموجود فى فراغ الحشرة أو بأى نسيج داخلى آخر ، ويتصل به عضو السمع فى الجراد الصحراوى من الداخل عضل يطلق عليه اسم Tensor tympani ووظيفته غير معروفة حتى الآن ، كما قد يوجد عضل آخر مقابل للعضل المذكور فى بعض أنواع الجراد والنطاط الأخرى .

أما عضو السمع ذو الطبلية الخارجية الموجود فى الحفار وصرصار الغيط والنطاط ذو القرون الطويلة فيوجد داخل تجويف (فى حالة الحفار) أو تجويفين (فى حالة النطاط ذو القرون الطويلة) على ساق الرجل الأمامية ، وفى كل تجويف يتركب عضو السمع من غشاء أسفله كيس هوائى كما توجد خلايا السمع الحسية عند الحافة الأمامية للرسغ .



شكل (٨٩) : (أ) منظر داخلي لعضو السمع في النطاط .
 (ب) قطاع عرضي لعضو السمع في ساق الرجل الأمامية في نطاط
 من عائلة Tettigoniidae .
 (ج) نوع من أعضاء الحس السمعية البسيط المسمى
 اسكولوبيديا (Scolopale organ) .



وإلى رتبة حرشفية الأجنحة توجد أعضاء السمع على جانبي الحلقة الصدئية الثالثة في فوق عائلة Noctioidea وعلى جانبي الحلقة البطنية الأولى في فوق عائلة الديدان القياسة Geometrioidea (فيما عدا عائلة Axilidae حيث توجد أعضاء السمع على جانب الحلقة البطنية السابعة) ، وكذلك فيما عدا بعض حشرات عائلة Pyralidae . ويتركب عضو السمع في إحدى فراشات فوق عائلة Noctioidea من تجويف كبير موجود بين الحلقة الصدئية الثانية والحلقة الأولى على كل جانب من جانبي الجسم ، وبهذا التجويف غشاء طلبة أولى جهة الخارج وغشاء طلبة ثانوى جهة الداخل وبين الغشائين يوجد الكيس الهوائى ، ويلامس سطح غشاء الطلبة الأولى من الداخل مجموعة من الخلايا السمعية الحسية (شكل ٩٠) .

٢ - عضو جونستون :

سمى هذا العضو نسبة إلى العالم جونستون الذى وصفه لأول مرة في البعوضة كيولكس Culex ولو أن هذا العضو معروف الآن في معظم الحشرات في الحشرات الأولية كالسمك الفضى . ويوجد عضو جونستون داخل عقلة العذق Pdicel في قرن الاستشعار ، ويتكون من عدد مختلف من مجاميع الخلايا السمعية الحسية ، علما بأن خلايا المجموعة الواحدة تكون مرتبة داخل مجموعتها ترتيبا شعاعيا ، وتسجل الخلايا السمعية اهتزازات عقل الشمروخ المخملة على عقلة العذق . ويبلغ عضو جونستون أقصى درجات نموه في عائلتي الهاموش Chironomidae والبعوض Culicidae من رتبة الذباب (شكل ٩١) ، ويوجد أيضا في عائلة النحل Apidae من رتبة غشائية الأجنحة ، وفي فراشات الديدان القارضة التابعة لعائلة Noctuidae من رتبة حرشفية الأجنحة . وفي كل الحشرات السابقة الذكر يوجد على سطح قرن الاستشعار أيضا أطباق وشعرات حسية سمعية لتوصيل الاحساس بالسمع إلى عضو جونستون .


٣ - مجاميع الخلايا السمعية الحسية الموجودة بأرجل الحشرات :

توجد هذه المجاميع داخل طرف الساق الموجود جهة الفخذ في رتب مستقيمة الأجنحة ومطبقة الأجنحة وحرشفية الأجنحة وغشائية الأجنحة ونصفية الأجنحة ، وتستجيب هذه المجاميع السمعية لاهتزازات سطح ساق الأرجل ، أو قد تصل الاحساسات بالسمع إلى الأطباق والشعيرات الحسية السمعية أولا وهذه تنقلها إلى عضو جونستون ثم ينقل عضو جونستون الاحساس بالسمع إلى المجاميع السمعية الموجودة في الأرجل . ويختلف هذا النوع من أعضاء السمع عن نوع الأطباق السمعية الحسية في أن

الخلايا الطرفية من مجاميع السمع الحسية الموجودة في ساق رجل الحشرة توجد منغمسة في كتلة من النسيج الضام التي تنتهي أطرافها على جدار جسم الساق ، هذا كما لا توجد المجاميع السمعية الحسية بالمرّة عند فواصل حلقات الرجل .

٤ - الأطباق الحسية المبعثرة على جدار الجسم :


ينتشر هذا النوع من أعضاء السمع في الحشرات ، وهو يتأثر بالموجات الصوتية الضعيفة التي لا يتيسر سماعها عن طريق اهتزاز غشاء طبلة ، ولذا يكثر وجود هذا النوع في الحشرات المائية .



شكل (٩١) : عضو جونستون في عقلة العذق بقرن استشعار ذكر البعوض.

٥ - الشعرات السمعية الحسية المنتشرة على سطح الجسم :

توجد هذه الشعرات السمعية ضمن الشعرات الحسية الأخرى المختلفة التي تغطي جسم الحشرة . وتعتبر هذه الشعرات السمعية شعرات حسية بالملامسة ولكن المؤثر الخارجى فى هذه الحالة هو الموجات الصوتية . وعلى هذا فيتتركب عضو السمع هنا من الشعرة السمعية الحسية التي تغذيها خلية حسية مدببة الطرفين (شكل ٩٢) . ويتسبب عن اهتزاز الشعرة السمعية الحسية نتيجة الموجات الصوتية توصيل الاحساس بالسمع إلى الخلية الحسية التي توصل بدورها الاحساس عن طريق عصب حسى إلى الجهاز العصبى المركزى .



شكل (٩٢) : قاعدة شعرة حسية باللمس والسمع فى أبى دقيق الحجازى .

ويرجع الفضل في اكتشاف وجود هذا النوع من الشعرات السمعية الحسية على أجسام يرقات رتبة حرشفية الاجنحة وعلى القرون الشرجية وأجسام كثير من حشرات رتبة مستقيمة الأجنحة إلى العلماء زهler (Sihler ، ١٩٢٤) ، منيش (Minnich ، ١٩٢٥) و (١٩٣٦) ، هاسكل (Haskell ، ١٩٥٦) .

وقد أمكن حديثا (اليراشي ، ١٩٧٨) تقدير مدى استجابة أعضاء السمع في الحشرات للموجات الصوتية باستخدام أحد المسجلات الالكترونية ، فوجد أنها تستجيب لجميع الموجات في مدى يصل من ٣٠٠ إلى ١٠,٠٠٠ تردد / ثانية ، وقد يصل في بعض الحشرات الأخرى من ٨٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ ، وجدير بالذكر هنا أن أذن الانسان تستجيب فقط إلى ٢٠,٠٠٠ كحد أقصى والخفافيش إلى ١٠٠,٠٠٠ .


الباب السابع

الجهاز التنفسي The Respiratory System

لا بد للكائنات الحية من الحصول على الأكسجين اللازم لحياتها والتخلص من ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية التمثيل الغذائي داخل جسمها ، ولهذا فلقد زودت هذه الكائنات بالجهاز التنفسي للقيام بهذه الوظيفة .

وكثير من الحشرات الرهيفة كحشرة الكولبولا وبعض الحشرات المتطفلة داخليا على غيرها **Endoparasites** يحصل بها تبادل الغازات عن طريق جدار الجسم حيث يقوم الدم بعملية تبادل الغازات . أما الغالبية العظمى من الحشرات فجدار جسمها سميك وعلى هذا فنجد أن هذا الجدار قد انبعج للداخل عند أماكن معينة هي الثغور التنفسية وتفرع كثيرا على هيئة أنابيب تسمى بالقصبات الهوائية **Tracheae** (شكل ٩٣) ، ونهايات هذه القصبات تذهب تقريبا إلى جميع خلايا الجسم مباشرة ، أى لا يحصل تبادل الأكسجين عن طريق الدم كما هو الحال في الحيوانات الراقية ولكن يحصل الدم في الحشرات على نصيبه فقط الذى يلزمه من الأكسجين لاستعماله الخاص كأي نسيج آخر من أنسجة جسم الحشرة .

وتفتح القصبات الهوائية في الحشرات للخارج عن طريق الثغور التنفسية **Spiracles** وهى فتحات موجودة على جوانب الصدر والبطن (البلورا) . ولو أنه قد توجد هذه الثغور التنفسية في بعض الحشرات على الترجات كما في حالة الثغور البطنية في النحل والذباب . ويختلف عدد الثغور التنفسية باختلاف الحشرات ، ولكنها في العادة لا تزيد عن عشرة أزواج ، زوجان منها في الصدر أحدهما بين الصدر الأول والثاني ، والزوج الثاني بين الصدر الثاني والثالث ، بينما تقع أزواج الثغور الثانية الباقية على حلقات البطن الثانية الأولى كما في الصرصار . ونادرا ما يزيد عدد الثغور التنفسية عن عشرة أزواج كما في السمك الفضى ولكن كثيرا ما يقل هذا العدد عن العشرة أزواج .



شكل (٩٣) : نظام تفرع القصبات الهوائية داخل جسم الحشرة.

وتقسم الحشرات بالنسبة إلى عدد الثغور التنفسية الموجودة بها إلى الأقسام التالية :

١ — حشرات يقل فيها عدد الثغور العاملة (Functional) ، والمقفلة (Non -

Functional) عن عشرة أزواج ويطلق عليها اسم Hypopneustic .

٢ — حشرات يوجد بها عشرة أزواج من الثغور التنفسية (عاملة ومقفلة) وهذه تقسم

حسب عدد ونظام توزيع الثغور العاملة فقط في الحشرة الواحدة إلى :

(أ) توجد أكثر من عشرة أزواج من الثغور التنفسية العاملة **Hyperpneustic**

إذ قد يوجد على كل من الحلقين الصدريتين الثانية والثالثة زوجان من الثغور التنفسية العاملة بدلا من زوج واحد .

(ب) يوجد عشرة أزواج من الثغور التنفسية العاملة **Holopneustic** : ويوجد

من هذه الثغور ثمانية على البطن واثنان على الصدر ، ويوجد هذا القسم في

الحوريات والحشرات الكاملة لكثير من الرتب ويوجد كذلك في يرقات عائلة **Bibionidae** ، (رتبة الذباب) وبعض يرقات رتبة غشائية الأجنحة .

(جـ) عدد الثغور العاملة أقل من عشرة أزواج **Hemipneustic** : وهذا القسم يغلب وجوده في يرقات الحشرات ، ويقسم هذا القسم بدوره إلى الأنواع الآتية نظرا لاختلاف نظام توزيع الثغور العاملة كما يلي :

(جـ ١) عدد الثغور العاملة يتراوح عددها ما بين خمسة وتسعة أزواج **Peripneustic** وفيه زوج ثغور الصدر الأول وجميع أو بعض الثغور البطنية مفتوحة وعاملة . ويوجد هذا النوع في يرقات رتب شبكية الأجنحة وحرشفية الأجنحة وكثير من غشائية الأجنحة (تحت رتبة **Symphyta**) وكثير من غمدية الأجنحة وبعض عائلة **Bibionidae** وأغلب يرقات عائلتي **Cecidomyidae** , **Mycetophilidae** (رتبة الذباب) .

(جـ ٢) عدد الثغور العاملة يتراوح ما بين زوجين إلى أربعة أزواج **Amphipneustic** ، وفيه يكون زوج الثغور التنفسية للصدر الأول والزوج الأخير من الثغور التنفسية البطنية وبعض الثغور البطنية الأخرى مفتوحة وعاملة بينما تكون باقي الثغور مقفلة . وهذا النوع هو الغالب في يرقات الذباب .

(جـ ٣) زوج واحد عامل فقط **Metapneustic** ، وفيه الزوج الأخير فقط من الثغور التنفسية البطنية مفتوح وعامل . وهذا النوع هو السائد في يرقات عائلات **Culicidae**, **Tipulidae** (رتبة الذباب) وفي العمر اليرقي الأول فقط ليرقات الذباب التابعة لتحت رتبة **Cyclorrhapha** ، كما يوجد أيضا في اليرقات المائية لبعض عائلات رتبة غمدية الأجنحة كما في عائلتي **Helodidae**, **Dytiscidae** وغيرهما .

(جـ ٤) زوج الثغور التنفسية في الحلقة الصدرية الأمامية مفتوح وباقي الثغور مقفلة **Propneustic** .

(جـ ٥) جميع الثغور التنفسية مقفلة **Branchiopneustic** ، حيث يكون التنفس خلال جدار الجسم أو عن طريق خياشيم خاصة ، وعلى هذا فيوجد هذا النوع من الثغور التنفسية في الحشرات المائية أو المغمورة في سواحل مثل حوريات رتب ذباب مايو والرعاشات ويرقات بعض عائلات رتبة الذباب مثل عائلات **Ceratopogonidae**, **Simulidae** .

Chironomidae ، وبعض يرقات الخنافس كاليرقات التابعة لعائلات
Elmidae, Hygroblidae, Holipiidae ، كما يوجد أيضا في بعض
الأعمار اليرقية للمتطفلات الداخلية Endoparasites التابعة لرتبة
غشائية الأجنحة ويرقات ذباب التاكينا .

٣- الثغور التنفسية غير موجودة بالمرءة Apneustic : اذ يكون التنفس كما في النوع
السابق عن طريق جدار الجسم أو عن طريق خياشيم تنفس .

الثغر التنفسي : The Spiracle

قد يتركب الثغر التنفسي من فتحة عادية موجودة على جدار جسم الحشرة وتؤدي
إلى القصبة الهوائية مباشرة (شكل ٩٤ ج) ، أو قد تؤدي فتحة الثغر إلى حجرة واسعة
نوعا ما تسمى Atrium قبل اتصالها بالقصبة الهوائية (شكل ٩٤ هـ) . وفتحة الثغر
قد تكون مستديرة أو بيضاوية أو على هيئة شق صغير ضيق أو عدة شقوق
(شكل ٩٤ د) . وقد تغطي هذه الفتحة من الخارج بأشواك أو شعيرات كثيرة
(شكل ٩٤ هـ) وظيفتها منع دخول الانربة والأجسام الغريبة داخل الثغر وكذلك تقليل
الفقد من الماء الموجود داخل الحشرة .

ويوجد ببعض يرقات حشرات رتبة غمدية الأجنحة (كما في عائلات Elateridae,
Curculionidae, Dryopidae, Histeridae وغيرها) نوع من الثغور التنفسية يطلق
عليه اسم Uniform (حماد ، ١٩٥٥) أو نوع آخر يسمى Biforous
(حماد ١٩٥٦ ، ١٩٥٧) ، وفي النوع الأول Uniform توجد للثغر فتحة واحدة على
هيئة شق ضيق جدا تؤدي إلى أنبوبة تفتح بدورها في غرفة الثغر ، بينما يوجد في النوع
Biforous أنبوتان مستقلتان لكل منهما فتحة ضيقة خارجية ثم تؤدي الانبوتان من
الداخل إلى غرفة الثغر التي تفتح بدورها في القصبة الهوائية .

وعادة يكن الزوج الأول من الثغور التنفسية الصدرية أكبر الثغور جميعا في الحجم ،
كذلك يصغر حجم الثغور التنفسية تدريجيا كلما اتجهنا نحو نهاية البطن ، وقد تتشابه
الثغور التنفسية الصدرية والبطنية في التركيب أو قد تختلف ، كما أن الثغور التنفسية
البطنية نفسها قد يختلف بعضها عن البعض الآخر .

ولكل ثغر تنفسي جهاز يتحكم في فتحه وقفله Spiracular regulatory apparatus ، وهذا الجهاز إما أن يكون خارجيا أى ملاصقا لجدار الجسم من الداخل
تحت الثغر مباشرة كما في الجراد والصرصار (شكل ٩٤ جـ) ويرقات رتبة حرشفية

الأجنحة (شكل ١٩٥) ، أو أن يكون داخليا ويقع في هذه الحالة بين غرفة الثغر والقصبه الهوائية المتصلة بها كما في رتبة غمدية الأجنحة (شكل ٩٤ هـ) وخافية الأجنحة (الراغيث) مثلا . وفي كل من النوعين السابقين يتكون جهاز الفتح والقفل من عضلة واحدة أو أكثر عند انقباضها تقفل فتحة الثغر الخارجية أو تقفل الفتحة الموجودة بين غرفة الثغر والقصبه الهوائية . وتتصل هذه العضلة (أو العضلات) الفاتحة والقافلة بجدار الثغر أو بجدار القصبه الهوائية مباشرة أو قد تتصل برافعة أو قضيب أو قنطرة شيتينية مرنة ، وعند انقباض هذه العضلة (أو العضلات) تقفل الفتحة التنفسية المذكورة وعند انفراجها تفتح تلك الفتحة التنفسية .

هذا ولا يوجد في الحشرات بسيطة التطور Apterygota جهاز الفتح والقفل المذكور بل تحاط فتحة الثغر من الداخل بألياف بيضاء ومطاطه (شكل ٩٤ ا) .

القصبه الهوائية : The Trachea


ولها نفس تركيب جدار الجسم بصفة عامة فهى عبارة عن أنبوبة مكونة من خلايا الهيودرمس التى تقوم بافراز الكيوتيكل الموجود داخلها وهذا الكيوتيكل هو استمرار لمثيله المغطى لجدار الجسم ومشابه له إلا أنه ليس به أو به قليل من القنوات المسامية Pore canals . ويتكون كيوتيكل القصبه الهوائية من كيوتيكل داخلى Endocuticle داخل خلايا الهيودرمس مباشرة وكيوتيكل خارجى Exocuticle وأخيرا فى الداخل طبقة الايكويوتيكل Epicuticle ، وعلى هذا فان ترتيب الطبقات المكونة لجدار القصبه الهوائية يكون بعكس ترتيب نفس الطبقات فى جدار جسم الحشرة . ويوجد بين الايكويوتيكل والاكسوكيوتيكل تغليظات حلزونية تسمى تنيديا Taenidia تعمل على تقوية القصبه الهوائية وتضمن جعلها مفتوحة باستمرار (شكل ٩٤ هـ) .

وتشاهد على السطح الخارجى للايكويوتيكل (جهة فراغ القصبه الهوائية) بواسطة الميكروسكوب الالكترونى زوائد وبروزات مختلفة الاشكال .


الاكياس الهوائية : The Air-sacs

يحتوى الجهاز القصبى على انتفاخات كبيرة نسبيا تعرف بالاكياس الهوائية (شكل ٩٥ جـ) وهى تقوم بعملية التهوية الميكانيكية ، حيث أن انفراج هذه الاكياس يعمل على دفع الهواء إلى داخل القصبات الهوائية ، وعند انقباضها يضغط هذا الهواء للداخل فى الفروع التى تخرج من هذه الاكياس الهوائية وهكذا . وتظهر جدر هذه الاكياس الهوائية تحت الميكروسكوب مجمدة وهذا التجعيد يسمح لجدرها بالاتساع .

وتركيب جدار الكيس الهوائى يشابه تركيب جدار القصبة الهوائية تماما إلا أنه في بعض الحشرات كالنحل مثلا لا يوجد بجدار أكياسها الهوائية حلزون التنديدا ولكن في البعض الآخر كالذباب مثلا يوجد هذا الحلزون .



- شكل (٩٤) : (أ) ثغر تنفس في حشرة أولية (يفتح ويقف الثغر بأنسجة ضامة).
 (ب) ثغر الصرصار من الخارج. (ج) ثغر الصرصار من الداخل.
 (د) الثغور التنفسية في نهاية بطن يرقة ذبابة.
 (هـ) قطاع طولى في ثغر ذو غرفة وجهاز فتح وقفل داخل.



- شكل (٩٥) : (أ) فغر تنفس في يرقة من رتبة حرشفية الأجنحة (من الداخل).
 (ب) نظام أو طرق توزيع حلزون التديم داخل القصبات الهوائية.
 (ج) كيس هوائي.
 (د) القصبات الهوائية عند اتصالها بالأنسجة وقت الراحة.
 (هـ) القصبات عند اتصالها بالأنسجة وقت النشاط.

سلوك الجهاز القصبي عند الانسلاخ (هتون ، ١٩٤٧) :


في الحالات التي تكون فيها فتحة الثغر التنفسي واسعة وعاملة باستمرار يخرج منها كيوبيكل الجهاز القصبي القديم بعد تكوين الكيوبيكل الجديد تحته (شكل ٩٦) . وفي الثغور التنفسية من النوعين Uniforous و Biforous ، قد يكون لهذا الثغر التنفسي فتحة ولكنها تكون مقفلة (خلاف الشق أو الشقين الضيقين اللذين يدخل خلالهما الهواء من الخارج إلى الانبوتين ثم إلى الغرفة الثغرية ومنها إلى القصبة الهوائية) ولا تفتح إلا عند الانسلاخ فقط ليخرج منها الكيوبيكل القديم للقصبة الهوائية ، ولذا سميت مثل هذه الفتحة باسم فتحة الانسلاخ Ecdysial opening (شكل ٩٦ ب) . وقد لا توجد بالمرءة فتحة الانسلاخ هذه في النوعين المذكورين الآخرين وعندئذ تنمو أنبوبة جانبية عند قاعدة القصبة الهوائية (جهة غرفة الثغر) وتفتح هذه الأنبوبة للخارج بفتحة مؤقتة (شكل ٩٦ ج) وتسمى هذه الأنبوبة الجديدة بأنبوبة الانسلاخ Ecdysial tube حيث يخرج عن طريقها كيوبيكل القصبات الهوائية القديم ثم لا تلبث هذه الأنبوبة أن تضمحل وتزول وتقفل الفتحة المؤقتة ولا يظهر من أثرها إلا ندبة شيتينية Scar غامقة على جدار جسم الحشرة من الخارج بجوار الثغر التنفسي وكذلك ندبة أخرى داخلية عند مكان اتصالها بالقصبة الهوائية .

ميكانيكية التنفس :

عند الراحة تكون نهايات القصبات الهوائية (والمسماة بالقصبيات الهوائية Tracheoles) والتي تنتهي بين خلايا النسيج في الحشرة وجدارها ذات تركيب بروتيني وليس كيتيني كما هو الحال في جدار القصبات حيث أن القصبيات تنشأ أثناء النمو الجنيني من بروتوبلازم الخلية اللهبية Flsme or End Cells ، ويدخل القصبيات يوجد الحلزون Taenidium على هيئة حلقات أو لولب أو مجموعة من اللولبات . (كما في شكل ٩٥ ب) ، ويبلغ قطر القصبة عند مبدئها ٤ر - ٢ر من الميكرون وعند نهايتها نحو ٥ر. من الميكرون ، والقصبيات مملوءة بسائل معين (ماء أو محلول ملحي ١ ٪) ويعطى ضغطاً أسموزياً لا يزيد عن ١٠ ضغط جوى) . أما عند الطيران أو عند قيام النسيج بعمل ما أو بمعنى آخر عند زيادة التمثيل الغذائي لهذا النسيج يترتب على هذه الزيادة ارتفاع الضغط الأسموزي للسائل الموجود داخل القصبيات فينتقل هذا السائل ومعه كل الأكسجين الذائب فيه إلى داخل النسيج (شكل ٩٥ هـ) وعند رجوع التمثيل الغذائي إلى ما كان عليه قبل النشاط يرجع السائل السابق ذكره ليملاً نهايات القصبيات الهوائية ثانية (شكل ٩٥ د) .

ومن جهة أخرى يعتقد بيمنت (Beament ١٩٦٤) أنه لا يدخل للضغط الأسموزى (Osmosis) فى انتقال السائل من نهايات القصبيات الهوائية إلى أنسجة الحشرة أو العكس بل يرجع هذا إلى قوى طبيعية (Physical Forces) حيث توجد القصبيات مفتوحة داخل الخلايا ولا يحجبها عن تلك الخلايا أية أغلفة خلوية.

أما بالنسبة لغاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن التمثيل الغذائى فإنه لا يدخل مطلقاً نهايات القصبيات بل يطرد من الأنسجة المختلفة التى تفرزه خلال جدرانها ليذهب إلى الدم مباشرة وذلك بخاصية الانتشار Diffusion، ومن الدم ينفذ الغاز إلى الخارج عن طريق جدار جسم الحشرة الرقيق أو عن طريق الأغشية الموجودة بين الحلقات المختلفة Intersegmental Membranes أو قد يخترق هذا الغاز بعد طرده إلى الدم جدار القصبات الهوائية ومنها يذهب إلى الخارج عن طريق الثغور التنفسية، وكل ذلك يتم عن طريق خاصية الانتشار أيضاً.




التنفس في الحشرات المائية : Respiration in Aquatic Insects

تنفس بعض الحشرات المائية الأكسجين الذائب عن طريق جدار الجسم إذا لا توجد لها ثغور تنفسية، وفي مثل هذه الحشرات المائية يكون جدار الجسم رقيقاً بدرجة تسمح بانتشار الغازات الذائبة في الماء خلال جدرها (شكل ٩٧ أ). وفي بعض الحوريات المائية يتم التنفس بواسطة خياشيم مزودة من الداخل بقصبات هوائية، ولذا فهي تسمى بالخياشيم القصبية *Tracheal gills*، وتوجد هذه الخياشيم القصبية داخل كيس المستقيم كما في حوريات الرعاش الكبير (شكل ٩٧ ب) أو في نهاية البطن وعلى جوانبها كما في حوريات الرعاش الصغير وحوريات ذبابة مايو. وفي بعض اليرقات المائية كالبعوض مثلاً يوجد في مؤخرة بطنها أنبوبة طويلة توجد في طرفها الفتحة التنفسية لتمتص الهواء الجوي، ولكن عندما تريد يرقة البعوض أن تنفس فعلياً أن تصعد قرب سطح الماء وتخرج الأنبوبة المذكورة لتنفس الهواء الجوي مباشرة (شكل ٩٧ ج). وفي اليرقات التابعة لعائلة الهاموش *Chironomida* وهي يرقات تعيش في الماء توجد زوائد على هيئة أنابيب مملوءة بالدم الأحمر الذي به هيموجلوبين في نهاية بطنها (شكل ٩٧ د) وتسمى هذه الزوائد بالخياشيم الدموية *Blood gills* وتعمل هذه الأنابيب على حمل أكسجين الماء إلى أنسجة الجسم المختلفة. وعندما تريد بعض الخنافس المائية مثل خنفساء *Dytiscus* التنفس فلا بد لها من أن تصعد فوق سطح الماء وتأخذ الهواء الجوي بين أجنحتها وتخزنه على هيئة فقاعات هوائية *Air bubbles* لحين الحاجة إليه، وبعض الخنافس المائية الأخرى يمكنها أن تحجز هذه الفقاعات الهوائية بين الشعر الموجود على أماكن خاصة من أجسامها (شكل ٩٨). كما أن لبعض اليرقات التي تعيش في الماء فتحات تنفسية على نهاية جسمها المدب، ويمكن لمثل هذه اليرقات أن تثقب سيقان النباتات المائية بواسطة مؤخر جسمها وذلك للحصول على الأكسجين الموجود بين فراغات الخلايا الداخلية للأنسجة النباتية وذلك كما في يرقة *Donocia*.


التنفس في الحشرات المتطفلة داخل أجسام حشرات أو حيوانات أخرى :

تحصل الطفيليات الحشرية التي تعيش داخل أجسام عوائلها على الأكسجين اللازم لحياتها بطرق عدة، فمنها ما يكون جدار جسمها رقيق جداً فيحصل تبادل الغازات بين جدار جسمها هذا وبين الأكسجين الموجود في دم العائل كما هو الحال في بعض الحشرات المائية ويخرج ثاني أكسيد الكربون بنفس الطريقة من الطفيل إلى دم العائل. وليرقات ذبابة التاكينا فتحتان تنفسيتان في نهاية بطنها المدببة وبهذه النهاية لليرقة أن تثقب أحد القصبات الهوائية للعائل وتدخل في هذا الثقب الفتحتين التنفسيتين (شكل ٩٩ ج).


وبذلك يمكن ليرقات التاكينا تنفس الهواء الجوى الذى يتنفسه العائل . وفى يرقة نغف جلد البقر Hypoderma (رتبة الذباب) أو غيرها والتي تعيش تحت جلد المواشى نجد أن مؤخرة بطن اليرقة المذكورة مدببة وبها فتحتان تنفسيّتان ويمكن لليرقة ثقب الجلد بهذه النهاية لكي تنفس الهواء الجوى مباشرة (شكل ٩٩ أ، ب).



- شكل (٩٧) : (أ) التنفس خلال جدار جسم الحشرة .
 (ب) نهاية بطن حورية الرعاش الكبير (التنفس خلال جدار المستقيم).
 (ج) يرقة البعوضة (التنفس عن طريق السيقون).
 (د) عذراء البعوضة (التنفس عن طريق السيقون).
 (هـ) نهاية بطن يرقة الهاموش (التنفس عن طريق الخياشيم الدموية).



شكل (٩٨) : (أ) قطاع في مكان فتحات الثغر لبيان إتصال القصبة الهوائية بالمرات المؤدية إلى جدار جسم حشرة *Aphelochelirus*.
 (ب) جزء مكبر من البلاسترون.



شكل (٩٩) : (أ) يرقة Blatothrix في عمرها الأول.
 (ب) يرقة Thrixion محاطة بغلاف من جدار جسم العائل.
 (ج) يرقة ذبابة التاكينا متصلة بالقصبنة الهوائية ليرقة حفار ساق
 الذرة الأوروى.

الباب الثامن

الجهاز الهضمي

أولاً: القناة الهضمية : The Alimentary Canal

القناة الهضمية هي أنبوبة يختلف طولها باختلاف الحشرات ، فقد يبلغ طولها طول الجسم أو يزيد هذا الطول كثيراً عن جسم الحشرة مما يجعلها تلتف وتلتوي على بعضها داخل الجسم . وأبسط وأكثر أنواع القنوات الهضمية هي الموجودة في يرقات رتب حرشفية الأجنحة (شكل ١٠٠ أ) وغشائية الأجنحة والحوريات والحشرات الكاملة لرتب الحشرات بسيطة التطور Apterygota وجلدية الأجنحة وبعض مستقيمة الأجنحة (شكل ١٠٠ ب) . أما أطول أنواع القنوات الهضمية فهي التي توجد في الحوريات والحشرات الكاملة لرتب متشابهة ونصفية الأجنحة (شكل ١٠١) ويرقات الذباب التابعة لرتب رتبة Cyclorrhapha حيث تفوق القناة الهضمية طول الجسم عدة مرات (شكل ١٠٠ ج) وكقاعدة عامة تطول القناة الهضمية في الحشرات التي تتغذى على سوائل (باستثناء يرقات رتبة غشائية الأجنحة حيث تقصر قنواتها الهضمية مع أنها تتغذى على السوائل) . وتتكون القناة الهضمية في الحشرات (شكل ١٠٠) من ثلاث مناطق رئيسية هي :

١ — القناة الهضمية الأمامية : The Fore-gut (or Stomdaeum)

وتبدأ بفتحة الفم الذي يؤدي إلى البلعوم الذي يعرف بوجود عضلات قابضة متصلة بسطحه وهذه العضلات تنشأ على صفيحة رأس الحشرة .

يلي البلعوم المريء وهو ضيق نوعاً ثم يتسع في نهايته الخلفية ليكون ما يسمى بالحوصلة . هذا في الصرصار ، أما في الذباب وأنى دقيق والفرشات فنشأ الحوصلة كأنبجاء جانبي يتصل بالمريء بقناة رفيعة (شكل ١٠٢ ب) ، وتعتبر الحوصلة كمخزن مؤقت للغذاء لحين انتقاله إلى المعدة عند الحاجة أو كما في الصرصار تعتبر الحوصلة مكاناً يبقى فيه الغذاء فترة حتى يهضم أغلبية وذلك برجوع انزيمات الهضم التي تفرزها المعدة للخلف خلال القونصة لتصل إلى الحوصلة حيث تقوم بعملية الهضم المذكورة . يلي الحوصلة القونصة وهو جزء عضلي سميك ومبطن من الداخل بأسنان شينينية حادة ، وتعمل القونصة كمنخل لا تسمح بمرور الغذاء إلى المعدة إلا إذا كان هذا الغذاء مفتتاً إلى

أجزاء صغيرة، كما تقوم القونصة أيضاً بتفتيت وتكسير الطعام، وفي مرحلة العسل تقوم القونصة بغرلة الغذاء (حبوب اللقاح من الرحيق).

تدخل نهاية القونصة (أو الحوصلة في الحشرات التي ليس لها قونصة كاليرقات مثلاً) في داخل المعدة كما يشنى مقدم المعدة على مؤخرة القونصة فيتكون بذلك صماماً مرهياً Oesophageal valve (شكل ١٠٣ ب)، ويحاط هذا الصمام المرهى بعضلات دائرية قوية ويعمل على تنظيم مرور الغذاء من القناة الهضمية الأمامية إلى القناة الهضمية الوسطى أو العكس.

وتركب القناة الهضمية الأمامية هستولوجيا من خلايا طلائية (ابنليم) صغيرة الحجم لا تظهر الفواصل الموجودة بينها في أغلب الأحوال، وغالباً ما تكون الخلايا موجهة في ستة إنشاءات (شكل ١٠٤ أ)، وتبطن الخلايا من الداخل بطبقة من الشيتين المسمى إنتيما Intima وتغلف من الخارج بطبقة من العضلات الطولية فوقها طبقة أخرى من العضلات الدائرية وقد لا توجد طبقة العضلات الطولية بالمرة.

القناة الهضمية الوسطى : The Mid-gut (or Mesenteron)

وهي المعدة Stomach وتكون هستولوجيا (شكل ١٠٤ ب) من طبقة من الخلايا الطلائية العمودية أو المكعبة التي يوجد على حوافها الداخلية أهداب عبارة عن امتدادات بروتوبلازمية من نفس الخلايا الطلائية، ويطلق على هذه الأهداب Brush-border or Striated-border، ويحيط بخلايا المعدة من الخارج طبقة رقيقة من العضلات الدائرية وخارجها طبقة أخرى من العضلات الطولية، وتوجد عند قواعد الخلايا الطلائية العادية الكبيرة خلايا صغيرة تعرف بالخلايا الجنينية Embryonic or Replacement or Imaginal cells، وتوجد هذه الخلايا الجنينية إما فردية أو في مجاميع صغيرة في الأطوار الغير كاملة كالحوريات واليرقات، وفائدة هذه الخلايا الجنينية تكوّن القناة الهضمية الوسطى للحشرة الكاملة وذلك أثناء عملية التطور Metamorphosis، وفي الحالات التي تشاهد فيها هذه الخلايا الجنينية في القناة الهضمية الوسطى للحشرة الكاملة سببه راجع إلى انتقالها كما هي إلى طور الحشرة الكاملة أثناء عملية التطور بدون أن يحدث بها أى تغيير. وفي بعض الحشرات كما في رتب حرشفية الأجنحة والذباب وغشائية الأجنحة تظهر القناة الهضمية الوسطى مقسمة إلى ثلاثة أجزاء واضحة، جزء أمامي يسمى Pro-enteron مكون من عدد قليل جداً من الخلايا الصغيرة الحجم ملاصقة لنهاية القناة الهضمية الأمامية مباشرة، وجزء وسطي يسمى Mes-enteron يشمل أغلب خلايا المعدة ويتكون من خلايا كبيرة الحجم وهي التي سبق وصفها هستولوجيا، أما الجزء

الثالث ويسمى Met-enteron فهو صغير ومكون من عدد قليل جداً من الخلايا تصل بين الجزء الأخير من الـ Mes-enteron ومقدم القناة الهضمية الخلفية، وغالباً ما يقع هذا الجزء الأخير خلف مكان خروج أنابيب مليجي ويستدل من هذا على أن منشأ أنابيب مليجي هو من القناة الهضمية الوسطى وليس من القناة الهضمية الخلفية كما يذكر بعض الحشريون (هنسون Henson ، ١٩٣٢ ، ١٩٤٦). وفي رتب الحشرات التي تظهر فيها القناة الهضمية الوسطى كجزء واحد فقط وهو Mes-enteron فإن ذلك لا يرجع إلى غياب كل من Pro-enteron والـ Met-enteron ولكن يرجع ذلك إلى أنهما قد يكونا مختلطين لدرجة أنه قد لا يكون موجوداً من كل منهما إلا خلية واحدة فقط أو عدة خلايا كما في رتبة غمدية الأجنحة .

الزوائد الأعورية : The Enteric or Gastric Caeca


في بعض الحشرات قد توجد زوائد أعورية عند مقدم المعدة أو على طول امتدادها وذلك لزيادة السطح الداخلي للمعدة، وتركيب هذه الزوائد الأعورية يشابه تماماً تركيب المعدة، وقد تحوى هذه الزوائد الأعورية على بكتيريا لها صلة بعمليات الهضم والتغذية، كما أنها تفرز نفس الإنزيمات الهضمية التي تفرزها خلايا القناة الهضمية الوسطى .

الغشاء المحيط بالغذاء : The Peritrophic Membrane


في أغلب الحشرات يحيط بالغذاء الموجود في فراغ المعدة الداخلي غشاء شيتيني بروتيني شبكى الشكل Reticular، وهذا الغشاء رفيع جداً إذ يبلغ سمكه أقل من نصف ميكرون، ويتكون من طبقة واحدة في الغالب ولكن في بعض الحشرات قد يكون مكوناً من أكثر من طبقة، ويفرز هذا الغشاء بواسطة خلايا المعدة الموجودة جهة الصمام المريئى كما في رتب حرشفية الأجنحة والذباب أو قد تفرزه جميع خلايا المعدة كما في حشرات رتب مستقيمة الأجنحة والرعاشات وغمدية الأجنحة وغشائية الأجنحة .

ويعمل هذا الغشاء على حماية خلايا المعدة من التآكل بسبب احتكاك حبيبات الغذاء بها، وهو يسمح بمرور إنزيمات الهضم التي تفرزها خلايا المعدة لهضم الطعام خلاله، كما يسمح في نفس الوقت بمرور الطعام المهضوم إلى خلايا المعدة ومنها إلى الدم بخاصية الانتشار .

ولا يوجد هذا الغشاء بطبيعة الحال في الحشرات التي تتغذى على سوائل كأغلب الفراشات وأنى دقيق وكل الحشرات التابعة لرتبة نصفية الأجنحة (ماعدا عائلة Corixidae)، وهو غير موجود أيضاً في يوقات خنافس السجاد (في جنس Anthrenus) وخنافس عائلة Carabidae .



شكل (١٠١) : القناة الهضمية في حشرة من رتبة نصفية الأجنحة.



شكل (١٠٤) : (أ) جزء من قطاع عرضي في البلعوم.
 (ب) جزء من قطاع عرضي في المعدة.
 (ج) جزء من قطاع عرضي في المستقيم ويشمل حلمتين من حلمات المستقيم.

ثانياً: الهضم في الحشرات : Digestion in Insects

غالباً ما تكون عصارة المعدة حامضية خفيفة (رقم الحموضة من ٦-٧)، أما اللعاب فهو متعادل في الغالب. وفي الحشرات التي تتغذى على النباتات تكون عصارة المعدة قلوية (رقم الحموضة من ٤ و ٨ - ٣ و ١٠)، وفي الحشرات آكلة اللحوم تميل عصارة المعدة إلى الحموضة كما في بعض يرقات الذباب (رقم الحموضة ٣). وعصارة الحوصلة في الصراصير دائماً حمضية نظراً لإحتوائها على حمض اللكتيك الناشئ عن السكريات.

وفي الحشرات الرمية التي تتغذى على أغذية نباتية وحيوانية كالصرصار الأمريكى تحوى معدته أنزيمات المالتيز واللاكتيز والأميليز والأنفرتيز والليباز والبروتينيز وبيتيدات Peptides، والحوصلة في الصرصار المذكور هى المكان الرئيسى للهضم حيث تنتقل إليها إنزيمات الهضم من المعدة، وبعد الهضم ينتقل الغذاء المهضوم إلى المعدة حيث تمتص السكريات الأحادية والأحماض الأمينية والدهنية وتنتقل إلى الدم وخاصة في الأنابيب الأعورية.

وفي الحشرات التي تمتص الدم كبعوض أنواع الذباب والبعوض تفرز الغدد اللعابية مادة تمنع تجلط الدم Anti-coaguline ولكنها لا تفرز إنزيمات هاضمة، وفي مثل هذه الحشرات تفرز المعدة كميات كافية من إنزيم البروتينيز Protease داخلها لهضم البروتين الموجود في الدم، ومعدة مثل هذه الحشرات يوجد بها إنزيم الأميليز Amylase بكميات بسيطة جداً.

وفي أنواع الذباب التي تتغذى على السكريات نجد أن إنزيم البروتينيز في معدتها ضعيف جداً في حين أنه توجد إنزيمات الأميليز والأنفرتيز Invertase والمالتيز Maltase بكثرة. وفي معدة الفراشات وأبى دقيق حيث يتكون الغذاء من رحيق الأزهار فقط نجد أن الأنزيم الوحيد الموجود في لعابها وكذلك في معدتها هو إنزيم الأنفرتيز الذى يحلل السكر الموجود في الرحيق.


وبينما نجد أن أكثر الحشرات الآكلة للأوراق أو فروع النباتات تترك السليلوز يخرج مع البراز بدون هضم وبدون الاستفادة منه نجد أن البعض الآخر الذى يتغذى على مثل هذه المواد السليلوزية يمكنها أن تستفيد بالسليلوز وهو المكون الأساسى لهذه الأوراق والأفرع إذ أن هذه الحشرات يمكنها إفراز إنزيم السليليز Cellulase الذى يهضم مادة السليلوز كما في يرقات الحفارات التابعة لعائلة Buprestidae (رتبة غمدية الأجنحة). وبعض حفارات الأخشاب التي لا يمكنها إفراز إنزيم السليليز مثل يرقات عائلة Lyctidae ويرقات عائلة

Bostrichidae (رتبة غمدية الأجنحة) تتغذى فقط على الخشب القريب من سطح الساق والغنى بمادتي النشا والسكر حيث يمكنها الإستفادة بهما فقط دون مادة السليلوز نفسها (يرقات حفارات الخشب من عائلة Cerambycidae التابعة لرتبة غمدية الأجنحة أيضاً تستفيد من محتويات الخلايا وكذلك من فعل إنزيم النصف سليلوز الموجود بها). وحفارات ساق الصفصاف Cossus sp. والكازوا رينا Stromatium sp. التي تتغذى على الخشب يوجد بمعدتها إنزيم الليكينيز Lichenase الذى يحلل الليكين وهو من السكريات العديدة السداسية ويقرب السليلوز في تركيبه ويجعله قابلاً للذوبان في الماء ولكن لا يحلل هذا الإنزيم السليلوز.

أما الإنزيمات التي تهضم الدهون في الحشرات فهي إنزيم الليبير الموجود في معدة الصرصار وإنزيم الاستريز الذى يوجد في الذباب المنزلى وفي بعض الحشرات التي تمتص الدم وإنزيم الأرايل سلفيتيز Aryl sulphatase الذى يوجد في حوصلة الجراد وإنزيم الليسيثينيز والكولين استريز اللذان يوجدان في دودة الشمع.



شكل (١٠٦) جزء مكبر من خلية من خلايا حلمات المستقيم.



شكل (١٠٧) : منظر عام لحلمة من حلمات المستقيم لبيان سير السوائل من فراغ الجسم إلى الدم وليان اتصال هذه الفراغات بفراغ الجسم. الأسهم الفارغة تشير إلى دخول الماء من فراغ القناة الهضمية إلى حلمة المستقيم. والأسهم المصمتة تشير إلى تعويض الماء ثانية للحلمة من فراغ الجسم.

وفي القناة الهضمية الخلفية للنمل الأبيض Termites (رتبة متساوية الأجنحة) شكل ١٠٣ أ) والقناة الوسطى لبعض أنواع الصراصير والخنافس توجد بروتوزوا Protozoa تقوم بإفراز إنزيم السليليز لهضم سليولوز الخشب الذي تتغذى عليه هذه الحشرات. وتوجد حشرات أخرى تحوى خلايا أنسجتها الداخلية مثل خلايا المعدة أو الأنابيب الأعورية أو الأجسام الدهنية أو أجسام خاصة تسمى Mycetomes بكتيريا أو خميرة أو فطر كما فى القمل وأنواع البق وبعض الخنافس، أو قد توجد هذه الكائنات الدقيقة سائبة فى فراغ القناة الهضمية، ومثل هذه الكائنات الدقيقة تعيش معيشة تبادل منفعة Symbiosis التى تساعد على هضم سليولوز الخشب، كما تمد هذه الكائنات الدقيقة عائلها الحشرى بالفيتامينات والبروتينات ومواد نمو أخرى غير معروفة، ولو أن يرقات خنافس الخشب من

عائلى Cerambycidae وأنوبيد Anobiidae توجد بقناتها الهضمية إنزيمى السليليز والنصف سليليز ولا تستفيد فى هضم الخشب من البكتريا الموجودة فى معدتها ولكنها تستفيد بها فى سد احتياجاتها من الفيتامين. وتحتوى معدة فراشة الحرير (Bombyx sp.) إنزيم السريسينيز Sericinase الذى يحلل مادة الحرير اللاصقة Silk cement ، كما يوجد إنزيم الكيتينيز Chitinase فى يرقات بعض حشرات رتبة غشائية الأجنحة التى تتغذى على العناكب ويسمح لها هذا الإنزيم بهضم جدار جسم العائل.

وبعض الحشرات التى تعيش على الصوف والفراء كفراش الملابس Tineola sp. يمكنها تحليل الصوف بواسطة إنزيمات كثيرة مثل إنزيم Dipeptidase وإنزيم Aminopoiypeptidase وإنزيم Carboxy polypeptidase كما وأن حشرات مثل القمل القارض Order Mallophaga التى تتغذى على الشعر والريش وخنافس الأنث من جنس Anthrenus التى تتغذى على المواد القرنية فتحوى عصارات معدتها مواداً مختزلة لم تعرف بعد تكسر المواد المذكورة وبذلك يمكن لهذه الحشرات الإستفادة منها. وليرات دودة الشمع القدرة على تحليل الشمع الذى تتغذى عليه وذلك لوجود بكتيريا بداخلها تمكنها من هضم هذا الشمع والإستفادة بمكوناته. ومادة الكولاجين Collagen تقاوم الهضم بعصارات الحشرات ولا تهضمها إلا يرقات الذباب فى جنس Lucilia التى يمكنها إفراز إنزيم Conagenase

أما عن احتياجات الحشرات من الفيتامينات فقد دلت الأبحاث على أنها تحتاج للفيتامينات التى تذوب فى الماء مثل الثيامين Thiamin والريبوفلافين Riboflavin والنياسين Niacin وحمض البنتاثونيك Pantathonic acid والبيروكسين Pyridoxin والبيوتين Biotin وحمض الفوليك Folic acid والكولين Choline ، وتحصل الحشرات على هذه الفيتامينات من الغذاء الذى تتناوله أو من البكتيريا أو الفطر أو الخميرة أو البروتوزوا الموجودة داخل أجسامها.

ومن المعادن تحتاج الحشرات جميعاً إلى الفوسفور والكوبالت والمغنسيوم والمنجنيز ، وتحتاج يرقات البعوض إلى الكالسيوم، كما تعتبر أملاح الصوديوم والزنك والحديد والنحاس هامة أيضاً.

أما عن امتصاص نواتج هضم وإتحلال الغذاء فأتضح أن الكربوهيدراتات تتحلل إلى سكريات أحادية قبل امتصاصها فى خلايا المعدة (Mid-gut). وتمتص بعض الدهون دون تحللها أو هضمها رغماً عن وجود إنزيم الليباز، ولكن من المحتمل أنها تتحلل بعد

امتصاصها ثم يعاد تركيبها مرة أخرى لتخزينها في جسم الحشرة، وعلى العموم يكون امتصاص الدهون في القناة الهضمية الأمامية Fore-gut والمعدة والأنابيب الأوروية (كما في بعض الصراصير) بل وحتى في القناة الهضمية الخلفية Hind-gut ، كما في بعض حشرات رتبة غشائية الأجنحة). أما عن البروتينات فهي تتحلل بواسطة إنزيمات معينة السابقة ذكرها إلى أحماض أمينية قبل امتصاصها.

ويمتص الماء والأملاح (الصوديوم والبوتاسيوم) والكلور واليود والحديد والأحماض الأمينية والسكريات الأحادية والأصبغ في القناة الهضمية الخلفية، كما يمكن للمعدة أيضاً امتصاص الماء وأيونات الكلور والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والنحاس.

أما عن الجوع وأثره على الحشرة فقد أتضح أن النقص في كمية غذاء اليرقة لا يمنعها من إتمام دورة حياتها ولكن الفراشة الناتجة تكون صغيرة، كما ظهر أن التجويع الجزئي لدودة فراش الملابس تطيل من عمر اليرقة وتزيد عدد الإنسلاخات وتقلل حجم الفراشة وعدد البيض الناتج، كما يؤدي التجويع الكلي أو الجزئي أثناء الجزء الأخير من حياة اليرقة إلى الأسراع في التعذير في معظم الحشرات الكاملة التطور، كما تفقد اليرقات والحوريات نسبة كبيرة من الجليكوجين والدهن بسبب التجويع. وقد يغير التجويع الجزئي أحياناً الصفات الخارجية للحشرة كلون العين ونسب أجزاء الأجنحة واختزال قرون الاستشعار والتغير في جنس العائل (تحت تأثير طفيل بجانب الجوع) وغير ذلك.

ويقوم الجهاز الهضمي بتقلصاته دورياً وتلقائياً Rhythmically ، إذ يغذى القناة الهضمية الأمامية وربما مقدم المعدة كذلك أعصاب آتية من العقدة الجبهية Frontal ganglion بينما يغذى القناة الهضمية الخلفية أعصاب آتية من العقدة العصبية البطنية الأخيرة، هذا وقد يكون الاستيائل كولين هاماً في حركة القناة الهضمية الخلفية وكذلك في إفرازات عقدتي c a ، c c وكذلك إفرازات العقدة تحت المريء.

ثالثاً: أنابيب مليجي : The Malpighian Tubules (or Tubes)

ولو أن خروج غازك أم الناتج عن عملية التمثيل الغذائي من جسم الحشرة للخارج يعتبر عملية إخراجية إلا أنه يعد من المسائل الثانوية التي يأتي ذكرها في أماكن أخرى كما في الجهازين التنفسي والدوري مثلاً. ولكن أهم المواد التي يتم إخراجها عن طريق أنابيب مليجي هي الماء والأملاح والمواد الآزوتية الثالفة كحمض اليوريك Uric acid (الناتج عن التمثيل الغذائي لهضم البروتين) وكذلك بعض المواد العضوية الغير مرغوب فيها. هذا علماً

بأنه توجد في الحشرات أنسجة أخرى وظيفتها إخراجية أيضاً مثل الجسم الدهنى Fat body والخلايا النبيذية Oenocytes والخلايا الجار قلبية Nephrocytes أو Pericardial cells (والتي يأتي ذكرها مع الجهازين الدورى والعصبى) والغدد الصماء Corpora allata و C. cardiaca. كما أن بعض المواد التالفة الناتجة عن التمثيل الغذائى تحول إلى حبيبات Pigments ترسب في حراشيف أجنحة بعض الحشرات حشفية الأجنحة كما في أئى دقيق الكرب أو ترسب في جدار الجسم كما في خنفساء الكلورادو وتعطىها الألوان الصفراء الزاهية المميزه لها. هذا وتعتبر غدد الحشرات التى تفرز الشمع أو الروائح المختلفة أماكن تركب فيها المواد المذكورة من مواد تالفة وعلى ذلك فهى تقوم بعملية إخراجية بطريقة غير مباشرة.

وتفرز أنابيب مليبجى لبعض الحشرات من عائلة Cercopidae (رتبة نصفية الأجنحة Homoptera) الحزير والرغوة التى تغطى بها البيض أو توجد تحتها الحوريات، وفي حشرات أخرى من عائلة Chrysomelidae (رتبة غمدية الأجنحة) تفرز أنابيب مليبجى مادة لزجة على الرجل الخلفية الكاذبة لتساعدها على التقدم أثناء السير.



وتتكون أنبوية مليبجى هستولوجيا (شكل ١٠٨ أ، ج) من خلايا طلائية (٣-٨ خلايا غالباً في القطاع العرض) تشبه خلايا المعدة إذ أن لها أهداب داخلية Brush-border، كما يوجد عند قواعد خلاياها في الأطوار الغير كاملة كاليرقات والحوريات بعض الخلايا الجنينية الصغيرة Replacement cells التى تنشط عند التطور وتكون أنابيب مليبجى الحشرات الكاملة كما في رتب حشفية الأجنحة وغمدية الأجنحة مثلاً. والخلية العادية في أنبوية مليبجى كبيرة الحجم وذات نواة كبيرة وتشاهد عند حافتها الخارجية منطقة مخططة، وتغلف أنبوية مليبجى من الخارج بغلاف بريتنوى Peritoneal membrane مكون من نسيج ضام.

وتقسم الحشرات بالنسبة إلى وجود ألياف عضلية غير إرادية في جدار أنبوية مليبجى إلى أربعة أقسام هى:

- ١- في رتب ذات الذنب الشعرى وجلدية الأجنحة وهديية الأجنحة لا توجد عضلات في جدر الأنابيب.
- ٢- في رتب حشفية الأجنحة وذات الجناحين وترايكيترا وبعض نصفية الأجنحة توجد العضلات عند قواعد الأنابيب فقط.
- ٣- في رتب غمدية الأجنحة وشبكية الأجنحة لا توجد العضلات على طول جدار الأنبوية بأكملها.

٤ — في رتبتي مستقيمة الأجنحة والرعاشات توجد ليفة عضلية واحدة أو ليفتان تلتفان حلزونياً حول طول الأنبوبة كلها.

وتعمل العضلات المذكورة في النوعين الأخيرين (٣، ٤) على تدفق الدم فوق الأسطح الخارجية للأنابيب وربما أيضاً للعمل على حركة المواد داخل الأنابيب.



شكل (١٠٨) : (أ) قطاع عرضي في أنبوبة مليجي.

(ب) نهايات أنابيب مليجي مرتبطة بجدار المستقيم.

(ج) جزء مكبر من خلية من خلايا أنبوبة مليجي.

وقد يكون التركيب الهستولوجى لكل أنبوبة مليبجى متشابه أو قد تقسم إلى مناطق مختلفة التركيب والوظيفة.

وفى بعض الرتب الحشرية كمستقيمة الأجنحة وغشائية الأجنحة يزيد عدد أنابيب مليبجى باستمرار عند كل إنسلاخ وأيضاً عند التطور ثم يزيد العدد أيضاً عند خروج الحشرة الكاملة من الحورية أو من العذراء وترجع هذه الزيادة فى عدد أنابيب مليبجى إلى أن الأنابيب الجديدة تنشأ من بعض الخلايا الجنينية الموجودة عند أماكن نشوئها، وتعرف أنابيب مليبجى الناشئة من الخلايا الجنينية بعد تمام النمو الجنينى (أى فى أثناء تطور اليرقة أو الحورية) بأنابيب مليبجى الثانوية Secondary M.T. تميزها عن الأنابيب الأولية Primary M.T. التى تكونت أثناء النمو الجنينى قبل الفقس. وغالباً ما توجد أنابيب مليبجى فى أزواج يختلف عددها باختلاف الحشرات كما فى الجدول (٣).

هذا ولا يوجد برتبة ذات الذنب القافر (Collembola) أنابيب مليبجى بالمرّة بينما تمثل هذه الأنابيب فى رتب بروتورا ودبلورا بحلمات صغيرة.

ويختلف شكل أنابيب مليبجى فى الحشرات المختلفة، فقد يكون على هيئة أنبوبة بسيطة كما فى الصرصار أو شجريا كما فى دودة الشمع، أو قد يخرج منها تفرعات قصيرة مقفلة كما فى حشرة Melolontha.


وتفتح كل أنبوبة من أنابيب مليبجى عادة فى القناة الهضمية بفتحة مستقلة، كما فى الصرصار، أو قد يتحد أكثر من أنبوبة واحدة لتكوين قناة واحدة مشتركة تفتح فى القناة الهضمية كما فى يرقات رتبة حرشفية الأجنحة، وفى عائلة الحفار Gryllidae تفتح كل أنابيب مليبجى مجتمعة فى فتحة واحدة مشتركة.

وفى الغالب يكون الطرف السائب لكل أنبوبة من أنابيب مليبجى سابحاً فى فراغ الجسم كما فى الصرصار. وفى بعض الحشرات الأخرى تلتصق نهاية الأنبوبة بجدار القناة الهضمية الخلفية ولكن لا تفتح فيها مطلقاً كما فى كثير من يرقات غمدية الأجنحة (شكل ١٠٨ ب) وحرشفية الأجنحة، ويطلق على هذا النوع الأخير من أنابيب مليبجى Cryptonephric system، ويعتقد بعض الحشريون أن هذا النوع الأخير من أنابيب مليبجى يساعد على زيادة امتصاص الماء من البراز الخارج عن طريق الإنتشار خلال القناة الهضمية الخلفية، ويستدل على ذلك بوجود هذا النوع من أنابيب مليبجى فى الحشرات التى تتغذى على أغذية جافة، ولكن ثبت خلاف ذلك إذ وجد أيضاً فى الحشرات التى تتغذى على غذاء سائل، كما وجدت الأنابيب السائبة الأطراف فى حشرات تتغذى على أغذية جافة.

(جدول رقم ٣) : عدد أنابيب ملييجى فى الحشرات المختلفة

الرتبة	عدد أنابيب ملييجى
١ — الحشرات القشرية واليرقات المتطفلة من رتبة غشائية الأجنحة	٢
٢ — القمل الماض وهديبة الأجنحة ونصفية الأجنحة والذباب.	٤
٣ — عائلة البعوض (رتبة الذباب) ورتبة خافية الأجنحة (البراغيث).	٥
٤ — قمل الكتب وغمدية الأجنحة.	٤ — ٧
٥ — متساوية الأجنحة.	٢ — ٨
٦ — ذات الذنب الشعرى.	٤ — ١٦
٧ — حرشفية الأجنحة.	٦
٨ — شبكية الأجنحة.	٦ — ٨
٩ — جلدية الأجنحة.	٨ — ٢٠
١٠ — ذبابة مايو.	٨ — ١٠٠
١١ — الرعاشات.	٥٠ — ٢٠٠
١٢ — مستقيمة الأجنحة.	٣٠ — ٣٠٠
١٣ — غشائية الأجنحة : ١ — النحل	٦ — ٢٠
ب — الكثير من أفراد تحت رتبة أبكرينا	أكثر من ١٠٠

وتعمل أنابيب ملييجى أساساً على إخراج حمض اليوريك إلى الخارج (على هيئة ملح صوديوم أو بوتاسيوم) إذا أن هذا الحمض يتكون داخل خلايا الجسم نتيجة نواتج التمثيل الغذائى للبروتينات ثم من خلايا الجسم ينتقل إلى الدم وتقدفه فى محلول مائى إلى قنواتها الداخلية ومنها إلى القناة الهضمية الخلفية إلى الخارج مع البراز (شكل ١٠٩). ولقد وجد أن أنابيب ملييجى فى بعض الحشرات تحتوى على أملاح كربونات بدلا من أملاح حمض اليوريك (شكل ١٠٩).



شكل (١٠٩) : رسم توضيحي لبيان فسيولوجية أنبوية مليجي .

الباب التاسع

الجهاز العضلى The Muscular System

يتكون الجهاز العضلى فى الحشرات من نوعين :

١ — جهاز عضلى هيكلى : Somatic or Skeletal M.System


وهو الذى يغطى جدار الجسم من الداخل (شكل ١١٠ ، ١١١) وفائدته تحريك حلقات الجسم ، ويتكون العضل هنا من ألياف Fibres كبيرة الحجم ومتوازية .

٢ — جهاز عضلى حشوى : Splanchnic or Visceral M.System


وهو الذى يغلف الأجهزة الداخلية المختلفة ، ويتكون العضل فيه من ألياف طويلة ودائرية ، وقد تكثر الطولية فى مكان ما والدائرية فى مكان آخر ، أو قد يتداخل النوعان (الطولية والدائرية) مع بعضهما البعض .

والعضلات التابعة لكل من النوعين السابقين (الهيكلى والحشوى) عديمة اللون أو رمادية فاتحة ولو أن عضلات الأجنحة تكون مصفرة أو برتقالية أو بنية خفيفة ، وهى أيضاً مخططة تخطيطاً عرضياً Cross-striated إلا أن هذا التخطيط غير موجود فى بعض الألياف العضلية المكونة لجدار القلب وكذلك فى العضلات المغلفة للقناة الهضمية وأعضاء الأجهزة التناسلية .

وتتركب كل ليفة عضلية Fibre من ألياف كل الجهاز العضلى الهيكلى أو الحشوى من لفيفات Fibrillae (Myofibrils of Sarcostyles) موازية لبعضها البعض ، وهذه اللفيفات توجد مغمورة فى سيتوبلازم Matrix or Sarcoplasm الليفة العضلية ، ويوجد بالسيتوبلازم أنوية Nuclei وجليكوجين ، وتحاط الليفة العضلية من الخارج بغلاف سميك يسمى ساركولما Sarcolemma عبارة عن نسيج ضام .



شكل (١١٠) : العضلات الهيكلية في الصدر المتوسط لحشرة مجحة (بخلاف عضلات الأرجل).




شكل (١١١) : (أ) قطاع بين العضلات الخارجية والداخلية للرجل.
 (ب) قطاع عرضي حلقة بطنية بين العضلات البطنية.
 (ج) قطاع طولى لحلقتين بطنيتين لبيان العضلات الظهرية الخارجية والظهرية الداخلية.

أنواع الألياف العضلية الهيكلية:

يختلف ترتيب الليفيفات (Fibrils) في أى ليفة عضلية (Fibre) تابعة للجهاز العضلى الهيكلى باختلاف الحشرات، وعادة تتبع أحد الأشكال الآتية:

١ - عضلات الطيران الكبيرة للليفيفات:

وتوجد فى رتب الذباب والخنفس وغشائية الأجنحة ونصفية الأجنحة. تبلغ الليفيفات أكثر من ١٠٠ ميكرون فى القطر بل وقد يزيد القطر عن ١ ملم، والميتوكوندريا عديدة الأوجه فى مقطعها العرضى وتوجد بين الليفيفات، وخطوط التلوفراجا (Z)، الميزوفراجما (M) ومنطقة الـ H واضحة، كما توجد فواصل واضحة بين كل مجموعة من مجاميع الليفيفات الكبيرة. وعلى العموم فمجاميع الليفيفات هذه تكون مرتبة وسط الليفة العضلية ومحاطة بطبقة سميكة من الساركوبلازم (شكل ١١٢ أ).



شكل (١١٢): أنواع الألياف العضلية الهيكلية.

٢ - العضلات الهيكلية :

نجد في هذا النوع أن اللفيفات الموجودة داخل الليفة العضلية الواحدة تكون أكثر عدداً مما في النوع السابق، وعلى ذلك تملأ اللفيفات جميع مساحة الساركوبلازم، وتوجد الأنوية إما مبعثرة داخل الليفة أو توجد منضغطة بين اللفيفات والساركولما.

يوجد هذا النوع في عضلات أرجل ويطون الحشرات، وتبلغ الليفة نحو ١٠ ميكرون إلى ١ ملم في القطر، والليفة مربعة أو عديدة الأوجه في مقطعها العرضي، قد تكون الميتوكوندريا كثيرة أو قليلة وموجودة بين اللفيفات أو مرتبة حول خط ال Z، خطوط ال M غائبة وأشرطة ال H غير واضحة (شكل ١١٢ ب).

٣ - الألياف الأنوبية :

وفيها توجد الأنوية مرتبة في صف واحد تحت بعضها البعض في فجوة وسط الليفة العضلية، وترتب اللفيفات حول هذه الفجوة الوسطية بشكل شعاعي، تبلغ اللفيفات ١٠ - ٢٥ ميكرون في القطر، وتوجد الميتوكوندريا في أعمدة بين اللفيفات.

يوجد هذا النوع في عضلات رتب الصراصير والرعاشات، خط الميزوفراجما (M) غير موجود (شكل ١١٢ ج).

٤ - الألياف المنضغطة :

هذا النوع من الألياف العضلية أصفر اللون أو بني فاتح بخلاف الأنواع الثلاثة السابقة التي تكون عديمة اللون أو رمادية. اللفيفات في الليفة العضلية كبيرة الحجم إذ تبلغ ١٠ - ١٠٠ ميكرون في القطر، وتوجد سائبة بدون ساركولما يحيط بها إذ ترتبط اللفيفات ببعضها البعض بواسطة القصبات الهوائية، كما توجد الأنوية المفلطحة على سطح الليفة العضلية، توجد الميتوكوندريا المستديرة الشكل أو المتعددة الأوجه في صفوف طويلة. ويوجد هذا النوع من الألياف العضلية في رتب مستقيمة الأجنحة وترايكوترا وشرشفية الأجنحة، أشرطة الميزوفراجما (M) غير موجودة (شكل ١١٢ د).

التخطيط العرضي في العضلات الهيكلية :

يعزى التخطيط العرضي في العضلات الهيكلية إلى أن كل ليفة عضلية مكونة من منطقة مضيفة وأخرى معتمدة بالتبادل وراء بعضها البعض بطول الليفة، وبتلاصق هذه المناطق المضيفة والمعتمدة في الليفة العضلية الواحدة تظهر الليفة العضلية

(وبالتالى العضلة كلها) مقسمة إلى مناطق مضيقية وأخرى معتمدة متتالية . وتفاصيل هذه المناطق المضيقية والمعتمدة تختلف باختلاف نوع العضل وبإختلاف الحشرات نفسها، ولكن فى أقصى حالاتها تتكون الليفة العضلية من المناطق المبينة فى (شكل ١١٣ أ) .

وعلى العموم فإنه يوجد من الليفات نفسها Fibrils داخل الليفة العضلية Fibre نوعان، أحدهما سميك Thick myofilaments يحيط بها النوع الثانى الرفيع Thin myofilaments فى أشكال متعددة الأوجه Hexagona كما هو موضح فى شكل (١١٣ ج)، والنظام المتعدد الأوجه المذكور واضح فى عضلات الطيران ولكنها غير منتظمة أو غير ظاهرة فى العضلات الجناحية وعضلات القلب والعضلات الحشوية وبعض العضلات الهيكلية حيث تقل بكثرة الليفات الرفيعة . هذا ولقد وجد نوع ثالث من الليفات أرفع من النوع الثانى الرفيع السابق يطلق عليه T - filaments موجود فى ليفة القشريات وفى عضلات سيفون البقه المائية الكبيرة Benacus sp

خط التلوفراجما (Z) : وصف خط التلوفراجما من قبل بأنه غشاء يقسم الليفة العضلية وسمى لمدة طويلة باسم غشاء كراوس Krause's membrane ، ولكن أظهر الميكروسكوب الإلكترونى أن خط التلوفراجما هذا ليس بغشاء بل منطقة ربط بين الليفات بعضها ببعض كما هو واضح فى شكل (١١٣ ب) .


هذا وتغذى الألياف العضلية فى الحشرات شبكة كبيرة من القصيبات الهوائية التى تخترق الساركولما لتتفرع داخل الليفة العضلية، كما توجد بين الليفات أنابيب Tubules .

أنواع الألياف العضلية الحشوية :

قد يوجد من الألياف العضلية الحشوية المخطط وغير المخطط كما سبق القول، والألياف المخططة منها تتشابه فى تخطيطها ونظام تفرعها مع الألياف العضلية فى قلب الفقريات .

اتصال العضلات الهيكلية بجدار الجسم :

لكل عضلة جسمية نقطة اتصال Attachment إحداها ثابتة وتتصل بجدار الجسم وهى نقطة الأصل أو المنشأ أو المبتدأ Origin والأخرى متحركة وتتصل بأى عضو أو جهاز من أجهزة الجسم المختلفة وهى نقطة الارتكاز Insertion . وفى كثير من الحالات تنتهى نهايتا العضلة فى جزء ما من أجزاء الجسم بحيث لا يوجد فارق بين نقطة الأصل ونقطة الارتكاز .



شكل (١١٣) : (أ) ليفة من عضل إرادي لبيان المناطق المضيقّة والمناطق المعتمدة.
 (ب) نموذج للنظام المحتمل الذي يوضح اتصال اللفيفات العضلية عند منطقة الميوزوفراجما.
 (ج) نظام ترتيب اللفيفات المختلفة داخل الليفة العضلية (موضحاً وجود اللفيفات السمكية واللفيفات الرفيعة في أشكال متعددة الأوجه).

وفي حالات كثيرة يوجد بين نقطة منبت العضلة وبين العضلة نفسها حبل Cord أو منطقة شيتينية تسمى Apodeme كما في حالة عضلات الفكوك العليا (شكل ١١٥).
 وتتصل العضلة بجدار الجسم عند نقطة الأصل أو المنبت بطرق مختلفة هي:

- ١ — منبت العضلة قد يكون عند قاعدة خلايا الهيودرمس.
- ٢ — منبت العضلة قد يكون عند النهاية الداخلية للايكيوتيكال.
- ٣ — منبت العضلة قد يكون عند النهاية الداخلية للاكسوكيوتيكال.
- ٤ — منبت العضلة قد يكون عند الحافة العلوية للاكسوكيوتيكال.

- ٥ — قد تجذب العضلة عند اتصالها بجدار الجسم خلايا الهيودرمس للداخل .
 ٦ — قد تجذب العضلة عند اتصالها بجدار الجسم طبقة الأندوكيوتيكل للداخل والتي تسحب معها بدورها للداخل خلية أو أكثر من خلايا الهيودرمس .

وأجزاء اللفيفة العضلية التي تحترق خلية الهيودرمس أو من البروكيوتيكل والتي تسمى Tonofibrilla ماهى إلا استمرار للليفة ومسببها تماماً في الشكل إلا أنها تختلف عنها في منشئها وتركيبها الكيماوى حيث يغيب فيها التخطيط العرضى ، وربما تكون الـ Tonofibrilla إفرازاً شيتينيئياً داخلياً لخلية الهيودرمس .

أنواع العضلات المحركة لزوائد الجسم (شكل ١١١ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦)

- تنقسم العضلات من حيث اتصالها بالجزء الذى تحركه إلى :
 (أ) Extrinsic muscles : وهى التى تنشأ خارج العضو عند قاعدته وتحركه بأكمله كوحدة واحدة .
 (ب) Intrinsic muscles : وهى التى توجد بداخل العضو نفسه ولكنها تعمل على تحريك بعض أجزائه أو حلقات منه .

وتسمى العضلات باسم موقعها أى مكان منبتها واتصالها كالعضلة المسماه بالعضلة البلورية الحرقفية Pleurocoxal muscle لأنها تصل ما بين البلورا Pleuron والحرقفة Coxa .

- وتسمى العضلات أيضاً باسم الوظيفة التى تؤديها كما يلى :
 (أ) عضلة رافعة Levator m. : أى الخاصة برفع أى زائدة أو جزء من الزوائد الجسم كساق الرجل مثلاً .
 (ب) عضلة خافضة Depressor m. : وهى تخفض زائدة من الزوائد .
 (ج) عضلة محركة للأمام Retractor or premotor m. : وتعمل على تحريك العضو إلى الخلف .
 (د) عضلة محركة للخلف Retractor or remotor m. : وتعمل على تحريك العضو إلى الخلف .
 (هـ) وعضلات مقربة ومنها نوعين :

(١هـ) عضلات تعمل على جذب عضو أو زائدة إلى زميلتها المقابلة لها وتسمى Adductor m. .

(هـ) عضلات تعمل على جذب جزء من عضو آخر من نفس العضو

لتقريبه منه وتسمى Flexor m.

(و) عضلات مبعدة ومنها نوعين أيضاً:

(١) عضلات تعمل على سحب عضو أو زائدة بعيداً عن زميلتها المقابلة



لها وتسمى Abductor m.

(٢) عضلات تعمل على أبعاد جزء من عضو عن جزء آخر من نفس

العضو وتسمى Extensor m.

(ز) عضلات تعمل على لف العضو أو الزائدة حول نفسها وتسمى Rotator

m.



شكل (١١٤) :

(أ) عضلات قرن الاستشعار في

حشرة من تحت صف الحشرات


العديمة الأجنحة Apterygota

(الأولية).


(ب) عضلات قرن الاستشعار في

حشرة مجنحة Pterygota.


Locusta (Orthoptera) Japyx (Diplura)



شكل (١١٥) : عضلات الشفة العليا والفك العلوي.



الفن الـ



الفن الـ

شكل (١١٦) : عضلات الفك السفلي والشفة السفلي.

الباب العاشر

الجهاز الدورى والأنسجة المتصلة به The Circulatory System and Associated Structures

ينقسم فراغ جسم الحشرة إلى ثلاث تجاويف Sinuses بواسطة حجابين حاجزين علوى وسفلى (شكل ١١٧ أ) وهذه التجاويف الثلاث هى :

- (أ) التجويف العلوى : Dorsal or Pericardial Sinus
وتجرى فيه أنبوبة الوعاء الظهرى المكونة من القلب والأورطة .
(ب) التجويف الأوسط أو التجويف الحشوى : Visceral Sinus
وبه الجهاز الهضمى .

(ج) التجويف السفلى : Ventral or Perineural Sinus
ويوجد به الحبل العصبى البطنى .

ويلاحظ فى الحشرات أن الدم يملأ جميع هذه الفراغات ويحيط بالأنسجة المختلفة الموجودة بها .

الوعاء الظهرى : The Dorsal Vessel

ويتكون هذا الوعاء (شكل ١١٧ ب) من جزئين الخلفى منهما هو القلب والأمامى هو الأورطة . ويتكون القلب من حجرات يختلف عددها باختلاف الحشرات . وفى العادة يوجد بين كل حجتين متتاليتين زوج من الفتحات (فتحة على كل جانب) تسمى أوستيا Incurrent Ostia فائدتها إدخال الدم من فراغ الجسم إلى داخل القلب . وقد يكون لكل حجرة من حجر القلب أكثر من زوج واحد من هذه الفتحات قد يصل إلى سبعة فى بعض الأحيان .

وفائدة الوعاء الظهرى هو حمل الدم وجمعه من البطن ودفعه إلى الرأس .

فى أغلب الحشرات تكون نهاية القلب مقفلة ولكن فى بعض الأحيان توجد فتحة وسطية فى نهاية القلب من الخلف (شكل ١١٨ ج) . وفى حوريات ذبابة مايو يتصل

بالغرفة الأخيرة من القلب ثلاث صمامات على هيئة ثلاثة أنابيب تصب في زوائد البطن الخلفية (شكل ١١٨ هـ).


وقد توجد في جدار القلب السفلى في بعض حشرات رتبة مستقيمة الأجنحة فتحات سفلية يدخل منها الدم مباشرة من الفراغ الحشوي إلى داخل القلب.

ويتكون جدار الوعاء الظهري من طبقة واحدة من الخلايا ذات النويات الكبيرة الحجم ومادة هذه الخلايا عبارة عن ألياف عضلات دائرية فقط أو دائرية وطولية. ويحاط جدار القلب من الخارج ومن الداخل أنبوية أخرى تحيط به تسمى Adventita وهي مكونة من نسيج ضام. كما يتصل القلب أيضاً بجدار الجسم الجانبي عن طريق العضلات الجناحية The Alary Muscles أو بالحجاب الحاجز العلوى إذ في الغالب يقع القلب فوق هذا الحجاب الحاجز العلوى مباشرة ويتصل به بواسطة ألياف مطاطة (شكل ١١٧ أ).

أما عن الأورطة فلا يوجد به فتحات أوستيا (أى صمامات) ولكن يوجد بينه وبين القلب زوج من الصمامات الأورطية Aortic Valves ويصب في الغالب خلف أو تحت المخ مباشرة. والنهاية الطرفية (الأمامية) للأورطة تكون في بعض الأحيان على شكل القمع ولكنها في الغالب تكون متفرعة إلى عدد من الأوردة الرأسية Cephalic Arteries كما قد ينقسم كل وريد رأسى بدوره إلى أوردة أصغر.

ويتحكم في حركة القلب أعصاب يختلف منشؤها من حشرة لأخرى، ففي الصرصار الأمريكي مثلاً يغذى الأورطة عصبان جانبيين آتيان من العقدة الجبهية والعصب الراجع بينما يغذى غرف القلب أعصاب آتية من العقد العصبية الموجودة في حلقات الجسم (Treherne et al., ١٩٦٥).

وتفرز عقدة Corpora cardiacum (CC) ثلاثة إفرازات مختلفة هي السيروتونينى، أدرينالين ومادة دهنية ثالثة تؤثر أولاً في الخلايا الجار قلبية وتجعلها تفرز بدورها مادة Indolalky lamine التى تتحكم في ضربات القلب عند التغذية حيث أن أعضاء الحس الموجودة على الشفه العليا ترسل الإشارة إلى المخ والذى بدوره يرسل الإشارة إلى العقدة الجبهية فتنتقل بدورها تلك الإشارة عن طريق العصب الراجع إلى عقدة CC فتفرز إفرازاتها كما سبق القول. هذا يؤثر على ضربات القلب كذلك أربعة إفرازات — خلاف الأسيتايل كولين — صادرة من الجهاز العصبى المركزى ومن عقدتى CC . CA أيضاً (والإفرازات المذكورة كلها هي Neurohormones).



شكل (١١٧) : (أ) قطاع عرضي في حلقة صدرية.
(ب) منظر علوي للوعاء الظهرى في الصرصار.
(ج) قطاع طولى في حشرة لبيان الدورة الدموية.

الحجابان الحاجزان العلوى والسفلى :

جدارهما عضلى ليفى . ويوجد فوق الحجاب الحاجز العلوى فقط أزواج من العضلات على شكل مثلثات على جانبي القلب هى العضلات الجناحية . وقاعدتا كل زوج متقابل من أزواج العضلات الجناحية تتقابل مع بعضها البعض تحت جدار القلب أو أن يكون هذا الاتصال بجدار القلب الجانبي نفسه كما فى رتبة الكوليبولا (ذات الذنب القافر) ويرقات الذباب والقمل الماص ، أما الأطراف المدببة للعضلات الجناحية فهى متصلة بجدار الجسم وغالباً عند الفواصل الموجودة بين الحلقات . ويوجد فى الحجاب الحاجز العلوى والسفلى فتحات يدخل منها الدم إلى الفراغات المختلفة . والعضلات الجناحية تتكون من ألياف عضلية مخططة وألياف مطاطة يختلف عددها من ٤ أزواج فى نحلة العسل إلى ١٢ زوجاً فى الصرصار .

هذا ويوجد الحجاب الحاجز السفلى كاملاً تام النمو في رتب مستقيمة الأجنحة والرعاشات وذباب مايو وغشائية الأجنحة وحرشفية الأجنحة، بينما نجده في باقي الرتب مضمحلاً أو غائباً، ويتحكم في حركته أعصاب تخرج من العقد العصبية الموجودة بمحقات الجسم، ويعمل هذا الحجاب الحاجز السفلى من ٨ — ١٢ ضربة في الدقيقة.

الفتحات الجانبية التي تسمح بدخول الدم : The Incurrent Ostial Valves

الفتحة الجانبية عبارة عن شق رفيع في جدار القلب الجانبى امتدت حافته العلوية والسفلية للداخل وكونتا صماما Incurrent Valve لمنع خروج الدم من الوعاء الظهري لفراغ الجسم عند انقباض القلب، وكل حافة من حافتي كل صمام تسمى شفة Lip، والشفة لها سمك مكون من خلية واحدة ثم تستدق هذه الشفة بعد هذا السمك وتنتهى في الداخل بحيط رفيع (شكل ١١٨ ز). عند إنفراج القلب تفتح الصمامات ويدخل الدم (شكل ١١٨ ز)، وعند اكتمال الإنفراج تقفل الصمامات وتعمل شفتا الصمام زاوية ٩٠° مع جدار القلب (شكل ١١٨ ح)، وعند إنقباض القلب تتبعع جدر الصمامات للخارج حتى تلتصق شفتا كل صمام جيداً فلا يخرج دم للخارج (شكل ١١٨ ط).


الفتحات الجانبية التي تسمح بخروج الدم : The Excurrent Ostial Valves

في كثير من حشرات رتبة مستقيمة الأجنحة توجد بالقلب صمامات أخرى غير الصمامات الموجودة بين غرف القلب وهذه الصمامات الجديدة يمكن أن يخرج منها الدم من داخل القلب إلى خارجه. ففي أنواع الحفار Gryllotalpa يوجد من هذه الصمامات الأخيرة زوجان في الصدر وثمانية أزواج في البطن.

وفي فوق عائلة النطايط ذو القرون الطويلة Tettigonioidea يؤدي كل صمام من هذه الصمامات إلى أنبوبة مقلدة يمكن للدم أن يروح خلال جذرها.

وفي الصرصار المسمى Blaberus يوجد من الصمامات المذكورة زوجان في الصدر وأربعة أزواج في البطن وتؤدي جميعها إلى أوعية دموية.

وفي حشرات رتبة ذات الذنب الشعري توجد من ١ — ٦ فتحات فردية على السطح السفلى لجدار القلب وتؤدي هذه الفتحات الفردية إلى فراغ الجسم.



شكل (١١٨) : أمثلة للصمامات المختلفة في القلب .

(أ) يرقة الذبابة *Tipula* .

(ب) يرقة نوع آخر من الهاموش .

(ج) يرقة هاموش .

(د) حورية ذبابة مايو *Cloeon* .

(هـ) يرقة التاكينا *Thrixion* .

(ز، ط) الصمامات في درجات مختلفة من ضربات القلب .

غرف القلب : The Heart Chambers

فى أغلب الحشرات يتكون القلب من أنبوبة مقسمة إلى حجر أو غرف ، أو تتكون هذه الغرف من إنبعاج جدر الفتحات الجانبية (الصمامات) للداخل . وفى بعض الحشرات توجد الفتحات الجانبية ولكنها لا تعمل كصمامات وفى هذه الحالة تتكون الصمامات داخل غرف القلب من إنشاء جدار الغرفة الداخلى فيوجد عندئذ زوج من هذه الإنشاءات فى كل غرفة فوق الفتحات الطبيعية (شكل ١١٨ أ، د) ويحدث قفل الصمام الداخلى فى هذه الحالة بإنبعاض جدار القلب عند مكان هذه الإنشاءات فيحدث اتصالها فى وسط القلب . وقد يوجد بدلا من هذين الإنشائين فى كل غرفة وسادتان عضليتان (شكل ١١٨ ب) أو وسادتان كل منهما مكونة من خلية واحدة كبيرة مملوءة بالفراغات الهوائية (شكل ١١٨ ج) ويمتدان داخل غرفة القلب .

وعلى العموم ينحصر وجود القلب فى أغلب الحشرات على البطن فقط بينما يوجد الأورطة فى الصدر والرأس . وتختلف عدد الغرف المكونة للقلب باختلاف الحشرات ، ففى مستقيمة الأجنحة يبلغ ١٣ غرفة وفى السمك الفضى ١٠ غرف وفى بعض الخنافس ٧ غرف وفى بعض حشرات رتبة غشائية الأجنحة (تحت رتبة أبكريتا) ٥ غرف وفى بعض الذباب ٣ غرف ، وفى قليل من الحشرات يتكون القلب من غرفة واحدة (كما فى بعض أفراد عائلة السوس من رتبة غمدية الأجنحة) .

الدورة الدموية (شكل ١١٧ ج) : The Circulation of the Blood

يدخل الدم القلب من الفتحات الجانبية عند إنفراج جدار القلب بواسطة إنقباض العضلات الجناحية التى تعمل على خفض الحجاب الحاجز العلوى قليلاً إلى أسفل فيزيد حجم الفراغ العلوى الذى يندفع إليه الدم ومنه إلى القلب ، كما وأن إنخفاض هذا الحجاب الحاجز العلوى يعمل فى نفس الوقت على جذب جدار القلب السفلى معه فيزداد بذلك إنفراج القلب نفسه . وعند إمتلاء أنبوبة القلب بالدم تمر موجة إنقباض لجدار القلب من الخلف إلى الأمام فيندفع الدم إلى الرأس حيث يصب فيها ثم يتجه الدم من الرأس إلى الخلف فى تجاوىف جسم الحشرة الثلاثة المذكورة إذ أن وجود الدم بكميات كبيرة فى الرأس تضطره إلى الرجوع إلى الخلف ، وفى نفس الوقت يسبب خروج الدم من الأورطة فراغاً داخل القلب فيندفع الدم فى نهاية الجسم إلى القلب وبذلك نرى أنه فى نفس الوقت الذى تندفع فيه كمية من الدم داخل أنبوبة القلب نجد أنه توجد كمية أخرى من الدم راجعة إلى الخلف داخل تجاوىف الجسم المختلفة للدخول فى القلب ثانية .

ويعمل الحجاب الحاجز السفلى (الذى يغطي الحبل العصبى) بحركاته الذاتية المستمرة Rhythmic Movements التى تكون دائماً جانبية وللخلف على دفع الدم فى الفراغ العصبى للخلف والجوانب، بينما يعمل الحجاب الحاجز العلوى حركة ذاتية مستمرة أيضاً ولكن حركته دائماً تكون للأمام وللجوانب وبذلك يعمل هذا الحجاب العلوى على دفع الدم فى فراغ القلب العلوى للأمام وللجوانب. وفى بعض الحشرات قد يكون الحجاب الحاجز السفلى مقعراً وإنقباضه يكبر حجم الفراغ العصبى، وفى بعض الحشرات الأخرى يكون محدباً وإنقباضه يسبب طرد الدم من الفراغ العصبى وبالتالى دفعه لأعلى خلال ثقبه إلى الفراغ الحشوى ثم إلى فراغ القلب عن طريق الحجاب الحاجز العلوى. وفى بعض الحشرات لا يوجد هذا الحجاب السفلى كلية.

القلوب المساعدة : Accessory Hearts

تغذى زوائد الجسم المختلفة كالأجنحة والأرجل وقرون الاستشعار بالدم الموجود فى الفراغ الحشوى إذ أن كلا من الحجاب الحاجز العلوى والسفلى لا يصل إلى منطقة الصدر، ويدفع الدم فى هذه الزوائد بواسطة ظلمبات خاصة Pumps تسمى بالقلوب المساعدة.

نبضات القلب : Heart Beats

تتأثر عدد نبضات قلب الحشرات بدرجة الحرارة ونشاط الحشرة وحالتها الفسيولوجية كما تختلف من نوع إلى آخر. فتبلغ عدد نبضات قلب يرقة Lucanus ١٤ نبضة فى الدقيقة الواحدة تحت درجة حراره ١٨°م، وفى حشرة Campodea تبلغ عدد النبضات أكثر من ١٥٠ عند درجة حرارة ٢٠°م، فى الحشرة الواحدة قد يختلف النبض فى الأعمار أو فى الأطوار المختلفة كما يحدث فى دودة الحرير Bombyx mori مثلاً.

الدم : The Blood or Haemolymph

يتكون الدم فى الحشرات من بلازما Plasma وكرات دموية Blood cells or Haemocytes وتتكون البلازما من ٩٠٪ ماء وبجانب الماء تحتوى البلازما على بروتين (البيومين وجلوبولين) وأحماض أمينية (جلوتامين وبرولين وأرجنين وليسين وهستيدين وتيروسين وميثونين) ونتروجين غير أمينى وحامض اليوريك ويوريا وأمونيا و Allantion وحامض الستريك وحامض السكسينيك Succinic Acid وسكر جلوكوز أو فركتوز ومواد مختزلة أخرى. ويوجد فى البلازما كذلك دهن على شكل حبيبات دقيقة جداً، كما

توجد بالبلازما أملاح كالكلوريدات والفوسفات (رتبة مستقيمة الأجنحة) والكاربونات ويوجد الصوديوم (وهو قليل في رتب غمدية وحرشفية وغشائية الأجنحة) والبوتاسيوم (الذى تزيد نسبته في البلازما كثيراً قبل كل إنسلاخ) والكالسيوم والمنجنيز (ونسبته مرتفعة في دم الحشرات) والفوسفور، وتوجد بعض العناصر النادرة في بلازما دم الحشرات مثل النحاس والحديد والزنك والمغنسيوم.

كما اكتشف في دم عذراء حشرة *Platysamia* مواد الكاروتين — أ ونوعى الكلوروفيل أ، ب والريوفلافين والتاراكسانثين *Taraxanthin*. ودرجة تركيز أيون الأيدروجين بالبلازما (pH) غالباً حامضى ضعيف أو قلوئى ضعيف. ويوجد أيضاً بالبلازما خلاف ما سبق مواد أخرى ملونة على شكل حبيبات كالهيموجلوبين (والذى يعتبر أيضاً مخزناً للماء لتعويض ما يفقده الدم من هذا الماء) الذى يعطى الدم اللون الأحمر الفاقع كما في حشرات الهاموش *Fam. Chironomidae* أو حبيبات خضراء اللون تعطى الدم اللون الأخضر (عبارة عن كلوروفيل محلول). ويوجد في دم يرقة الحرير مواد الكاروتين والزانتوفيل والفلافين، كما يحوى دم المن مواداً ألوانها أحمر قرمى تسمى *Aphins*. ويوجد كذلك بالبلازما إنزيمات مثل إنزيمات البروتيز والأميليز والسكريز والليبيز والتيروسينيز والترهاليز والكربوهيدراتات. ويوجد في البلازما سكر الترهالوز والسكروز وبدم نخلة العسل نسبة كبيرة من الجلوكوز والفركتوز، ويوجد في دم الحشرات التى تتحمل التجمد مادة الجليسيرول *Glycerol*.

وقد وجد أن دم بعض الحشرات يتجلط والبعض الآخر لا يتجلط. أما عن درجة أيون الأيدروجين في الدم (pH) فهى في أغلب الحشرات من ٦ — ٧ ولكن في بعض الحشرات (مثل الهاموش) فهى ٦.٢ — ٧.٧، هذا وترتفع الـ pH قليلاً وقت الإنسلاخ.

أما الكرات الدموية التى نشأت من نسيج المينودرم في الجنين فيختلف عددها في الدم باختلاف الحشرات، وعلى العموم فيتراوح هذا العدد من ١٠٠٠ — ١٠٠,٠٠٠ في المليمتر المكعب الواحد، ويميل هذا العدد إلى الزيادة في الأنثى عنه في الذكور، وتحوى يرقات الحشرات كاملة التطور عدداً من الكرات الدموية أكثر مما تحويها حشراتنا الكاملة والعكس صحيح بالنسبة إلى حوريات الحشرات ناقصة التطور. ويزداد عدد كرات الدم في الحشرة إذا ما حقنت بالبكتريا أو دخل جسمها طفيل وكذلك عند وضع البيض.

ويوجد من كرات الدم (شكل ١١٩) الأنواع الآتية :

١ — خلايا الدم الأولية : Prohaemocytes or Proleucocytes

وهى خلايا دم صغيرة الحجم (ذات قطر يتراوح بين ٦ — ١٢ ميكرون) مستديرة الشكل ذات سيتوبلازم غامق غنى بحامض الريبونيوكليليك Ribonucleic acid وتتملأ النواة كل الخلية تقريباً (شكل ١١٩ أ). يوجد هذا النوع من خلايا الدم فى جميع رتب الحشرات ويكثر فى اليرقات الصغيرة من رتبة حرشفية الأجنحة ، وهى ترى دائماً فى حالة انقسام ولذا فهى تعتبر أصل خلايا الدم الأخرى .

٢ — خلايا الدم الانتقالية : Plasmotocytes

وهى الأشكال الإنتقالية التى تنشأ عن خلايا الدم الأولية ، وهنا صغرت النواة عما كانت عليه فى الخلايا الأولية وازدادت كمية السيتوبلازم . وتوجد خلايا الدم الإنتقالية فى أشكال متعددة ، فمنها المستدير والمغزلى والكمثرى عند وجودها حرة فى الدم ومنها المفلطح والمستدق كثيراً عند اتصالها بالأجهزة الداخلية للحشرة (شكل ١١٩ ب) . يكثر هذا النوع من الخلايا فى رتبة حرشفية الأجنحة (حتى أن بعض الحشرىين قسموها إلى ١٠ أنواع مقسمة بدورها إلى ٣٢ شكلاً فى يرقات Prodenia تبعاً لأشكالها) . وتحوى هذه الخلايا سكريات مركبة Mucopolysaccharides ويظهر فيها خيوط مستطيلة كثيرة عند رؤيتها فى الحالة الطبيعية Fresh State أو عند تثبيتها فى مادة الأوزميوم Osmium . وهذا النوع من كرات الدم قادر على إلتهاام الأنسجة القديمة (عند التطور) أو الدخيلة أى أنها Phagocytic .

٣ — خلايا الدم المحببة : Granular Haemocytes

ويبدو أنها أيضاً مشتقة من النوع الثانى (من الخلايا الإنتقالية) ولكنها ذات سيتوبلازم أكثر إمتلاء بالحبيبات الكبيرة الحجم (وهى سكريات مركبة شكل ١١٩ ج) . يوجد هذا النوع من الخلايا فى كثير من حشرات رتبة حرشفية الأجنحة والذباب وغمدية الأجنحة . هذا النوع من خلايا الدم له أيضاً صفة الـ Phagocytosis .

٤ — خلايا الدم التوتية : Oenocytoides

وهى خلايا كبيرة الحجم (٨ — ١٢ ميكرون) بيضاوية أو مستديرة الشكل وذات نواة غامقة ولكنها صغيرة نسبياً والسيتوبلازم خال من الحبيبات الكبيرة الواضحة . يوجد هذا

النوع من خلايا الدم في رتب نصفية الأجنحة وغمدية الأجنحة وحرشفية الأجنحة وذات الجناحين (الذباب). ولا ينشأ هذا النوع من خلايا الدم الأخرى مثل الخلايا الإنتقالية والمحبة بل يعتقد أنها تنشأ من الخلايا البييدية Oenocytes .

٥- يوجد خلاف ماسبق أنواع أخرى من خلايا الدم أهمها :

أ- خلايا الدم الشمعية Wax Cells : والتي توجد في المن والحشرات القشرية والخلية في هذا النوع تكون مملوءة بالدهن .

ب- خلايا الدم الدهنية Adipohaemocytes : حيث تكون الخلية مملوءة بنقط دهنية كما في بعض أنواع البق والذباب وحرشفية الأجنحة، وتبلغ الخلية نحو ١٢ - ٣٥ ميكرون في القطر (شكل ١١٩ هـ) .


ج- خلايا الدم الحوصلية Cystocytes :

وهي خلايا ذات نواة صغيرة محددة غامقة والسيوبلازم باهت اللون هلامي يحوى حبيبات سوداء صغيرة، علماً بأن جميع الأنواع الأخرى من الكرات الدموية نواتها أكبر حجماً وأبهت لونا والسيوبلازم بها أغمق، وربما يكون هذا النوع من كرات الدم نوع متخصص من النوع المحبب (Granular) (شكل ١١٩ ز) .

د- خلايا الدم الكروية Spherule Cells :

وهي خلايا مستديرة أو بيضاوية مملوءة بمحتويات تظهر واضحة عند صبغها بالأصباغ الحمضية، وتوجد في رتبتي حرشفية الأجنحة والذباب (شكل ١١٩ و) .

فائدة الدم أنه ينتقل خلاله الهرمونات وكذلك الغذاء المهضوم الأتى من القناة الهضمية والمواد التالفة التي يراد من الدم توصيلها إلى أعضاء الإخراج لطردها للخارج . ويلعب الدم دوراً في عملية التنفس وكذلك في نقل الضغط من منطقة إلى أخرى في الجسم كالذى يحدث عند فقس الجنين من البيضة أو كالذى يحدث في عملية الإنسلاخ . وفي عملية فرد الأجنحة عند خروج الحشرة الكاملة من العذراء . ويعمل الدم كذلك كمخزن للماء الذى يسحب من الدم ثانية عند الحاجة إليه وذلك بدون حدوث جفاف الأنسجة وخلايا الجسم نفسها كمخزن للغذاء (تخزين سكر الدم في نخلة العسل) .



شكل (١١٩) : أنواع خلايا الدم الموجودة في الحشرات .

الخلايا الجارقلبية : The Pericardial Cells (or Nephrocytes)

تشغل هذه الخلايا مكاناً ثابتاً وهو حول القلب وهي لا تتحرك داخل الجسم مثل كرات الدم . وتوجد هذه الخلايا في فراغ التجويف العلوى مستقرة على الحجاب الحاجز العلوى أو على العضلات الجناحية ، وقد توجد داخل القلب نفسه عند وجودها بكثرة . وقد توجد بالخلية الواحدة نواة واحدة أو أكثر (لغاية ٦ نويات) . وتحتوى الخلية كذلك على فراغات Vacuoles وحببيات صغيرة 'Granules' ولونها أحمر أو أخضر أو بنى أو أصفر ، في رتبة حرشفية الأجنحة يوجد تخطيط حول سطحها الخارجى .

تقوم هذه الخلايا بوظيفة جمع وتخزين المواد الغريبة الموجودة في الدم داخلها أى أنها تقوم بوظيفة إخراجية كما أن لها وظائف أخرى .

الخلايا النبيذية : The Oenocytes

يوجد في الحشرات مجاميع من الخلايا بجوار كل ثغر تنفسى هي الخلايا النبيذية وذلك في الفراغ الحشوى من الجسم .

وقد توجد هذه المجاميع من الخلايا بين خلايا الهيودرمس في جدار الجسم وبين الطبقة العضلية التى تحتها ولكن بجوار الثغور النفسية أيضاً ، أو قد توجد الخلايا منفردة (وليست

في مجاميع) ساحة في جميع فراغات الجسم من الداخل أو بين خلايا هيودرمس جدار الجسم وبين الغشاء القاعدي Basement Membrane الذى يوجد تحتها أو بين خلايا النسيج الدهنى في الفراغ الحشوى (شكل ١٢٠ ج) كما هذا وقد توجد الخلايا النبيذية في مجاميع طويلة Ribbons تمتد بين القصبات الهوائية داخل الجسم .

والخلية النبيذية كبيرة الحجم إذ يبلغ قطرها من ١٥ — ٣٠ ميكرون وبها نواة عادية مستديرة وليست كبيرة إذا ما قورنت بحجم الخلية والسيترولازم سميك وكثيف الصبغ ويوجد في السيترولازم فراغات صغيرة وحبيبات لونها أصفر أو عديمة اللون وقد تشاهد بالخلية بللورات طويلة .

وللخلايا النبيذية وظيفة إخراجية إذ أنها تنظف الدم من المواد الغريبة ، كما وأنها تفرز هرمونا يساعد في حدوث الإنسلاخ كما في دودة الحرير Bombyx mori لدرجة القول بأن هذا الهرمون ربما يكون هو بنفسه هرمون الأكدايزون الذى تفرزه غدد الصدر الأمامى Prothoracic glands (Locke ، ١٩٦٩ ، Romer ، ١٩٧١) ، كما قد تفرز تلك الخلايا النبيذية مادة البروتين الدهنى Lipoprotein التى تكون إحدى محتويات الكيوتيكل في الحشرات كما في حشرة الرودنيس Rhodnius ، كما تفرز أيضاً المادة الشمعية التى تغطى جدار جسم الصرصار وبعض الفراشات ، ويقال إنها تفرز في الحشرات البالغة مواداً لها علاقة بنضج الأجهزة التناسلية كما في حشرات الهاموش ، وفي حشرات أخرى تفرز هذه الخلايا النبيذية المواد البروتينية الدهنية Lipoproteins التى تدخل في تركيب قشرة البيضة كما في حشرة الرودنيس .

الجسم الدهنى : The Fat-body

يوجد الدهن في الحشرات في طبقتين :

١ — **الطبقة الأولى :** وهى الموجودة بين خلايا هيودرمس جدار جسم الحشرة وبين العضلات الموجودة أسفلها والمبطنة لجدار الجسم وهذه الطبقة كميتها بسيطة وخلاياها توجد فردية أو في مجاميع كل مجموعة مكونة من عدد قليل من الخلايا .

الطبقة الثانية : وهى الموجودة في فراغات الجسم الثلاثة وحول الأحشاء الداخلية المختلفة ، وهذه الطبقة موجودة بكميات كبيرة وخلاياها تكون في كتل أو مجموعات كبيرة وكل كتلة على هيئة فص سميك غير منتظم الشكل أو رقيق كالورقة أو على هيئة شريط طويل أو غير ذلك ، والكتلة أو المجموعة من الخلايا يغلفها من الخارج غشاء من نسيج ضام (شكل ١٢٠ أ) . والخلية الدهنية عامة (المسماة Trophocyte) شكلها غير منظم وتحوى نواة

واحدة أو أكثر مستديرة أو بيضاوية أو متفرعة، وتحتوى كذلك أجسام جولجى وريبوسومات وميتوكوندريا، وتكبر الخلية الدهنية أثناء النمو ما بعد الجنين نتيجة التغذية فيمتلىء السيتوبلازم بالدهن الموجود على حالة نقط زيتية Oil-like droplets ويوجد بين هذه الفراغات الزيتية حبيبات بروتينية صغيرة وحبيبات جليكوجين (يتركز الجليكوجين في الدهن الموجود بالبطن وفي دبوس التوازن في رتبة الذباب وفي عضلات الطيران وفي خلايا القنوصة والمعدة)، وكلها مخزنة أثناء نمو الحشرة لاستهلاكها عند الإنسلاخ أو عند التطور أو لكى تستهلكها الحشرات الكاملة فى إنتاج البيض أو عند البيات الشتوى. ويقال أن الجسم الدهنى يقوم فى بعض الحشرات بهضم وابتلاع الأنسجة المندثرة أثناء عملية التطور أى أنها تتشابه فى عملها هذا عمل كرات الدم التى تلتهم الأجهزة المختلفة فى اليرقات والحوريات لتحل محلها أجهزة الحشرات الكاملة أى أنها Phagocytic. بعض الخلايا الدهنية تحوى بكتريا وتسمى عندئذ Mycetomes (شكل ١٢٠ ب) وبعضها يحوى حبيبات قد تؤثر فى لون الحشرة وتسمى الخلية عندئذ Chromatocyte. ويفرز الجسم الدهنى فى بعض الحشرات هرمونا يساعد على نضج المبايض (Ivanov وزملاؤه، ١٩٣٥).

وقد لا يوجد جسم دهنى بالحشرة بالمرة بل توجد الخلايا الدهنية عائمة فى الدم كما فى الذباب الأبيض. ولون الجسم الدهنى إما أن يكون أبيض لامع كما فى يرقات Calliphora أو أصفر غامق كما فى الجرد Schistocerca أو أخضر فاتح.


ويجدر بالذكر الإشارة هنا إلى الكربوايدرات الموجودة بالحشرة بخلاف الجليكوجين السابق ذكره وهى:

(أ) الجلوكوز: ويوجد فى دم الحشرات ولو أن الفركتوز يوجد على وجه الخصوص فى نحل العسل البالغ وفى يرقات نغف معدة الخيل. هذا ويوجد الجلوكوز والسكريات الأحادية فى الحشرات بمعدل ٣٠ ملجم/ ١٠٠ ملم^٣ من الدم.

(ب) التريالوز: الثانى ويوجد فى دم الحشرات بمعدل ١٥٠٠ ملجم/ ١٠٠ ملم^٣ من الدم فى الجراد الصحراوى وهو هام للطيران.

(ج) الجلوكوسيدات Glucosides: وتوجد فى الجسم الدهنى (إذ لم تشاهد فى الدم) أو أنابيب مليجى أو عضلات الطيران، ويوجد نسبة طليقه منها فى القناة الهضمية.

أحياء دقيقة حيث أن الأخيرة هي المسئولة عن تكوين هذا الحمض.



شکل (۱۲۰) : (أ) جزء من جسم دھنی .

(ب) جزء من جسم دھنی یحوی خلايا بها بللورات یوریا وأخرى بها بكتريا .

(ج) الخلايا النبذية في الثملة (منتشرة بين الخلايا الدهنية).

(د) جزء من مجموعة من الخلايا البنيذية في خنفساء من عائلة

. Curculionidae السوس

التركيب الكيماوى لدهن الحشرات :

يكون الدهن نحو ٢٥٪ من الوزن الكلى لعذراء دودة الحرير ، ٤٩ — ٦٩٪ من الوزن الجاف للذكر الجراد ، ويتكون الدهن من جلسريدات متعادلة Glycerides وأحماض دهنية حرة تعادل ٧٥٪ من الدهن . وكثير من دهن الحشرات تحوى ٦٠ — ٨٥٪ من الأحماض الدهنية الغير مشبعة خاصة أحماض بالمولىك Palmoleic ، أوليك Oleic ، ليولىك Limoleic ، لينولىك Linolenic ، بينما تمثل أحماض البالمىك Palmitic ، استريك Stearic أهم الأحماض الدهنية المشبعة (١٥ — ٣٥٪) . ويوجد فى المن أحماض دهنية ذات السلسلة القصيرة مثل بوتىريك Butyric ، كابريك Caprylic .

هذا ولقد وجد أن دهن حشرة Taeniopoda (رتبة مستقيمة الأجنحة) الموجودة فى المكسيك سام للفقران إذ أنه يحوى مركبات كبريتية . ويتكون الدهن فى الحشرات من غذائها المكون من البروتينات والأحماض الأصلية والكربوايدرات والاسيتات . ويتركز الدهن فى الحشرات فى الخلايا الدهنية والخلايا النبيذية .

حمض اليورىك والجسم الدهنى :

شوهدت حبيبات حمض اليورىك فى بعض خلايا الجسم الدهنى للصرصار وليوقات وعذارى النمل ، ويتكون حمض اليورىك من منتجات تحلل الأحماض الأمينية والبروتينات الموجودة فى الجسم الدهنى ، وعلى هذا فإن الجسم الدهنى هو مكان تكوين حمض اليورىك بإستخدام النيتروجين الموجود على حالة جليسين Glycine ، حمض الاسبارتيك Aspartic acid والنيتروجين الأميدى للجلوتامين Glutamine . هذا ويحوى الجسم الدهنى إنزيمات الأدينيز Adenase والجوانيز Guanase والزانتين أوكسيديز Xanthine oxidase والتي تمكن الجسم الدهنى من تكوين حمض يورىك من بيورينات Purines أقل أكسدة .

هذا ولو أن حمض اليورىك هو الناتج الأساسى والنهائى للتمثيل الغذائى للنتروجين فى معظم الحشرات ، فإن بعض المركبات مثل هيبوكسانتين Hypoxanthine ، زانتين Xanthine قد وجدت فى إفرازات بعض الحشرات ، كما وجدت مادة الالانتوين Allantoin فى بعض الحشرات المائية فى رتبة نصفية الأجنحة ، وحمض الالانتويك Allantoic acid فى بعض حشرات رتبة حرشفية الأجنحة ، واليوربا فى بقعة الردونيس Rhodnius والأمونيا فى يوقات بعض الذباب ، وكل المواد المذكورة ما هى إلا منتجات وسطية من منتجات التمثيل الغذائى للبيورينات Purines .

مواد التريدينز Pteridines والجسم الدهنى :

توجد مركبات تريدينية فى الحشرات على هيئة حبيبات حمراء أو بيضاء أو صفراء موجودة فى حراشيف حشرات رتبة حرشفية الأجنحة أو فى خلايا هيودرمس حشرات رتبة غشائية الأجنحة وخاصة فى العيون المركبة، ويعتقد أن الجسم الدهنى هو موقع تكوين مثل هذه المواد.

أعضاء إحداث الضوء : Light Producing Organs


توجد خاصة الإضاءة فى كثير من الحشرات مثل الكولبولا وبعض يرقات تحت رتبة نيماتوسيرا (رتبة الذباب) واليرقات والحشرات الكاملة لبعض الخنافس (خاصة عائلة فرقع لوز Fam. Elateridae). وقد تشاهد إضاءة مؤقتة فى بعض الحشرات كما يحدث فى يرقات رتبة حرشفية الأجنحة نتيجة احتوائها على بكتريا مضيئة، أما الإضاءة المستمرة والتي نهمنا فى هذا الموضوع فهى نتيجة تحول غذائى Metabolism داخل أجسام الحشرات المولدة لها.

وقد تعم الإضاءة جميع مناطق الجسم فيها عدا الأرجل وقرن الاستشعار كما فى بعض أنواع الكولبولا، والأجسام الدهنية عندئذ هى مصدر الإضاءة. وفى بعض يرقات الذباب (عائلة Mycetophilidae) تعطى طبقتا الدهن السطحية والحشوية ضوءاً مستمراً باهتاً.

وفى حشرة Ceropterus يكون فيها الطور اليرقى وطور العذراء مضيئان ولكن ينعدم الضوء فى طور الحشرة الكاملة بعد انتهاء استهلاك الأجسام الدهنية بإنهاء طور العذراء.

وفى الحشرات التى توجد فيها أعضاء خاصة بإحداث الضوء، يختلف تركيب ومكان هذه الأعضاء من حشرة إلى أخرى. ففى بعض الخنافس يتكون عضو إحداث الضوء من خلايا كبيرة متفرقة ومبعثرة داخل الحشرة ولا يتصل بها قصبات هوائية وربما نشأت هذه الخلايا من الخلايا النبذية Oenocytes.

وفى خنافس أخرى قد يتكون عضو الضوء من مجاميع مستديرة من الخلايا تغذيها قصبات هوائية خاصة. وقد يكون مكان أعضاء إحداث الضوء على استرناات الحلقات البطنية الأخيرة، وفى خنافس فرقع لوز يوجد عضو إحداث الضوء على الجانبين الخلفيين لترجة الحلقة الصدرية الأولى وكذلك فى وسط استرنة الحلقة البطنية الأمامية.



شكل (١٢١) : عضو إحداث الضوء.

ويتكون عضو إحداث الضوء هستولوجيا (شكل ١٢١) من منطقة من الخلايا العاكسة للضوء Reflector cells والمملوء سيتوبلازمها بحبيبات يوريا. وتوجد بين هذه المنطقة العاكسة وهيودرس جدار الجسم منطقة أخرى من الخلايا الغنية بالأعصاب وبالقصبات والقصبيات الهوائية، وكيوتيكل جدار الجسم الذى يعلو هذه الطبقة الأخيرة يكون شفافاً وخالياً من الحبيبات. هذا وتنشأ خلايا عضو الضوء المذكور من الجسم الدهنى.

وتوجد أعضاء إحداث ضوء غير عادية فى بعض يرقات عائلة Mycetophilidae (رتبة الذباب) حيث تتحول الأطراف النهائية لأنابيب مليجي إلى أعضاء إحداث الضوء، وبما أن هذه اليرقات تعيش داخل خيوط عنكبوتية تنسجها حولها فأعضاء الضوء تعمل إذن على إغذاب الحشرات الأخرى إلى الخيوط العنكبوتية حيث تفترسها اليرقات المذكورة.

الحبيبات الأخرى الموجودة فى الجسم الدهنى :

(أ) الكاروتين Carotine : وهى المسئولة عن اللون الأصفر فى يرقات بعض الزنابير ويرقات رتبة حرشفية الأجنحة والجراد، وهو يؤخذ من المواد التى تتغذى عليها الحشرات ويخزن فى الجسم الدهنى.

(ب) الهيموجلوبين : ويوجد فى دم القليل من الحشرات كيرقات الهاموش (Fam. Chironomidae) وفى الغدد الزائدة للجهاز التناسلى لحشرة Macrocrixa وفى الجسم الدهنى ليرقات نغف معدة الخيل ولكن أثناء وجود تلك اليرقات بمعدة الخيل.

(ج) الانثوسيانين Anthocyanin :

يخوى الجسم الدهنى ليرقات الحنفساء Cionus التى تتغذى على الأزهار حبيبات قمرية اللون تشابه الانثوسيانين الموجود فى نفس الأزهار.

الباب الحادى عشر

الجهاز التناسلى

The Reproductive System

سنتناول بالشرح هنا الجهاز التناسلى الداخلى فقط دون ذكر أجهزة التناسل الخارجية التى تكون فى الأنثى آلة وضع البيض وفى الذكر آلة السفاد .

أولاً- الجهاز التناسلى فى الأنثى

يتكون الجهاز التناسلى فى الأنثى من مبيضين Ovaries ، ويخرج من كل مبيض قناة مبيض جانبية Lateral oviduct تفتح بفتحة مستقلة فى نهاية الاسترته السابعة البطنية فى الحشرات الأولية مثل ذبابة مايو ، ولكن فى الحشرات الراقية تصب قناتا المبيضين فى قناة مبيض مشتركة Median oviduct . وهذه تؤدى إلى مهبل Vagina (شكل ١٢٢ أ) الذى يفتح للخارج فى الفتحة التناسلية Oviporus الموجودة فى نهاية الاسترته التاسعة البطنية (والتي تكون أرضية الجيب التناسلى المنطوى فوق الاسترته الثامنة البطنية كما فى الصرصار) .

ويفتح فى السطح العلوى لقناة المبيض المشتركة أو المهبل قابلة منوية Sperma theca أو Receptaculum seminis لتخزين الحيوانات المنوية أثناء التلقيح ، ويوجد بطرف القابلة المنوية غدة تفرز مواداً مغذية وأخرى جاذبة للحيوانات المنوية أثناء وجودها بالقابلة لفترة قد تصل إلى عدة أشهر حتى يحين خروجها لتلقيح البيض أثناء نزوله للخارج ، كما يفتح فى السطح العلوى للمهبل أيضاً زوج أو أكثر من الغدد الزائدة Accessory glands فائدتها إفراز كيس يحيط بالبيض أو إفراز المادة التى تلتصق البيض بعضه ببعض أو تلتصقه بالسطح الموضوع عليه . هذا وليكن من المعروف أن الغدد الحمضية والغدد القلوية فى شغالة نخل العسل ما هى إلا غدد زائدة (قد تفتح القابلة المنوية والعدد الزائدة بفتحات مستقلة فى الجيب التناسلى كما فى الصرصار)


وفي رتبة حرشفية الأجنحة (شكل ١٢٣ د) توجد فتحتان من الفتحات التناسلية، الفتحة الأمامية وهي فتحة البورسا أو فتحة التلقيح Vulva وتفتح في نهاية الاسترنة البطنية الثامنة وتؤدي هذه الفتحة إلى كيس مقفل يسمى Bursa copulatrix (والتي تعتبر نمو خارجي من قناة المبيض المشتركة)، وتصل البورسا بقناة المبيض المشتركة قناة رفيعة تسمى بالقناة المنوية Seminal duct. أما الفتحة التناسلية الثانية Oviporus فتقع في النهاية الخلفية للاسترنة البطنية التاسعة وهي الفتحة التناسلية الحقيقية التي يخرج منها البيض عند وضعه إذ أنها نهاية المهبل، وعند مرور البيض من قناة المبيض المشتركة تلتقي كل بيضة بحيوان منوي من الحيوانات المخزنة في القابلة المنوية. ويذكر Riddiford وزملاؤه (١٩٧٣) أن البورسا تفرز في الأنثى الملقحة (أى لا بد من وجود حيوانات الذكر المنوية بداخلها) مواداً تزيد من عدد البيض الذي تضعه الحشرة.

المبيض : The Ovary


يتكون مبيض الحشرات من قنوات أو فروع مبيض Ovarioles أو Egg-tubes وكلها تفتح في قناة المبيض الجانبية التي تتبعها. وعدد فروع أى مبيض تبلغ حوالى ٤ — ٨ ولكنها قد تبلغ حوالى ٢٠٠ في رتبة غشائية الأجنحة أو أكثر من ذلك في ملكات النمل الأبيض، وفي بعض أنواع الذباب التي تلد أحياء قد يتكون المبيض من فرع واحد فقط.

ويتكون فرع المبيض النموذجي (شكل ١٢٤) من خيط طرفي Terminal Filament يليه منطقة النمو والتكوين Germarium ثم منطقة البيض Vitellarium. وجميع الخيوط الطرفية لفروع المبيض الواحد تتحد مع بعضها البعض مكونة خيطاً رابطاً واحداً Suspensory Filament يتحد مع مثيله في المبيض الآخر ويكونان سوياً خيطاً مشتركاً يتركز على أحد الأجهزة الداخلية. ومنطقة النمو والتكوين هي نهاية فرع المبيض الطرفية وتحوى خلايا في دور التكوين Oogonia أو Germ cells (والتي سيتكون منها فيما بعد البيض Oocytes) والخلايا المغذية Trophocytes أو Nurse cells وكذلك خلايا بينية غير تناسلية Interstitial cells. أما عن منطقة البيض Vitellarium فيوجد بها البيض في أدوار مختلفة من النمو، فالبيضة الموجودة عند قاعدة فرع المبيض هي أكبر البيض عمراً وهي التي ستخرج للخارج قبل غيرها. ونظراً لوجود البيض خلف بعضه البعض في فرع المبيض فلقد أصبح كل فرع مبيض مقسماً إلى حجر متعاقبة

Follicles أو Egg-chambers يتكون جدارها من خلايا تسمى Follicular cells .
ويفتح كل فرع مبيض في أنبوبة قصيرة تسمى حامل فرع المبيض Ovariole stalk أو
Calyx تفتح في قناة المبيض الجانبية، كما يغلف فرع المبيض من الخارج ينسيج ضام.




- شكل (١٢٢) : (أ) الجهاز التناسلي في أنثى الصرصار الأمريكي .
(ب) الجهاز التناسلي في أنثى الجراد الصحراوي .
(ج) الجهاز التناسلي في ذكر الجراد الصحراوي .




شكل (١٢٣) :

- (أ) الجهاز التناسلي في ذكر خنفساء.
- (ب) قطاع طولى في خصيته.
- (ج) الجهاز التناسلي في ذكر فراشة.
- (د) الجهاز التناسلي في أنثى فراشة.




شكل (١٢٤) : خطوات تطور ونمو البويضة داخل فرع المبيض .


(عن د . محمد صالح الخليفة ، ١٩٨١)




Prefollicular cell خلية فوليكول أولية
Nucleus نواة
Oocyte بويضة



Mitochondrion ميتوكوندريا
Nucleus نواة
Follicle cell خلية الفوليكول
Lipoid دهنة
Oocyte periphery محيط البويضة



Basement membrane غشاء وقاعدى
Ovaride sheath غمد فوليكول
Endoplasmic reticulum سبيل شبكة داخلية
Ribosomes ريبوسومات



Protein بروتين
Pinocytosis
Golgi element جهاز جولجى

شكل (١٢٥) : التطورات التي تحدث في خلية الفوليكول عند تحول البويضة Oocyte إلى بيضة Egg. (عن د. محمد صالح الخليفة ، ١٩٨١)

ويوجد من المبايض ثلاثة أنواع حسب تركيب فرع المبيض هي :

١ - النوع الأول : The panoistic type

ولا يوجد به خلايا مغذية بالمرّة (شكل ٢٦ أ) ويتغذى البيض في هذا النوع من الدم المحيط به عن طريق خلايا الفوليكل Follicular cells التي تأخذ المواد المغذية الموجودة بالدم وتعطيها للبيض . يوجد هذا النوع في حشرات عديمة الأجنحة Apterygota وفي رتبة مستقيمة الأجنحة وبعض الرتب الأخرى التابعة لقسم الحشرات ناقصة التطور Exopterygota .

٢ - النوع الثاني : The polytrophic type

وترى به غرف المبيض متبادلة مع غرف تحتوى على الخلايا المغذية (شكل ١٢٦ ب) ويوجد هذا النوع في أكثر الحشرات كاملة التطور Endopterygota . ويلاحظ أن حجم غرفة الخلايا المغذية جهة قاعدة فرع المبيض أصغر منها جهة الطرف لأن المبيض عند القاعدة أكبر منه جهة الطرف ويستنفذ خلايا مغذية أكثر مما في الطرف السائب لفرع المبيض .

٣ - النوع الثالث : The acrotrophic type

وفيه توجد الخلايا المغذية في منطقة النمو بطرف فرع المبيض السائب ولكن تتصل هذه الخلايا المغذية بالبيض النامي بواسطة خيوط بروتو بلازمية Trophic cords لتوصل الغذاء إلى هذا البيض (شكل ١٢٦ ج) ويوجد هذا النوع في رتبة نصفية الأجنحة ورتبة متشابهة الأجنحة وبعض حشرات رتبة غمدية الأجنحة .

وليكن من المعلوم أنه في النوعين الثاني والثالث تحصل الخلايا المغذية على المواد المغذية التي تحتاج إليها من الدم وتنقله إلى البيض الذى يحولها بدوره إلى مح Yolk (ولو أنه في قليل من الأحيان قد يتكون المح من سيتوبلازم البويضة النامية نفسها) . والبويضة الناضجة تماماً والتي توجد في الغرفة السفلى من فرع المبيض يتكون لها قشرة Chorion تفرزها خلايا الفوليكل المحيطة بالغرفة المذكورة وأسفل القشرة يتكون الغشاء الجنيني Vitelline membrane والذي ينشأ من سطح البويضة نفسها . ولا تتكون القشرة في المنطقة الوسطى العلوية من البويضة حيث يتكون النقيع Micropyle الذى تمر خلاله الحيوانات

المنوية لتلقيح البيضة . وبعد تكوين القشرة والغشاء الجنيني مباشرة تمر البيضة لأسفل إلى قناة المبيض الجانبية فقناة المبيض المشتركة حيث تخصب بحيوان منوى يأتي لها من القابلة المنوية أثناء مرورها للخارج ثم تذهب البيضة إلى المهبل فالإخراج

وفي الحشرات التي تحيط فيها الحشرة البيض بكيس Ootheca وتحتفظ الأنثى بهذا الكيس داخلها بعض الوقت نجد أنه في مثل هذه الحشرات لا ينضج البيض مطلقاً أثناء وجود هذا الكيس داخل الأنثى وذلك بفضل إفراز هرمون من النهاية السفلية لفرع المبيض أى في مكان وجود الـ Corpus luteum .

ثانياً - الجهاز التناسلي في الذكر

يتكون الجهاز التناسلي في الذكر (شكل ١٢٣، ١٢٧) من زوج من الخصى (Testes ومفردها Testis) ويخرج من كل خصية وعاء ناقل Vas deferens (وجمعها Vasa deferentia). ويفتح الوعاءان الناقلان في القناة القاذفة Ejaculatory duct التي تفتح للخارج في الفتحة التناسلية الموجودة على نهاية الاسترنة التاسعة البطنية وفوق صفيحة القضيب Penis. وتتسع نهاية كل وعاء ناقل قبل أن يفتح في القناة القاذفة مكونة بذلك خزاناً يسمى بالحوصلة المنوية Vesicula seminalis (وجمعها Vesiculae seminales). ويفتح في القناة القاذفة أيضاً غدد زائدة Accessory glands فائدتها إفراز السائل الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية أو إفراز جدار الكيس الذي يحيط بمجموعة من الاسبرومات كإنبيجاجات خارجية تشبه الأنابيب القصيرة المقفلة مشابهة بذلك الغدد الزائدة المحيطة بها والموجودة على الجزء المنتفخ الموجود أعلى القناة القاذفة والمسمى عرفياً في الصرصار «بعش الغراب» (شكل ١٢٧).

الخصية : The testis

تتكون كل خصية من أنابيب صغيرة Follicles يختلف عددها باختلاف نوع الحشرة. وتفتح كل أنبوبة من هذه الأنابيب بممر ضيق قصير جداً يسمى Vas efferens في الوعاء الناقل (شكل ١٢٨ ب) ولو أن هذا الممر يكون دائماً مقفولاً نظراً لوجود غشاء متين من النسيج الضام الذي قد تتخلله بعض الألياف العضلية. ويتكون جدار كل أنبوبة من أنابيب الخصية من خلايا طلائية Epithelial cells ومن هذه الخلايا الطلائية تنشأ الخلايا التناسلية التي سيتكون منها في النهاية الحيوانات المنوية Spermatozoa

(ومفردها Spermatozoon). كما تتكون محتويات كل أنبوبة من مناطق Zones متعاقبة من طرفها المقفل إلى أن تفتح في الوعاء الناقل كما يلي (شكل ١٢٨ ب):

١ — منطقة التكاثر : Germarium أو Zone of spermatogonia

وهي المنطقة الطرفية وتحوى خلايا تناسلية حديثة التكوين مختلطة مع خلايا جسمية Somatic cells . وفي النهاية السفلية للمنطقة المذكورة ترى كل خلية من خلايا التكاثر محاطة بمحوصلة (Cyst) . وبإنقسام الخلية الواحدة (إنقسام غير إختزالي) من خلايا منطقة التكاثر هذه (والمسماه إسبرماتوجونيا) إنقسامات متتالية يتكون منها حوالى ٦٤ — ٢٥٦ خلية من خلايا المنطقة التالية والمسماة بمنطقة الاسبرماتوسيتات Spermatocytes .

٢ — منطقة الإسبرماتوسيتات (أو منطقة النضج) : Zone of maturation (Spermatocytes)

وهي المنطقة التى تلى المنطقة السابقة وتقوم خلاياها بإنقسامات إختزالية وعلى ذلك فيصبح عدد كروموسوماتها نصف عددها فى المنطقة السابقة وكل خلية اسبرماتوسايت تتكون منها ٤ خلايا اسبرماتيدات Spermatides وهي خلايا المنطقة التالية :

٣ — منطقة الاسبرماتيدات (أو منطقة التحول) : Zone of transformation (Spermatids)

وفيهما لازالت كل اسبرماتيد محاطة بكبسولة أو حوصلة Cyst وداخل هذه الحوصلة تتحول الاسبرماتيد إلى عدد من الحيوانات المنوية Spermatozoa التى تخترق جدر حوصلاتها للتجمع داخل فراغات هذه الحوصلات . وفى أول الأمر تكون الحيوانات المنوية ملتصقة ببعضها البعض مكونة حزماً منوية ولكنها ما تلبث أن تنفصل ويصبح كل حيوان منوى حراً بنفسه .

٤ — منطقة الحيوانات المنوية (الاسبرماتوزوا) : Zone of spermatozoa

وهي المنطقة التى تكون فيها الحيوانات المنوية حرة ومستعدة للخروج إلى الوعاء الناقل . وفى ذبابة مايو يفتح كل وعاء ناقل بفتحة مستقلة إلى الخارج كما فى حالة الأنثى وفى هذه الحالة يوجد خارج كل فتحة تناسلية على كل جانب من جانبي الجسم قضيب مستقل Penis ، ولكن فى أغلب الحشرات نشأت قناة إكتودرمية واحدة هي القناة القاذفة

التي يصب فيها الوعاءان الناقلان . والغدد الزائدة في ذكور الحشرات بعضها قد ينشأ في الجنين من الميزودرم والبعض الآخر قد ينشأ من الاكتودرم والنوع الأخير يصب في السطح العلوى للقناة القاذفة ويطن من الداخل بالشيتين Intima كأى نسيج داخل آخر اکتودرمى الأصل .

ثالثاً — الخلايا التناسلية The sex cells

١ — البيضة The egg

(أ) شكل البيضة (شكل ١٢٩)

قد تكون البيضة بيضاوية وملتوية قليلاً كما في رتبة مستقيمة الأجنحة وكثير من أنواع الذباب وحشرات رتبة غشائية الأجنحة (تحت رتبة ابركتا) أو تكون مستدير أو اسطوانية قليلاً ومفلطحة عند أحد الأطراف كما في رتبة حرشفية الأجنحة . وفي كثير من الحشرات الطفيلية التابعة لرتبة غشائية الأجنحة وشبكية الأجنحة والذباب الأبيض (رتبة متشابهة الأجنحة) تحمل البيضة على قلم Pedicel طويل رفيع . ويوجد لبيضة بعض الحشرات غطاء في الجهة الأمامية يسمى قنسوة Operculum يمكن رفعه أثناء خروج الحورية من البيضة كما في رتب نصفية الأجنحة والقمل القارض والقمل الماص .

(ب) تركيب البيضة (شكل ١٢٦ د)

ويوجد داخل الغشاء الجنيني سيتوبلازم البيضة الذى يحوى المح Yolk والنواة Nucleus . والمح هو المادة المسئولة عن إمداد الجنين النامي بالغذاء إذ أنه يحوى كربوايدراتات (خاصة الجليكوجين) وبروتين ودهون (دهن عادى وأحماض دهنية وليستين Lecithin وكوليسترول Cholesterol) . ويتكون المح بدوره من طبقتين إحدهما خارجية رقيقة متجانسة تسمى بيريلازم Periplam والأخرى داخلية شبكية الشكل تسمى ديتوبلازم Deutoplasm . ويحيط بالنواة طبقة متجانسة من السيتوبلازم النوى . وينشأ المح كما سبق الذكر في الغالب في الدم المحيط بفروع المبيض ويخترق المح خلايا الفوليكل ليدخل البويضات النامية ، ويلعب الجسم الدهنى هنا الدور الأساسى في تكوين بروتينات الدم التى تكون المح .

(ج) قشرة البيضة (شكل ١٣٠ أ) :

يوجد على قشرة البيضة من الخارج في أغلب الحشرات تضاريز مميزة على هيئة خطوط طولية متوازية أو حفر سداسية كما في رتبة حرشفية الأجنحة أو قد تحمل قشرة البيضة زوائد

مختلفة الأشكال كما في رتب الذباب ونصفية الأجنحة وذلك لمساعدة البيضة في التعلق بشعر أو سطح العائل وكالعوامات الجانبية في بيض بعوض الأنوفيليس التي تساعد على الطفو فوق سطح الماء ، وعلى العموم فالبيض الذي يوضع في أماكن معرضة تكون قشرته مجمعة من الخارج .


وقد تكون قشرة البيضة رقيقة جداً غشائية ومطاطة كما في بيض الحشرات المتطفلة التابعة لرتبة غشائية الأجنحة أو تكون القشرة غائبة كلية كما في بيض بعض الحشرات واصمة الاحياء ، ولكن العادة في أغلب الحشرات أن تكون القشرة عادة من طبقتين رئيسيتين هما :

١ — القشرة الخارجية **Exochorion** : وتتكون بدورها من طبقتين كلاهما مكون من مادة الكوريونين Chorionin التي تماثل مادة الكيوتيكيولين الموجودة في ايبكيوتيكل جدار جسم الحشرة .


٢ — القشرة الداخلية **Endochorion** : وتتكون من خمسة طبقات وتشابه في تركيبها أيضاً طبقة الايبكيوتيكل في الحشرات لاحتوائها على نسبة عالية من عديدات الفينولات Polyphenols .

وقد يغلف قشرة البيضة من الخارج في بعض الحشرات طبقة رقيقة اسمنتية Cement layer تفرزها الغدد الزائدة في الأنثى ، وتساعد هذه الطبقة الأسمنتية على لصق البيض بالسطوح التي يوضع عليها أو على تجميعه مع بعضه البعض في كبسولة Capsule كما في حشرة فرسة النبی أو في كيس Ootheca كما في الصرصار . وفي عائلة الحشرات العصوية Phasmidae تقوى قشرة البيضة باحتوائها على الجير .

وفائدة أغشية البيضة هو حمايتها من فقد الماء بعملية التبخير وخاصة في الأماكن الجافة ، إذ أنه وجد أن قشرة الحشرة المائية رودنيوس Rhodnius (رتبة نصفية الأجنحة) منفذة للماء . وخاصية عدم نفاذية قشرة بيضة الحشرات للماء قد يكون سببه وجود طبقة شمعية Wax Layer رقيقة جداً تبلغ في السمك حوالي ثلث ميكرون وتفرزها البيضة Oocyte نفسها قبل وضعها وتوجد هذه الطبقة الشمعية بين الغشاء الجنيني كما في حشرة Lucilia وتقابل هذه الطبقة الشمعية في البيضة مثيلتها في ايبكيوتيكل جدار جسم الحشرة . وفي بيض بعوض الكيولكس توجد طبقة زيتية Oily layer بين القشرة الخارجية والقشرة الداخلية .



شكل (١٢٨) : (أ) الحيوان المنوي في الحشرات.
 (ب) قطاع طول في فص من فصوص الخصية في الحشرات لتوضيح مناطق تكوين الحيوانات المنوية المختلفة.



شكل (١٢٩) : بعض الأشكال لبيض الحشرات .

ومع هذا لا يمكن لقشرة أى بيضة أن تكون غير منفذة تماما للماء إذ أنه يشاهد أنه إذا حفظت بيضة أى حشرة تحت ظروف شديدة الجفاف فانها لا تنفقس وهذا راجع إلى جفاف الجنين أو راجع إلى أن القشرة تصبح شديدة الصلابة بحيث يصعب كسرها عند فقس الجنين .

ويتخلل قشرة البيضة فتحة أو أكثر من الفتحات التى تسمى بالنقير Micropyle الذى غالباً مايقع فى الجزء الامامى من البيضة لاحتسابها .


(د) تنفس البيضة :

تنفس البيضة من سطحها فى حالة وجود قشرة رقيقة لها ، أما فى الحشرات التى تكون فيها القشرة سميقة فإنه توجد بهذه القشرة تحورات خاصة تسهل لها عملية التنفس . ففى بعض أنواع الذباب توجد بالقشرة قنوات أو أعمدة رأسية صغيرة بينها فراغات مملوءة بالسوائل التى تحل محلها الهواء أو سائل هوائى فيما بعد . وفى عائلة النطاط من عائلة Tettigoniidae نجد أن بالقشرة فراغات تحوى الهواء أو قد تكون هذه الفراغات فى أماكن معينة فقط وتعمل عندئذ كمخزن للهواء بدلاً من وجودها فى القشرة كلها . وفى القمل يوجد مخزن الهواء هذا فى غطاء البيضة Cap . وفى بعض حشرات نصفية الأجنحة توجد زوائد خاصة جانبية بها هذه المخازن الهوائية . كما يوجد فى حشرات كثيرة أخرى فيلم هواء تحت القشرة ويحيط هذا الفيلم بمحتويات البيضة إحاطة تامة ، ويعمل هذا الفيلم الهوائى على تبادل الغازات بين جميع الأجزاء الداخلية للبيضة وبين الهواء الخارجى .

(هـ) امتصاص البيضة للماء :

إذا ما وضع البيض فى بيئة رطبة فإنه يمتص منها الماء خلال أغشيته المختلفة . وفى بيضة الخنافس المائية Dytiscus يؤدى إمتصاصها للماء إلى سهولة تغير شكلها فتصبح صلبة مشدودة وتزداد فى الحجم كثيراً ثم تتمزق قشرتها وتنفصل عنها وتصبح البيضة محاطة فقط بالغشاء الجنينى Vitelline Membrane وكذلك غشاء الكيوتيكل السيروزى . أما عن بيضة الجراد الرحال Locusta migratoria التى لا يتم نموها الطبيعى إلا فى الأرضى الرطبة فقط فإنها بامتصاصها الماء تزداد فى الوزن من ٦٣ر٦ ملليجرام إلى ١٤ ملليجرام ، كما تزداد محتوياتها المائية من ٥٢٪ إلى ٨٢٪ ويترتب على انتفاخ البيضة تشقق القشرة .

وفى بعض حشرات عائلة Capsidae (رتبة نصفية الاجنحة) تمتص البيضة الماء من أنسجة النبات الذى توضع فيه . وفى بيض الذباب الابيض Fam Aleurodidae (من رتبة متشابهة الاجنحة) تغرس البيضة فى أوراق النبات بواسطة حامل توجد عند قاعدته المنغرس فى النبات مثانة رقيقة تساعد على امتصاص الماء من النبات (شكل ١٣ ب) وبذلك تعوض البيضة فقد الماء الذى يحدث من سطحها المعرض للجو الخارجى .



شكل (١٣٠) : (أ) قطاع في قشرة بيضة بقة الرودنيس *Rhodnius*. (ب) بيضة حشرة *Trisileurodes* sp. بزائدها التي تمتص بواسطتها الماء منفوسة في ورقة ومحاطة بمادة أسمنتية.

وفي بيضة الحشرات المتطفلة داخلياً من رتبة غشائية الأجنحة والتي توضع دائماً داخل سوائل أجسام الحشرات الأخرى فإن قشرتها عبارة عن غشاء رقيق جداً يسمح بتمرير كثير من المواد من دم المائل إلى الجنين المتكون داخل البيضة ومثل هذا النوع من البيض يوضع وهو فقير في المخ.

أ - تركيب الحيوان المنوي *The Spermatozoon* أ - تركيب الحيوان المنوي

يتتركب الحيوان المنوي عامة في الحشرات كما في الحيوانات الأخرى من رأس التي تشغل النواه أكبر جزء من مساحتها وذيل متموج ذو تركيب مختلف ومعقد شكل ١٢٨ و ١٣١ ، والجزء الوسطى الذي يوجد في الحيوانات الأخرى غير موجود والجسم


المركزي Centriole هو الذى يعطى الخيط المركزى . هذا وفى الحشرة العصوية *Lepisma* وبعض الخنافس *Cicindela* يهاجر الجسم المركزى إلى أمام النواة ساحبا معظم الخيط المركزى والميتوكوندريا . ويرى فى شكل (١٣١) خطوات تكوين الحيوان المنوى من الخلية التناسلية الأولية للذكر *Spermatogonia* .

(ب) طرق انتقال الحيوانات المنوية من الذكور إلى الاناث :


تنتقل الحيوانات المنوية من الذكر إلى الاناث بطرق مختلفة . فالطريقة العادية هى أن تنتقل الحيوانات المنوية إلى مهبل الانثى عن طريق قضيب الذكر كوفى رتبة نصفية الاجنحة قد يكون هذا القضيب مزودا بزائدة خيطية طويلة على شكل هدب *Flagellum* تستطيع أن تصل إلى القابلة المنوية بالانثى وتترحل فوقها الحيوانات المنوية وبذلك يمكن أن يضعها داخل القابلة المنوية مباشرة بدلا من وضعها بالمهبل .

وتوضع الحيوانات المنوية إما حرة أو داخل كيس بروتينى يسمى أسبرماتوفور *Spermatophore* (تفرزه الغدة الزائدة) (شكل ١٣٢ ب) وذلك فى مهبل أو رحم الانثى أو فى البورسا *Bursa Copulatrix* ، فإذا وضعت حرة لا تلبث أن تسبح من أماكنها فى المهبل أو الرحم وتذهب إلى القابلة المنوية ولا تتركها الا عند اخصاب البيضة ، أما إذا وضعت داخل اسبرماتوفور فينفجر الاخير داخل البورسا أو داخل المهبل وتخرج منه الحيوانات المنوية لتذهب إلى المقابلة المنوية .

وفى عائلة النطااط والجراد *Acridiidae* يوضع الاسبرماتوفور داخل قناة القابلة المنوية نفسها وفى عائلة النطااط ذو القرون الطويلة *Tettigoniidae* يوضع الاسبرماتوفور فى فوهة الفتحة التناسلية ويشاهد جزء من الاسبرماتوفور ظاهراً وبارزا من الفتحة المذكورة بعد انتهاء عملية التلقيح . وفى حشرة السمك الفضى *Thermobia* يضع الذكر الاسبرماتوفور فوق الارض ويغزل خيوطا بالقرب منه وهذه الخيوط تعتبر بمثابة علامات تدل الانثى على مكان وجود الاسبرماتوفور وسرعان ما تحضر الانثى التى تلتقط الاسبرماتوفور بواسطة آلة وضع البيض . وفى حشرة أخرى تابعة لنفس حشرة السمك الفضى يضع الذكر الحيوانات المنوية على هيئة نقط فوق الخيط الذى يغزله ويصل هذا الخيط إلى نهاية بطنه حتى سطح الارض وعند حضور الانثى بمجرد رؤيتها للخيط يرشدها الذكر بنفسه إلى اماكن الحيوانات المنوية بواسطة قرون استشعاره وقرونه الشرجية وذلك بتوجيه لالة وضع بيضاها فتلتقط الانثى الحيوانات المنوية بآلة وضع البيض .



شكل (١٣١) : خطوات تكوين الحيوان المئوي (سبروماتوزوا) في الحشرات من خلية جرثومية (اسبرماتوجونيا).



شكل (١٣٢): (أ) عضو برليز في أنثى بقعة الفراش. (ب) قطاع أفقى في اسبرماتوفور مملوء بالحيوانات المنوية.

وفي حشرة *Sminthurus* توضع الحيوانات المنوية داخل الفتحة التناسلية للانثى بواسطة أجزاء فم الذكر . وفي الرعشات توجد أعضاء التناسل الخارجية في الذكر (آلة السفاد) على الاسترنتين البطيئين الثانية والثالثة (ولو أن الفتحة التناسلية في الذكر تفتح على الاسترنة التاسعة) . وعند التلقيح لابد أن تنتقل الحيوانات المنوية من الفتحة التناسلية للذكر إلى آلة السفاد أولاً ثم تنقلها الأخيرة إلى الانثى .

الاخصاب عن طريق فراغ الجسم *Haemocoleic Insemination* .

في عائلة بق الفراش *Cimicidae* يضع الذكر الحيوانات المنوية عند التلقيح في عضو صغير موجود على الجهة اليمنى للخط الوسطى بين الاسترنة البطنية الخامسة والاسترنة البطنية السادسة في الانثى ويعرف هذا عضو برليز *Berlese organ* أو *Spermalege* وبعد انتهاء التلقيح تخترق الحيوانات المنوية الجدار الداخلي المقفل لعضو برليز لتصل إلى فراغ الجسم *Haemocoele* في الانثى ومنه تذهب الحيوانات المنوية إلى القابلة المنوية . ويقال أن القابلة المنوية في بق الفراش لا تتصل بقناة المبيض المشتركة ولذلك فلا بد للحيوانات المنوية من أن تخترق جدار قناة المبيض المشتركة أيضاً كي تصل إلى البيض الناضج لاختصابه . وفي بق الفراش أيضاً تستعمل الحيوانات المنوية المتبقية في القابلة المنوية بعد اخصاب البيض كمصدر لغذاء الانثى أثناء فترة وضع البيض . وفي حشرة *Lyctocoris* توضع الحيوانات المنوية في المهبل ثم تخترق تلك الحيوانات المنوية جدار المهبل لتصل إلى فراغ الجسم ومنه تخترق المبيض أيضاً للقيام بعملية اخصاب البيض . وفي أحد أنواع بق الفراش يثقب الذكر جدار جسم الانثى من الخارج ليضع حيواناته المنوية داخل فراغ جسم الانثى مباشرة ، وبالطبع تذهب الحيوانات المنوية بعد ذلك لاختصاب البيض .

(ج) الاسبرماتوفراجا : *Sphragis* أو *The Spermatophragma* .

قد يتجمد جزء من السائل المنوي في الفقرات ويأخذ شكل كتلة جيلاتينية صلبة لقفل فتحة المهبل أو الرحم لحفظ بقية السائل المنوي داخل الجهاز التناسلي وعدم تسريه للخارج بعد عملية التلقيح ، وتسمى كتلة السائل المنوي المتجمد بالاسبرماتوفراجما . وفي رتبة حرشفية الاجنحة تتكون هذه الاسبرماتوفراجا أثناء عملية التلقيح ، وقد تعيق كتلة الاسبرماتوفراجما المتكونة هذه تكملة عملية التلقيح بالطريقة السليمة . ولقد وجد الباحثون أن كتلة الاسبرماتوفراجما قابلة للذوبان في الماء .

(د) مرور الحيوانات المنوية داخل القنوات التناسلية للذكر:

وكما ذكر سابقاً في وصف أنبوبة الخصبة Follicle في الذكر والتي تحوى المنطقة القاعدية منها الحيوانات المنوية حرة طليقة في حالة استعداد للخروج إلى الوعاء الناقل بعد هروبها من حويصلاتها Cysts التي كانت محيطة بها بعد ذوبان أو تمزيق جدار هذه الحويصلات، ويكون وجود الحيوانات المنوية في هذه القاعدية في حزم وقد تكون رؤوس جميع حيواناتها المنوية منغرسه في طاقية جيلاتينية. وتخترق الحيوانات المنوية الخلولى الموجود بين الـ Vas Efferens وبين الوعاء الناقل Vas Deferens وذلك يعمل ثقب به (يبلغ قطر الثقب الذى تحدته الحزمة المنوية الواحدة ما يعادل قطر نواة خلية واحدة من خلايا هذا الحاجز الخلولى الذى تثقبه الحزمة). ويتكون في خصبة فراشة دودة الحرير Bombyx mori من ٣٠٠٠ — ٤٠٠٠ حزمة من حزم الحيوانات المنوية المذكورة ويتكون في الأنبوبة الواحدة من أنابيب الخصبة Follicle من ٨٠٠ — ١٠٠٠ حزمة.

وتخرج الحيوانات المنوية إلى الوعاء الناقل وهى منغمسة في سائل تفرزه أنابيب الخصية Follicles ثم يفرز الوعاء الناقل نفسه سائلا يساعد الحزمة المنوية على المرور بداخله ونقلها إلى الحوصلة المنوية.

ويساعد سير الحزمة المنوية داخل القناة القاذفة انقباضات جدر القناة القاذفة ولو أنه يساعد افراز الغدد الزائدة حركة الحزم المنوية داخل الطرف الخارجى للقناة القاذفة. وعملية قذف حزم الحيوانات المنوية من النهاية الخارجية للقناة القاذفة (وذلك أما داخل أسيرماتوفور يوضع خارجيا قرب الفتحة التناسلية للأنثى أو يوضع داخل البورسا أو تقذف الحزم المنوية حرة داخل القابلة المنوية للأنثى) تسببها انقبضات العضلات القوية المغلفة للقناة القاذفة.

(هـ) مرور الحيوانات المنوية داخل القنوات التناسلية للأنثى:

إذا أخذت حيوانات منوية من أنثى الصرصار الأمريكى ووضعت في محلول ملح فسيولوجى فإنها تظل نشطه وتسبح بسرعة ١٦ ميكرون في الثانية تحت درجة حرارة ١٥ — ١٦°م وتزداد هذه السرعة إلى ٩٠ — ١٠٧ ميكرون في الثانية إذا ما ارتفعت درجة الحرارة إلى ٢٩°م.

بعد وصول الحيوانات المنوية إلى القابلة أو المهبل في الانثى فانها تعتمد في سيرتها داخل هذه الاعضاء في معظم الحشرات على حركتها الذاتية، وفي بعض الحشرات (كما في

رتبة حرشفية الاجنحة) تعتمد الحيوانات المنوية في سيرها وانتقالها داخل الانثى على انقبضات جدر القنوات التناسلية للانثى . وسبب خروج الحيوانات المنوية من البورسا لتذهب إلى القابلة المنوية هو وجود مادة طاردة تفرزها البورسا تعمل على طرد تلك الحيوانات إلى خارج البورسا وفي نفس الوقت تفرز غدة القابلة المنوية Spermathecal Gland مادة جاذبة تعمل على جذب الحيوانات المنوية إليها فتجعل الأخيرة تصعد خلال القناة المنوية الموصلة بين البورسا والمهبل ومن القناة المنوية تذهب الحيوانات المنوية إلى القابلة المنوية . وانقباضات جدر القناة المنوية بواسطة عضلاتها القوية تسبب (في بعض حشرات رتبة حرشفية الاجنحة) في افراز القناة المنوية سائلا منويا يتجه إلى البورسا وملؤها وربما يكون لهذا السائل المنوي علاقة بسير الحيوانات المنوية .

وعلى العموم فقد وجد خليفة (١٩٥٠) أن المادة التي تسبب في سير الحيوانات المنوية داخل الانثى تفرزها غدد خاصة موجودة بالقنوات التناسلية للذكر في فراشه الشمع *Galleria mellonella* وبالقناة القاضة في فراشة الحرير . وفي بقعة الرودنيس *Rhodnius* تسير الحيوانات المنوية داخل قنوات الانثى التناسلية بمساعدة انقبضات عضلات جدر هذه القنوات ولكن العامل الاساسي المسبب لقيام العضلات المذكورة بانقباضاتها هو افراز الغدد الزائدة في الذكور .

ومن الطرق الفريدة لانتقال الحيوانات المنوية داخل جهاز الانثى التناسلي هو الموجود في حشرة *Aspidictus* التي يحدث فيها اختصاب البويضات عند الاطراف العليا لفروع المبيض ، ففي هذه الحشرة تشاهد خلايا كبيرة تنفصل من النهاية العلوية لقناة المبيض المشتركة أو من قواعد المبيض الجانبية وتهاجر هذه الخلايا المنفصلة إلى الاجزاء العليا من فروع المبيض . وبما أن القابلة تفتح في هذه الحشرة عند النهاية العليا لقناة المبيض المشتركة فتتعلق بعض الحيوانات المنوية بالخلايا الكبيرة المهاجرة وتصعد معها إلى قمم فروع المبيض حيث يحدث اختصاب البويضات .

(و) الاسبروماتوفور : The Spermatophore .

تختلف طرق خروج أو طرد الحيوانات المنوية من الاسبروماتوفور باختلاف الحشرات . فوجد خليفة (١٩٤٩) في صرصار الغيط الاليف حيث يضع الذكر الاسبروماتوفور قرب فتحة الانثى التناسلية أن هذا الاسبروماتوفور يحوى كتلة من البروتين ضغطها الاسموزى يعادل ٣ ضغطا جويا ويحوى سائلا آخر ضغطه الاسموزى يعادل ٩.٠ ضغطا جويا فامتصاص كتلة البروتين للسائل المذكور يجعلها تزداد كثيرا في الحجم وتدفع الحيوانات المنوية لخارج الاسبروماتوفور لتذهب إلى دخل القنوات التناسلية للانثى

(شكل ١٢٥ ب) . ولكن فى أغلب الحشرات تنقبض جدر البورسا فتمزق الاسنان الشيشيتية الموجودة على الكيوتيكل المبطن للبورسا من الداخل جدر الاسيرماتوفور ، وهذه الاسنان قد تكون موزعة على السطح الداخلى للكيوتيكل المبطن للبورسا أو مركزه على صفيحة شيتينية تسمى Signum أو Lamina dentata ، وقد تحوى البورسا الواحدة صفيحة أو صفحتين من هذه الصفائح التى عند وجودها لابد من أن تتصل بها عضلات البورسا القوية .

ولقد عدد الحشريون فوائد صفيحة الـ Signum هذه فيما يلى :

- ١ — تسبب تهيج الذكر عند التلقيح وتجعله يقذف حيواناته المنوية (أو الاسيرماتوفور) داخل البورسا .
 - ٢ — تكسير جدار الاسيرماتوفور لخروج الحيوانات المنوية منه .
 - ٣ — تثبيت الاسيرماتوفور فى مكانه عند وضعه داخل البورسا .
 - ٤ — تعمل كمرشح لخروج الحيوانات المنوية دون غيرها من البورسا إلى القناة المنوية ولا تسمح بخروج المواد الكبيرة الحجم التى قد تسبب فى غلق وسد القناة المنوية .
- هذا وتغيب صفيحة الـ Signum فى الحشرات التى يكون جدار الاسيرماتوفور فيها رقيقا .

ويوجد على طرف القضيب فى ذكور كثير من حشرات عائلة Noctuidae (رية حرشفية الاجنحة) اشواك تسمى Cornuli فائدتها دفع وتثبيت الاميرماتوفور داخل البورسا فى مكانه الملائم (كالاهاى وشابان ١٩٦٠) . وغالبا ما تنتزع اشواك القضيب منه وتترك داخل البورسا بعد سحب القضيب عند الانتهاء من عملية التلقيح . كما قد تؤدي هذه الاشواك عمل الـ Signum ولو أن البعض يعتقد أن هذه الاشواك قد تعمل على تهيج الذكر عند عمليات التلقيح التالية بوجودها داخل البورسا بعد عملية التلقيح الاولى .

وتفرز كل أو بعض خلايا الابثيليم المكونة لجدار البورسا إفرازا يتجمع داخل البورسا ، ويتحول هذا الافراز إلى اللون الأصفر أو الأحمر أو البنى اذا ما تعرض للهواء اذ يحوى هذا الافراز بروتين ، ودرجة تركيز أيون الايدروجين لهذا الافراز (pH) هو ٤ — ٦ أى حامضى ضعيف جدا أو ٧ أى متعادلا كما فى فراشة الشمع Galleria حيث يحتوى هذا الافراز على مواد دهنية (خليفة ١٩٥٠) . وعلى العموم فلقد عدد الحشريون فوائد إفراز البورسا فيما يلى :

- ١ — يسبب هذا الافراز تصلب جدار الاسيرماتوفور .

- ٢ — يذيب جدار الاسبرماتوفور أو بالأحرى يسبب هروب الحيوانات المنوية وكذلك في اخلاء موضع داخل البورسا لاسبرماتوفور آخر (وجد داخل البورسا الواحدة لغاية ٧ اسبرماتوفورات) .
- ٣ — يتسبب في انتفاخ جدار الاسبرماتوفور وهذا يسبب بدوره في خروج الحيوانات المنوية خارجة .
- ٤ — يعمل كمادة طارة لطرد الحيوانات المنوية خارج الاسبرماتوفور وخارج البورسا نفسها .
- ٥ — يجعل جدار الاسبرماتوفور مرنا يسهل تشكيله عندما ينقبض جدار البورسا .
- ٦ — يعمل كمادة مائلة بين السطح الداخلى لجدار البورسا والسطح الداخلى لجدار الاسبرماتوفور مما يسهل انتقال انقباضات جدار البورسا إلى الاسبرماتوفور وتساعد هذه الانقباضات على الضغط على الاسبرماتوفور لتخرج الحيوانات المنوية منها .
- ٧ — لهذا الافراز تأثير بكتيرى .

رابعا : أوضاع التزاوج في الحشرات (شكل ١٣٣)

يأخذ كل من الذكر والانثى أثناء عملية التلقيح وضعا معيناً يختلف من رتبة إلى أخرى وقد يختلف داخل الرتبة نفسها . وكان يعتبر وجود الذكر فوق الانثى أثناء عملية التلقيح هو الوضع الاول Primitive في الحشرات ذات التطور Pterygota ولكن تأكد الآن أن الوضع الاول هو الذى تكون فيه الانثى موجودة فوق الذكر أثناء عملية التلقيح بشرط أن يكون سطحاهما السفليان متقابلين Venter to venter ، كما يعتبر الوضع الذى يكون فيه الذكر بجوار الانثى أثناء عملية التلقيح من الاوضاع الاولى وهذا الوضع الاخير موجود في أغلب الرتب الحشرية الآن . وعلى العموم ففى كلتا الحالتين السابقتين لابد من أن تصل نهاية بطن الذكر إلى أسفل بطن الانثى لامكان نقل الحيوانات المنوية من الذكر إلى الانثى .

وفي العراشات Order Odonata لابد من وجود الذكر فوق الأنثى أثناء عملية التلقيح إذ لابد للذكر أولا من نقل حيواناته المنوية من فتحة التناسلية الموجودة على الاسترنة البطنية التاسعة إلى آلة السفاد الموجودة على الاسترنتين البطنيتين الثانية والثالثة لجعل انتقال هذه الحيوانات إلى الانثى مؤكدا وسهلا .

وفي رتبة ذات الذنب الشعرى Or. Thysanura يوجد الذكر تحت أو جانب الأنثى أثناء عملية التلقيح ، والسرى فى ذلك (كما وجد ميلز Mills ١٩٤٠ فى حشرة Nicoletio

التابعة لهذه الرتبة) هو وجود غدة هيبيودرمية على السطح العلوى لبطن الذكر وإفراز هذه الغدة هو الذى يعمل على إغراء الأنثى للصعود فوقه أثناء عملية التلقيح وهذا مما جعل أغلب الحشريين يعتقدون فى وجود الغدة الهيبيودرمية على السطح العلوى لجسم الذكر فى جميع الحشرات التى يوجد فيها هذا الوضع من أوضاع التلقيح (الأنثى فوق الذكر) لتشجيع الاناث على الصعود فوق ظهور الذكور أثناء عملية التلقيح كـ بعض ذكور هذه الرتبة لاجتماع الاناث وانما تضع كيس الاسبروماتوفور (المملوء بالحيوانات المنوية) فى مكان ما ثم يقوم بغزل خيوط حريرية تمتد إلى مسافات كعلامه تقود الاناث إلى الاسبروماتوفور وعندما تقترب الانثى من الكيس تتجه نحوه بفتحتها التناسلية لتلتقطه ويحدث الاختصاب داخليا .

وفى فوق عائلات Phasmoidea, Mantoidea, Acridoidea (رتبة مستقيمة الاجنحة Or. Orthoptera) وكذلك فى نحل العسل (رتبة غشائية الاجنحة Or. Hymenoptera) يوجد الذكر فوق الانثى أثناء عملية التلقيح ولو أنه يعتقد أن هذا الوضع فى الحشرات المذكورة نشأ أصلا وتطور من الوضع الطبيعى الاول السابق ذكره (وهو وجود الانثى فوق الذكر بطنا لبطن) . ولذا سمي هذا الوضع فى الحشرات التابعة لفوق العائلات المذكورة وفى نحل العسل بالوضع العلوى الكاذب للذكر False male-position .

وهذا وتوجد أوضاع أخرى من أوضاع التلقيح خلاف الأوضاع السابق ذكرها وهى أن تتقابل نهاية الانثى End - to - end كما فى بعض الفراشات .

كذلك قد تبدأ عملية التلقيح بوضع ما مثل وجود الانثى فوق الذكر مثلا تنتهى بوضع آخر وهو أن تكون النهايتان للذكر والانثى متقابلتان كما فى فوق عائلات Blattoidea, Grylloidea, Tettigonioida (رتبة مستقيمة الاجنحة) .

وفى حشرة Borus (رتبة Mecoptera) يقبض الذكر على الانثى الموجودة فوقه جيدا بأجنحته الطويلة أثناء عملية التلقيح .

وفيما يلى الأوضاع المختلفة التى يتخذها كل من الذكر والانثى أثناء عملية التلقيح فى الرتب المختلفة :

١ - الأنثى فوق الذكر (بطن الأنثى تقابل ظهر الذكر) :

يوجد هذا النوع فى الرتب خافية الاجنحة (البراغيث) والذباب وشبكية الاجنحة والقمل القارض والقمل الماص وقمل الكتب ومستقيمة الاجنحة (فوق عائلات Tettigonioida, Blattoidea , وذبابه مايو .

٢ - الانثى فوق الذكر (بطن الانثى تواجه بطن الذكر) .

يوجد هذا النوع في رتبة الذباب .

٣ - الذكر فوق الانثى (بطن الذكر تواجه بطن الانثى ونهاية الذكر تصل لاسفل

الانثى) .

يوجد هذا النوع في رتب الذباب وغشائية الاجنحة - وغمدية الاجنحة وهديية الاجنحة ومتشابهة الاجنحة ومستقيمة الاجنحة (فوق عائلة Mantoidea) .

٤ - الذكر بجانب الانثى (ونهاية الذكر تصل إلى أسفل الانثى) :

يوجد هذا النوع في رتب الذباب وحرشفية الاجنحة وغشائية الاجنحة وغمدية الاجنحة ومتشابهة الاجنحة ومستقيمة الاجنحة (فوق عائلة Tettigoniodea) .

٥ - نهاية الذكر مقابلة لنهاية الانثى :

(أ) ظهر كل من الذكر والانثى لاعلى :

يوجد هذا النوع في رتب الذباب وحرشفية الأجنحة وغشائية الأجنحة وغمدية الأجنحة وقمل الكتب ونصفية الأجنحة ومتشابهة الأجنحة ومستقيمة الأجنحة (فوق عائلة Tettigoniodea) .

(ب) ظهر الانثى لاعلى وظهر الذكر لاسفل :

ويشاهد هذا النوع من طرق التزاوج في رتب الذباب وجلدية الاجنحة ومستقيمة الاجنحة (فوق عائلتي Acridoidea , Tettigoniodea) .

خامسا : التكاثر في الحشرات

يعتمد التكاثر في الحشرات أساسا على تلقيح الانثى بالذكر وإخصاب البيضة بالحيوان المنوى . ومعظم الحشرات من واضعات البيض الذى يفقس بعد وضعه ، ويشذ عن ذلك حالات كثيرة سنذكرها فيما يلي :

١ - واضعات الأحياء : Viviparous insects

تضع بعض الحشرات يرقات أو حوريات بدلا من البيض في الخارج مباشرة ، ويطلق على هذه الحالة « واضعات الأحياء » . وسبب ذلك هو بقاء البيض داخل جسم الحشرة إلى أن يفقس ثم تخرج نواتج فقس البيض إلى الخارج مباشرة كما وتوجد الحالة المذكورة في رتب الذباب (شكل ١٣٤ ب) ونصفية الاجنحة ومتشابهة الاجنحة .

ففى أنواع من المن مثلاً (متشابهة الأجنحة) تبقى البويضات في أماكنها في فروع المبيض إلى أن تفقس إلى حوريات تخرج للخارج . أما في الذباب فيمر البيض من فروع

المبيض إلى المهبل الذى يكبر كثيراً مكوناً ما يسمى بالرحم Uterus حيث يفقس البيض الذى يخرج منه اليرقات إلى الخارج فى عمرها الأول أو حتى فى عمرها الأخير ، ففى ذبابة مرض النوم Tsetse Fly (شكل ١٣٤ ب) تخرج اليرقة من الرحم إلى الخارج (المهبل) عندما تكون اليرقات تامة النمو فتعذر فور خروجها مباشرة .

وتتغذى اليرقة أو الحورية التى تفقس داخل جسم حشرتها إلى تخرج للخارج من البيض تلتهمه قبل خروجها منها أو كما فى ذبابة مرض النوم تتغذى اليرقات داخل المهبل من افرازات خاصة تفرزها الغدد الزائدة Accessory glands والمسماه أيضاً Milk glands التى تصب افرازاتها هذه داخل المهبل قرب أجزاء فم اليرقات وهذه وظيفة أخرى من وظائف الغدد الزائدة فى إناث الحشرات .

٢ _ التوالد البكرى : Parthenogenesis

وفيه تضع الاناث البيض بدون عملية الانحصاب أى بدون تقابل الذكر مع الأنثى ويفقس هذا البيض وتنتج عنه أفراد صغيرة قد تكون ذكوراً فقط وتسمى هذه الظاهرة Arrhenotoky أو إناثاً فقط Theiytoky أو كلا الجنسين معاً Amphitoky . وعلى العموم تسمى الحشرات التى تنتج أفراداً بالتوالد البكرى ويمكنها أيضاً التوالد جنسياً Holocyclic . أما الحشرات التى تتوالد بكريا فقط دون استطاعتها التوالد جنسياً فتسمى Anholocyclic . وقد يكون التوالد البكرى دائماً أى مستمراً كما فى نحل العسل حيث تضع الملكة باستمرار بيضاً مخصباً تنتج عنه إناث (شغالة وملكات) وبيضاً غير مخصباً تنتج عنه دائماً ذكور ، أو قد يكون هذا التوالد البكرى مؤقتاً أى يحدث فى الحشرات من وقت لآخر بدون نظام كلما دعت الحاجة وبدون تقابل الذكر مع الأنثى وذلك بالرغم من وجود الذكر كما فى فراش دودة الحرير . ويوجد تكاثر بكرى دورى فى حشرة المن حيث تتناسل هذه الحشرات تناسلاً جنسياً بالتبادل (أى دورياً) (إذ تظهر فى الخريف ذكور وإناث تتلاقح وتضع بيضاً مخصباً يبقى طول فصل الشتاء ، وفى الربيع التالى تفقس هذا البيض ويعطى إناثاً فقط تتوالد لا جنسياً أى بكريا وهذه تتوالد بدورها أيضاً بكريا ، وفى نهاية فصل الصيف تعطى هذه الإناث أيضاً بكريا إناثاً وذكوراً تتزاوج وتضع الإناث الملقحة بيضها المخصب الذى يفقس فى الربيع التالى وهكذا تعاد دورة الحياة .

ويستمر ذلك عدة أجيال (يرقات تنتج يرقاتاً) حتى تتحول فى النهاية بعض هذه اليرقات إلى عذراى تخرج منها حشرات كاملة (ذكور وأناث) وهذه تتزاوج وتضع بيضاً مخصباً ينتج عنه يرقات تتوالد وتعيد نفس تاريخ الحياة كما سبق .

٣ — تكاثر الأطوار غير الكاملة : Paedogenesis

العادة في الحشرات أن تتزاوج أنثى كاملة النمو مع ذكر كامل النمو أيضا ولكن في بعض الاحوال النادرة جدا يكون لليرقات القدرة على انتاج يرقات أخرى كما في يرقات ذبابة الـ *Miaster* وحشرة *Oligarces* فيتكون البيض داخل أعضاء التأنث الحديثة النمو لليرقة الأصلية (وتعتبر الام في هذه الحالة) ثم يفقس هذا البيض إلى يرقات وهذه تكبر داخل اليرقة الأصلية (الام) إلى أن يتم نموها فتأكل أنسجة الام الداخلية وكذا جدار جسمها لكي تخرج إلى الخارج ، وهذه اليرقات الحديثة الخروج تبدأ أيضا في وضع يرقات بنفس الطريقة ..

وتسمى أنواع المن التي تتغذى على نبات واحد فقط طوال العام *Monoecy* أما الأنواع التي تتغذى على نباتات في الشتاء وأخرى في الصيف بالتبادل يطلق عليها *Heterocy*.


ولعدارى بعض أنواع الهماموش *Fam . Chironomidae* (من رتبة ذات الجناحين) القدرة على انتاج يرقات داخل جسمها وهذه اليرقات تتغذى على محتويات العذراء (أى الام) ثم تخرج اليرقات إلى الخارج وتحول إلى عدارى وهكذا .

٤ — تعدد الاجنة في الحشرات : Polyembryony


تحدث هذه الظاهرة في الغالب في بيض الحشرات النافعة من رتبة غشائية الأجنحة التي تنطفل على غيرها من الحشرات كما تحدث هذه الظاهرة أيضاً ولكن بقلّة في حشرات تابعة لرتب أخرى ، وفي هذه الحشرات ينتج من كل بيضة (في الغالب موضوعة بطريقة التوالد البكرى أى غير ملقحة) عدة يرقات بدلا من يرقة واحدة أذ أحيانا ينتج من البيضة الواحدة من ٢٠٠ — ١٥٠٠ جنين أو أكثر (شكل ١٣٤ أ) .

عند تكوين الجنين في البيضة تهاجر نواتها إلى طرفها العلوى استعدادا لاستقبال الحيوان المنوى وتقسم النواة المذكورة انقسامين متتالين لينتج عنهما أربعة نوايا والتي تعرف بالاجسام القطبية *Polar Bodies* ، وفي الحشرات التي توجد فيها ظاهرة تعدد الاجنة تتحد نواة واحدة من الاربعة نوايا بنواة الحيوان المنوى لتكوين الجنين ، أما النويات الثلاثة الباقية فتتكاثر ويهاجر أغلبها إلى سطح البيضة لتكوين الشريط الجنيني *Germ Band* ولكن في حالة تعدد الاجنة نجد أن جميع النويات القطبية تحاط كل منها بجزء من سيتوبلازم البيضة كما تعطى كل نواة غشاء يسمى *Trophomnion* يحيط بها وما حوها من السيتوبلازم وكل من هذه الخلايا الجديدة تنقسم بدورها إلى قسمين وهكذا حتى يتكون عدد كبير من الأجنة . وتفقس هذه الاجنة في حالة أولية من النمو تتغذى على

أنسجة العائل الذى تفقس بداخله وتخرج للخارج فى طورها اليرقى الاخير أو فى طور العذراء أو حتى فى طور الحشرة الكاملة . والافراد الناتجة عن طريق تعدد الاجنحة تكون إما ذكورا وإناثا أو ذكورا فقط أو إناثا فقط .



- شكل (١٣٣) : أوضاع التزاوج المختلفة فى الحشرات .
- (أ) الذباب .
- (ب) الجراد .
- (ج) بعض حشرات رتبة مستقيمة الأجنحة (ز) متشابهة الأجنحة .
- (د) البعوض .
- (هـ) غشائية الأجنحة .
- (و) بعض أنواع النطاط .



شكل (١٣٤): (أ) طور من أطوار نمو الطفيل *Platygaster* بين تكوين منطقتين

جينييتين في بيضة واحدة.

(ب) الجهاز التناسلي في أنثى ذبابة *Glossina* (ذبابة مرض النوم)

٥ — صفة الخنثى فى الحشرات : Hermaphroditism

فى حشرة البق الدقيق الاسترالى مثلاً ينتج جهازها التناسلى الداخلى بيضاً وحيوانات منوية فى نفس الفرد الواحد وتعرف هذه الخاصة بخاصية الخنثى . وقد يفقس بيض البق الدقيقى هذا بكرياً أو يلقح قبل وضعه بحيوانات منوية من الموجودة معه فى نفس الجهاز التناسلى . وفى حشرات أخرى فى عائلة Phoridae يوجد فى نفس الفرد الواحد زوج من المبايض وزوج من الخصى وكل زوج منها له قنواته وفتحاته التناسلية الخاصة المستقلة . وعلى العموم فقد وجد أن الأفراد الخناث لا تلقح بعضها البعض .

ووجدت صفة الخنثى الثانوية فى حشرات رتبة Plecoptera حيث يوجد بالفرد الواحد خصى عاملة تنتج حيوانات منوية ويتصل بهذه الخص مبايض ولكنها لا تنتج بيضاً .

العقم فى الحشرات : Castration .

ليس لبعض الحشرات القدرة على تكوين جاميطات (بيضاً مخصباً) حيث أن أعضاء التناسلية مختزلة ، أو قد تكون الأعضاء التناسلية موجودة ونامية جيداً بالفعل ولكنها غير فعالة وهذا ما يسمى بالعقم .

وللعقم فى الحشرات سببان :

(أ) سبب فسيولوجى : ويوجد فى الحشرات التى تعيش معيشة اجتماعية فى مستعمرات كائنات الابلض مثلاً حيث يوجد منها أفراد مذكرة وأخرى مؤنثة ولكنها كلها عقيمة (الشغالات و العساكر) إذ تفرز الأفراد التناسلية هرمونا خارجياً Ectohormone تتناوله الحوريات الصغيرة وهذا الهرمون الخارجى يمنع نمو الغدد التناسلية فى الأفراد التى تتناوله .

وفى النحل نجد أن اليرقات التى ستنشأ عنها ملكات (أفراد خصبة) تتناول غذاء يختلف فى الكمية والنوم عن نوع وكمية غذاء اليرقات التى سينتج عنها أفراد عقيمة (الشغالات) ، ومثل الغذاء الاول يسمى بالغذاء الملكى Royal Jelly وهو الذى ينمى الغدد التناسلية فى اليرقات التى تتناوله حتى اذا ما أصبحت عذارى ثم حشرات كاملة (ملكات) تكون خصبة وقادرة على وضع البيض ، كما وأن الشغالة (أفراد عقيمة) فى خلية النحل تلعق جدار جسم ملكتها التى تفرز هرمون يعرف بالهرمون المانع Inhibiting hormone من غدد فكوكها العلوية يمنع نمو مبايض هذه الشغالات . أما إذا امتنعت الشغالات عن المعيشة مع الملكة فإنها تنتج بيضها بكرياً ينتج عنه ذكور فقط .

ووجد أن في الدبور الاصفر (Fam . Vespidae , Polistes sp) أنه بعد ٢٤ ساعة من موت الملكة أو ابعادها عن العش تبدأ الشغالات التي كانت عقيمة في وضع بيضا بكريا (بدون ذكر) .

(ب) سبب طفيلي : قد يسبب تطفل حشرة على عائل ما أن يصبح هذا العائل عقيما وربما يرجع ذلك إلى نقص كمية الغذاء داخل جسم العائل والكافية لنضوج أجهزته التناسلية كما هو الحال في بعض الزنابير الانفرادية من جنس Andrena أو إلى ادخال مواد (هرمونات) داخل جسم العائل بواسطة هذه الحشرة المتطفلة وتسبب في عقم هذا العائل . وتحدث هذه الخاصية عندما تطفل حشرات من رتب Sterpsiptera وغشائية الاجنحة ومتشابهة الاجنحة ، فتمضحل المبايض في اناث العائل وتثاثر الخصى قليلا في الذكور بسبب هذا التطفل . وفي بعض الحالات قد يسبب دخول الطفيل إلى داخل جسم العائل من تغيير في ألوان وأشكال وقرون الاستشعار وأعضاء التناسل الخارجية وأعضاء جمع حبوب اللقاح في الحشرة العائل (والذي يكون تابعا في الغالب لرتبة غشائية الاجنحة) . ويتطفل داخل جسم الحشرات أيضا ديدان ثعبانية تسبب العقم أيضا لعوائلها من الحشرات .

الغزل في الحشرات : (الابراشي ، ١٩٧٨)

لوحظ أن معظم الإناث لا تستجيب إلى إجماع الجنسى مباشرة بمجرد التقائها بالذكر ، بل لابد من مغازلتها والتودد إليها أولاً . فعندما يثار الذكر في بعض أنواع الفراشات وأى دقيق بالمادة الجاذبة الجنسية التي تفرزها الأنثى من الغدد الموجودة قرب نهاية بطنها فإنه يبتعد قليلاً عن أنثاه وينشر أجنحته للكشف عن غدد مفرزة لمادة جاذبة جنسية ذكرية تدفع الأنثى إلى الاقتراب منه فينحني إليها وبذلك تتمكن الأنثى من تلامس منطقة الغدد الذكرية بقرون استشعارها وهنا تسمح للذكر بعد الالتفاف حولها بالجماع .

وفي بعض أنواع الصراصير ، تتعلق الأنثى على ظهر الذكر كي تتغذى على إفراز غده الجنسية وعندئذ يتمكن الذكر من الجماع بها .

وفي بعض ذباب الفاكهة وصرصار الغيط ، يرت الذكر على أنثاه بأرجله الامامية على حين تقف الأنثى بلا حراك ، ثم يعود الذكر فيرت على رأسها وهنا يبدأ الشريكان في الرقص وهو عبارة عن خطوات إلى الجانبين على حين يقفان وجها لوجه ، وفي أثناء الرقص يبدأ الذكر في نشر أجنحته بالتدرج وبانتهاء نشرهما إلى الحد الأقصى يقف مختالا

على حين تقف الأنثى في استعداد كامل للجماع وعندئذ يلف الذكر حولها عدة مرات
تنتهى بالقفز إلى ظهرها ويتم الجماع.

وفي بعض الذنابير يحمل الذكر أثناء الغير بمنحة إلى مصدر الغذاء مهما بعد حيث
يغذيها بغية أرضائها وذلك قبل عملية الجماع.

الباب الثاني عشر

تكوين الجنين في الحشرات (النمو الجنيني)

Insect Embryology

لكي يتم تكون الجنين في الحشرات تحدث خطوات النمو التالية على التوالي داخل البيضة

١ — تكوين الاجسام القطبية : Formation of the Polar Bodies .

توجد النواة التناسلية في وسط البيضة بين النسيج الشبكي للمح ، وعند استعدادها للاخصاب تهاجر إلى طرف البيضة الامامي Anterior pole . وتبدأ في الانقسام مرتين ، والأنوية الناتجة عن ذلك تكون مايسمى بالاجسام القطبية Polar bodies نظرا لوجودها جهة الطرف الامامي للبيضة . يدخل الحيوان المنوى البيضة عن طريق النقيير ويحدث الاخصاب .

٢ — تكوين البلاستودرم والشريط الجنيني : Formation of Blastoderm and Germ Band


بعد الاخصاب تنقسم نواة الزيجوت وتتجه نحو السطح وتكون مع البريلازم طبقة متصلة تسمى البلاستودرم تبقى بعض الانوية محاطة بالسيتوبلازم وتعرف بخلايا المح . قبل ما يكتمل تكوين البلاستودرم يحدث أن تتجه بعض هذه الخلايا المنقسمة نحو مؤخرة البيضة وتكون الخلايا التناسلية الاولى . وباستمرار النمو يسمك البلاستودرم في المنطقة الوسطية البطنية (بالنسبة للبيضة) حيث يتكون الشريط الجنيني Germ Band الذي ينشأ عنه كل أنسجة الجنين وعندئذ ترى أن البيضة كلها تحتوى أساسا على المح محاطا بالبلاستودرم الجنيني ومن أسفل بالشريط الجنيني (شكل ١٣٥ ، ب) .

٣ — تكون الأغشية الجنينية وعملية الانبعاج للداخل في سطح الجنين

Formation of Embryonic Envelopes and Gastrulation

ينشأ عند طرفي الشريط الجنيني Germ band إنبعاجان امنيوتيان Amniotic Folds يتصلان ببعضهما البعض بعد ذلك ويحيطان بالشريط الجنيني تاركان فراغا هو

الفراغ الامنيوتقي Amniotic Cavity فيصبح الجنين عندئذ محاطاً بغشائين جنينين الخارجى منها يسمى بالسروزا Serosa وهو استمرار لطبقة البلاستودرم والداخلى يسمى بالامنيون Amnion وهو استمرار لحواف الشريط الجنينى (شكل ١٣٥ ج، د، هـ). وفائدة هذه الأغشية الجنينة تغلفها للجنين النامى حمايته.




شكل (١٣٥): تكوين البلاستودرم والشريط الجنينى والأغشية الجنينية.

وأثناء نمو الانبعجان الامنيوتيان السابق ذكرهما تبدأ عملية الـ *Gastulation* على شكل انبعاج داخلي في الخط الوسطى للشريط الجنيني بطول الجنين . وتنشأ القناة الهضمية الامامية *Stomodaeum* من طرف هذا الانبعاج الامامي عند مقدم البيضة أما القناة الهضمية الخلفية *Proctodaeum* فتنشأ من طرف الانبعاج الخلفي عند مؤخرة البيضة . بعد ذلك تتميز خلايا الشريط الجنيني إلى طبقتين ، الخارجية منها طبقة الاكتودروم والداخلية هي طبقة الميزودرم (شكل ١٣٥ و) .

٤ - ظهور حلقات الجسم (شكل ١٣٦)

Segmentation of the Embryo

بمجرد انتهاء تكوين الشريط الجنيني يظهر تقسيم على طول الجنين بواسطة خطوط أو فواصل عرضية تقسم الجنين عشرين حلقة . ويبدأ ظهور الفواصل من المقدمة ثم تظهر على التوالي تدريجيا كلما اتجهنا إلى مؤخرة الجنين ثم يتميز الجنين إلى منطقتين : ، الاولى هي منطقة الرأس *Primary head region* (أو *Protocromic region*) ويبدو الجنين في هذه المرحلة وكأنه مكون من ثلاث حلقات في الرأس وعديد من الحلقات في الجذع . وباستمرار النمو تبدأ الثلاث حلقات الامامية من الجذع في الانضمام إلى الرأس ويتكون من الثلاث حلقات التالية من حلقات الجذع (الحلقات الرابعة والخامسة والسادسة) حلقات الصدر ، اما باقى حلقات الجذع وعددها احدى عشر فتكون البطن . وجميع حلقات الجنين ماعدا الحلقة الاولى والاحيرة ، ينشأ عليها زوجان من الزوائد تعرف بزوائد الجنين . والحلقة الاولى من حلقات جسم الجنين *Ocular segment* والمسماة بحلقة الفصوص الامام رأسية *Procephalic lobes* لاتعتبر حلقة حقيقية اذ أنها تنشأ أمام الرأس ويتكون منها الشفة العليا . وأول زوج من الزائد على الرأس ينشأ عنه زوج من قرون الاستشعار ويوجد على حلقة الرأس الثانية ، ومن الحلقة الثالثة ينشأ الزوج الثانى من قرون الاستشعار ولكنه يكون صغيرا جدا في جنين الحشرات وما يلبث أن يختفى ، أما الحلقات الرابعة والخامسة والسادسة من حلقات الرأس فيتكون من زوائدها الفكوك العليا والفكوك السفلى والشفة السفلى على التوالي . يلى ذلك الارجل الصدرية التى تتكون من زوائد الحلقات الصدرية ثم يعقبها زوج من الزوائد الصغيرة على كل من حلقات البطن تختفى كلها قبل الفقس ولا يبقى منها إلا الزواج الذى يكون القرون الشرجية . فى بعض الحشرات يفقس الجنين من البيضة وبه عدد حلقات البطن كما هو بدون نقصان ، وفى البعض الآخر قد تضمحل أو تختفى بعض الحلقات البطنية الأخيرة قبل خروج الجنين من البيضة .



تبدأ بعض خلايا الطبقة الداخلية من طبقات الشريط الجنيني في الانتظام وترتيب نفسها في طبقتين طويلتين ثم يبدأ بعد ذلك تقسيم هاتين الطبقتين الطوليتين إلى أقسام مماثلة لحلقات الجنين التي تحمل الزوائد، ومعظم هذه التقسيمات أو الحلقات الميزودرمية تحوى داخلها في جميع الحشرات زوجاً من الفراغات الحشوية Coelomic cavities (شكل ح)، والجدار الظهري Splanchnic wall لكل من هذه الفراغات ينشأ عنه الأعضاء التناسلية Gonads والعضلات الحشوية والأجسام الدهنية، بينما نجد أن الجدار السفلي Somatic wall أو البطنى لكل من هذه الفراغات ينشأ منها عضلات زوائد الجسم المختلفة كالأرجل والأجنحة وأجزاء الفم وقرون الاستشعار وأعضاء التناسل الخارجية والقرون الشرجية وغيرها.

ينشأ جدار الجسم مباشرة من طبقة الاكتودرم ومعه بطبيعة الحال خلايا أعضاء الحس Sense organs . أما فراغ الجسم فيبدأ بتكون التجويف العصبي أولاً وهذا ينشأ

بانفصال المخ عن جدار الجنين من الداخل في الجزء الوسطى البطنى للجنين (شكل ط) ويمتد هذا التجويف أو الفراغ العصبى Epineural sinus الى الجوانب والى أعلى ومتحددا أيضا في نفس الوقت مع الفراغات الحشوية Coelomic cavities المتكونة سابقا فيتكون منها جميعا فراغ الجسم Body - cavity .

٧ — الوعاء الظهرى (شكل ط) :

عند امتداد التجويف العصبى إلى أعلى يدفع امامه بعض خلايا الميزودرم التى سيتكون منها الوعاء الظهرى ، وتتقابل هذه الخلايا عند الخط الوسطى الظهرى للجنين وترتب نفسها على شكل أنبوبة طويلة هى أنبوبة القلب التى يتصل بها على الجانبين خلايا جسمية ميزو درمية مرتبة فى صف واحد على كل جانب تكون بعد ذلك الحجاب الحاجز العلوى . أما الأورطة فينشأ من اتصال الفراغين الحشويين للحلقة الرأسية الثالثة أو الثانية وذلك من الجهة الظهرية للجنين ، وبامتداد هذا الفراغ الموحد الجديد للخلف يتصل الأورطة بأنبوبة القلب .


٨ — الاجهزة التناسلية (شكل ط) :

تنشط الخلايا التناسلية Germ cells المتكونة مبكرا عند البلاستودرم في الجنين والموجودة في طرف البيضة الخلفى في نفس الوقت الذى تكون قد تكونت فيه الفراغات الحشوية ، ثم تهاجر هذه الخلايا التناسلية للامام قليلا وتكون مجموعتين تستقر كل منها في مبيض أو في خصية مكونة الخلايا التناسلية في جهاز الحشرة التناسلى ، أما الخلايا الجسمية المكونة لبقية أنسجة الأعضاء التناسلية وقنواتها فتتكون من ميزودرم بعض الحلقات البطنية (فى الصرصار من الحلقات البطنية ٢ — ٧) .

٩ — الجهاز العصبى (شكل ١٣٧ ط) :

بعد عملية الـ Gastrulation بفترة قصيرة ينشأ على الشريط الجنينى نثوءان طوليان Neural ridges يمتدان بطول الجسم وذلك فى نفس الوقت الذى يجرى فيه تقسيم الشريط الجنينى الى حلقات Segmentation ، وتتكون بعد ذلك على هذا النثوء العصبى المزدوج عقد عصبية مزدوجة Ganglia أو Neuromeres أما المسافات الموجودة بين العقد العصبية المزدوجة فينشأ عنها الاحبال العصبية المزدوجة فى الحشرة Connective . والزوج الاول من العقد العصبية يكون المخ الاول Protocerebrum والزوج الثانى يكون المخ الثانى Deutocerebrum والزوج الثالث يكون المخ الثالث Tritocerebrum ، ويتحد أزواج العقد العصبية الثلاث المذكورة فيما بينهما مكونة المخ Brain . ويتحد

الثلاث أزواج التالية وهي الرابعة والخامسة والسادسة مكونة العقدة تحت المريء . وبعد ذلك تبدو أزواج العقد العصبية المزدوجة الصدرية والبطنية واضحة وعددها من ٩ — ١١ عقدة مزدوجة . ودائماً ما يقل عددها عن ذلك نظراً لاتحاد بعضها ببعض بصور متفاوتة في الرتب المختلفة . أما العقد العصبية للجهاز العصبي السمبثاوي فتنشأ من خلايا ابثيليم السطح العلوي للقناة الهضمية الأمامية .



شكل (١٣٧) : (ح) قطاع أفقي لبيان الفراغات الحلقية أو الحشوية (١ — ٤ زوائد الرأس، ٥ — ١٥ زوائد حلقات البطن) .
(ط) قطاع عرضي في البطن بعد إحاطة المخ بالشرائط الجنيني .

١٠ — الجهاز الهضمي وملحقاته (شكل ١٣٨) :

ويبدأ بالإنبعاث اكتودرمي للداخل خلف قرن الاستشعار ليكون القناة الهضمية الامامية Stomdaeum في الجنين وفتحتها الى الخارج هي فتحة الفم Mouth وكذلك انبعاث اكتودرمي للداخل أيضا في النهاية الخلفية للجسم لتكون القناة الهضمية الخلفية في الجنين

Proctodaeum وفتحها للخارج هي فتحة الشرج Anus . أما القناة الهضمية الوسطى Mesenteron فتكون في بعض الحشرات (هنسون ١٩٤٦) من مجموعتين من الخلايا Polar rudiments أحدهما تنشأ من النهاية الداخلية لإنبعاج القناة الهضمية الخلفية Proctodaeum والثانية تنشأ من النهاية الداخلية لإنبعاج القناة الهضمية الأمامية Proctodaeum وعلى هذا فتكون منشأ القناة الهضمية الوسطى في نظر هنسون ومؤيديه من الحشريين اكتودرمي . وفي حشرات أخرى يكون منشأ هذه القناة الهضمية الوسطى ميزودرمي وليس اكتودرمي ، وفي هذه الحالة تنشأ هذه القناة الوسطى بتكاثر بعض خلايا الميزودرم واتحادها مع بعضها البعض مكونة حلقة بيضاوية تحيط بالمنخ ، ويتلامس الطرف الامامي لهذه الحلقة بنهاية القناة الهضمية الخلفية ، قبل الفقس مباشرة تفتح القنوات الهضمية الثلاث (الامامية والوسطى والخلفية) على بعضها البعض بعد اختفاء الفاصل الذي يفصل القناة الهضمية الامامية عن الوسطية Stomodaeal membrane والفاصل الاخر الذي يفصل القناة الوسطى عن الخلفية Proctodaeal membrane وتصبح القناة الهضمية كلها عندئذ أنبوبة واحدة متصلة تبدأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة الشرج .

أما أنابيب مليحي فتشأ كنموات خارجية من مقدم القناة الهضمية الخلفية (أى اكتودرمية المنشأ) ولو أن هنسن (١٩٤٦) يعتقد أنها تنشأ من النهاية الخلفية للقناة الهضمية الوسطى . وفي أول الامر تكون النهايات الطرفية لأنابيب مليحي مفتوحة وتنتهي عند السطح الخارجى لجسم الجنين ثم لاتلبث أن تنكمش هذه النهايات المفتوحة الى الداخل وتصبح مقفلة وموجودة في فراغ الجسم .

وتنشأ كل من الغدتين اللعائيتين كنمو اكتودرمي مستقل للداخل بجوار إحدى زائدتى الحلقة السادسة من حلقات الجنين (حلقة الشفة السفلى) ، وقد تتحد قناتا الغدتين أثناء النمو ويتكون من اتحادهما قناة واحدة مشتركة تصب فوق اللسان ، أما الغدتان نفسيهما فتبقان مستقلتان .

١١ - القصبات الهوائية

تنشأ القصبات الهوائية كأزواج من الانبعاجات الداخلية قرب قواعد أزواج زوائد الصدرين المتوسط والخلفى وكذلك أزواج زوائد الحلقات البطنية الثمانية الاولى وذلك بعد الانتهاء من ظهور العقد العصبية Neuromeres بقليل . والفتحة الخارجية لكل من هذه الانبعاجات الداخلية تكون الثغر التنفس Spiracle ، أما النهاية الداخلية لكل منها

فينشأ منها نمو داخلي على شكل حرف T أفقى ، وبإتصال هذه التواءات الداخلية مع بعضها البعض يتكون زوج من القصبات الهوائية Tracheae الرئيسية الأولية على جانبي الجسم وبعد ذلك تتكون الفروع الأخرى من القصبات الهوائية وهذه تتفرع الى فروع أصغر وهكذا حتى تتكون في النهاية القصبيات الهوائية Tracheoles التي تنفصل عنها بعض خلايا الهيودرمس المحيطة بها لتكون الخلايا الطرفية End cells .

١٢ - مراحل النمو الأخيرة :

في أغلب الحشرات نجد أن تكوين الجنين يكون بالقرب من سطح البيضة السفلى وتكون الجهة البطنية من الجنين مواجهة لهذا السطح السفلى من البيضة . ولكن في بعض الحشرات ناقصة التطور Exopterygota نجد أن الجنين يهاجر أثناء فترة من فترات نموه إلى مركز البيضة في الداخل ويستدعى ذلك قيام الجنين بحركة تقوس حتى تصبح جهته البطنية مواجهة للجهة الظهرية ، وبعد فترة من السكون يرجع الجنين إلى الوضع الأصلي ثانية لتصبح جهته البطنية مواجهة للسطح السفلى للبيضة . وتعرف هذه الحركات التي يحدثها الجنين أثناء نموه داخل البيضة بالحركات الانقلابية Blastokinesis .

وبخلاصة ماتقدم في تكوين الجنين في الحشرات فإنه بعد الانتهاء من تكوين الشريط الجنيني واتجاه حواف هذا الشريط للجوانب ولأعلى لتكوين جوانب وظهر الجنين يتم في نفس الوقت تكوين حلقات الجسم (شكل ١٣٦) ونمو التجويف العصبي إلى أعلى وإلى الجوانب . كما ينشأ من اتحاد هذا التجويف العصبي المذكور مع التجاويف الحشوية الحلقية فراغ الجسم . كما أن نمو التجويف العصبي لأعلى وإلى الجوانب يدفع معه لأعلى خلايا ميزودرمية ليتكون منها القلب والحجاب الحاجز العلوى . ويتكون من خلايا الميزودروم أيضا العضلات وباقي أنسجة الجهاز الدورى والغدد التناسلية وقنواتها . كما تتكون في نفس الوقت القناة الهضمية . وقبل خروج الجنين من البيضة مباشرة تتمرق وتمتص الأغشية الجنينية المحيطة به ويفقس الجنين من البيضة .

طرق الفقس من البيضة Hatching Methods

تختلف طرق فقس الجنين من البيضة باختلاف الحشرات كما يأتي :

١ - قد يقرض الجنين جزء من قشرة البيضة لكي يخرج منها وأحيانا يأكل الجنين هذا الجزء المقروض كما في بعض أنواع السوس التابعة لرتبة غمدية الاجنحة وكذلك يرقات رتبة حرشفية الاجنحة .

٢ — فى بعض أنواع القمل والبق والرعاشات يوجد لكل بيضة الغطاء المعروف باسم القلنوسة Operulum واللى يدفعها الجنين بقوة نبض أعضاء خاصة Pulsatory organs فتنتفح القلنوسة .

٣ — فى بعض يرقات رتبة حرشفية الاجنحة يحدث كسر القشرة بواسطة حدوث ضغط بداخل الجسم بواسطة الدم يتسبب فى زيادة حجم الجسم ، وقد يحدث هذا الضغط الداخلى فى حشرات أخرى بواسطة ضغط العضلات أو امتصاص الهواء أو ابتلاع السائل الامنيوتى لزيادة حجم الجسم فيعمل ذلك كله على كسر قشرة البيضة .

٤ — يوجد بجسم الجنين أشواك فقس Egg - bursters فائدتها شق قشرة البيضة لخروج الجنين ، وتكون هذه الاشواك موجودة على الرأس أو الصدر أو البطن كما يلى (شكل ١٣٩) :

(أ) أشواك أو كاسرات توجد على جهة رأس الجنين — Acral or Front egg bursters وتزول مع الأغشية الجنينية بمجرد خروج الجنين من البيضة مباشرة أى أنها توجد ملازمة لمرحلته الجنينية فقط . ويوجد هذا النوع من الكاسرات فى الرتب والعائلات الآتية :

رتبة مستقيمة الاجنحة : عائلات

Mantidae , Phaneropteridae , Locustidae, Gryllotalpidae .

رتبة جلدية الاجنحة ورتبة القمل القارض ورتبة القمل الماص .

رتبة نصفية الاجنحة : عائلات

Reduviidae, Pyrrhocoridae, Comptosmidae, Pentatomidae, Lygaeidae, Cimicidae, Careidae

رتبة شبكية الأجنحة : عائلات :


Conioptarygidae, Sisyridae, Osmylidae, Chrysopidae, Heterobiidae

رتبة ميجالبترا : Order Megaloptera

رتبة ترايكبترا : Order Trichoptera

(ب) كاسرات بيض جهه مستديمة وهى متشابهة للنوع الاول ولكن الجزء الذى تحمل عليه هذه الكاسرات يبقى حتى الانسلاخ الاول . ويوجد هذا النوع فى الرتب الآتية : رتبة ذات الذنب الشعرى : Lepismidae .

الخلايا المكونة لطبقات القناة الوسطى



رتبة الذباب (تحت رتبة نيماتوسيرا) : عائلات :

Mycetophilidae, Tipulidae, Anisopodidae, Culicidae, Chironomidae

رتبة خافية الاجنحة (البراغيت) : Order Siphonaptera

رتبة غمدية الاجنحة (تحت رتبة أديفاجا) : عائلات :

Carabidae, Dytiscidae, Coccinellidae

(ج) كاسرات بيض توجد على الصدر والبطن وتبقى حتى الإنسلاخ الأول وتوجد :

في رتبة غمدية الأجنحة في العائلات الآتية :

Hydrophilidae, Coccinellidae, Nititulidae, Lucanidae, Passalidae,
Staphylinidae, Cerambycidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae,
Chrysomelidae, Curculionidae, Melondrydae, Lyctidae, Ptinidae.



شكل (١٣٩) : بعض الأشكال لأشواك الفقس في رتبة غمدية الأجنحة.

(أ) يرقة Attetabus .

(ب) يرقة Carcinops .

(ج) يرقة Tenebrio .

الباب الثالث عشر

النمو الذى يلي النمو الجنينى فى الحشرات (التطور)

Postembryonic Development in Insects (Metamorphosis)

تقسم الحشرات بالنسبة الى تطورها الى :

١ — حشرات بسيطة أو عديمة التطور *Ametabola* وفيها يوجد طورى البيضة *Egg* والحشرة الكاملة *Adult* أو *Imago* .

٢ — وحشرات ناقصة التطور *Hemimetabola* وفيها يوجد أطوار البيضة والحورية والحشرة الكاملة وتقسم هذه الحشرات بدورها إلى حشرات ذلك تطور ناقص تدريجى *Paurometabola* وتعيش الحورية فى نفس البيئة التى تعيش فيها الحشرة الكاملة وتتغذى من نفس غذائها وحشرات ذات تطور ناقص غير تدريجى *Archimetabola* وحورياتها تعيش فى الماء بينما الحشرات الكاملة فى الهواء .

٣ — الحشرات الكاملة التطور *Holometabola* التى تفقس فيها البيضة لتخرج منها اليرقة التى تختلف عن الابهين كل الاختلاف وبعد أن تأخذ اليرقة فى التغذية تنمو مع الانسلاخ حتى تبلغ أقصى حد النمو ، وقرب نهاية آخر عمر أو دور من عمرها *Last instar (or stadium)* تتهىء اليرقة نفسها للتحويل الى عذراء ولذلك فهى (فى الغالب) تحيط نفسها بشرنقة *Cocoon* من الحرير أو الطين أو من نشارة الخشب أو غير ذلك ، ويحدث لهذه اليرقة التامة النمو عدة تغيرات كأن تصبح ساكنة لاتتغذى ويتغير لونها قليلا وتتضخم ويقصر جسمها ويطلق عليها فى هذه الحالة اسم : « ما قبل العذراء » (موجودة داخل الشرنقة) يخرج منها طور العذراء ثم تتحول العذراء الى طور الحشرة الكاملة .

وحيث أن الطريقة الشائعة لتكاثر الحشرة الكاملة هى وضع البيض ، اذن فيمكن معرفة الاطوار *Stages* المختلفة للحشرة والتى تبدأ من طور البيضة واليرقة أو الحورية والعذراء والحشرة الكاملة . ولكى تصل البيضة إلى طور الحشرة الكاملة لابد لها من أن تمر بالسلسلة المذكورة من التغيرات والتى يطلق عليها جميعا اسم التطور *Metamorphosis* أى أن كلمة التطور تعبر عن جميع مراحل النمو المختلفة التى تلى مرحلة النمو الجنينى ، وسنتكلم فيما يلى عن كل مرحلة من مراحل النمو المذكورة .

طور البيضة : The Egg - stage

ولقد وصف من قبل بالتفصيل مع الجهاز التناسلي

طور اليرقة : The Larval - stage

للطور اليرق القدرة على أن ينسلخ ، ويطلق على طور اليرقة بعد كل انسلخ (عمر Instar) ، فيقال لليرقة بعد انسلخها الأول بانها في العمر الأول Ist Instar والمدة نفسها أى طول العمر الأول تسمى Ist stadium ، وبعد انسلخها الأول تصبح اليرقة في عمرها الثانى Snd Instar والفترة الثانية 2nd Stadium وهكذا حتى تتحول اليرقة الى طور العذراء .

ويوجد من اليرقات أنواع كثيرة (شكل ١٤٠) منها اليرقات الأولية Protopoda واليرقات العديدة الأرجل Polypoda واليرقات عديمة الأرجل Apoda (وهذه بدورها تقسم حسب درجة تكامل الرأس بها الى ذات رأس تامة التكوين Eucephalus ويرقات ذات رأس غير تامة التكوين Hemicephalus ويرقات ليس لها رأس بالمرءة Acephalus .

طور الحورية : The Nymphal - stage


وهو الطور الذى يحل محل اليرقة فى الحشرات الناقصة التطور ، والحورية تفقس من البيضة على درجة كبيرة من النمو لدرجة انها تشبه الى حد كبير شكل حشراتنا الكاملة فأرجلها المفصليّة وعيونها المركبة وقرون استشعارها وأجزاء فمها كلها تشبه مثيلاتها فى الحشرة الكاملة . وطور الحورية مثل طور اليرقة له القدرة على أن ينسلخ لكى يصل الى طور الحشرة الكاملة .

طور العذراء : The Pupal-stage

وهو طور ساكن ضعيف فى الغالب ولكنه قد يكون نشطا فى بعض الحشرات كما فى عذراء البعوض (ولو أن أرجله وأجنحته غير متحركة) . وتحدث عدة تغيرات مورفولوجية وهستولوجية كثيرة خارجية وداخلية فى جسم العذراء وكذلك فى جسم الحورية وينشأ عن هذه التغيرات نمو وتطور العذراء الى طور الحشرة الكاملة وستتكلّم عن هذه التغيرات بالتفصيل فيما بعد .

وتقسم هنتون (١٩٧٦) طور العذراء Pupal-stage إلى مرحلتين Phases ، المرحلة الأولى ويسمىها هنتون Pharate pupa وتبدأ من وقت انفصال كيوبيكل اليرقة التامة النمو


عن الهيودرمس عند إفراز الأخيرة لسائل الانسلاخ وابتداء إفراز كيتيكل العذراء تحت سائل الانسلاخ والتي يسميها هنتون Apolysis وتنتهى بعملية الانسلاخ الفعلية Ecdysis الظاهرة التي تخرج منها العذراء من جدار جسم اليرقة وعندئذ تبدأ المرحلة الثانية لطور العذراء والمسماه Pupa . ويسرى نفس الشيء على طور الحشرة الكاملة التي يقسمها هنتون أيضا إلى Pharate adult وتبدأ من وقت انفصال كيتيكل العذراء عن خلايا الحشرة الكاملة الجديدة (Apolysis) وتنتهى عند عملية الانسلاخ الفعلية الظاهرية والتي تخرج فيها الحشرة الكاملة من جدار حجم العذراء Ecdysis ، وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية من مرحلتى الحشرة الكاملة والمسماه Adult .



شكل (١٤٠) : أنواع اليرقات في الحشرات .

للعدراء أشكال مختلفة (شكل ١٤١) منها العدراء المكبلة (Obtect pupa Obtect)
 (Exarate pupa Exarate أو Free pupa أو Exarate) والعدراء الحرة
 (Coarctate adecticous pupa Coarctate) والعدراء المستورة

كما توجد عدراء حرة الحركة وزوائد جسمها غير ملتصقة بها وفكوكها العليا قوية
 شيتينية منفصلة وتسمى مثل هذه العدراء Decticous pupa وتوجد في الحشرات الأولية
 من الحشرات كاملة التطور Endopterygota مثل حشرات رتب شبكية الاجنحة
 وميكوبترا Mecoptera وعائلي Mricropterygidae و Eriocraniidae من رتبة
 حرسفية الاجنحة.



شكل (١٤١) : أنواع العدراء في الحشرات.

ولخروج الحشرة الكاملة من الشرنقة أو العذراء طرق كثيرة نذكر منها مايلي (عن عرب ١٩٦٠) :

- ١- في الحشرات ذات أجزاء الفم القارضة تقرض الحشرة الكاملة لها طريقها للخروج .
- ٢- في الحشرات ذات أجزاء الفم الماص (رتبة حرشفية الاجنحة) تقوم العذراء نفسها بتسهيل خروج الحشرة الكاملة منها بعدة طرق كالآتي :
 - (أ) للعذراء في كثير من حشرات رتبة حرشفية الاجنحة عضو خاص يوجد في الرأس تشق به العذراء الشرنقة لتخرج منها الحشرة الكاملة .
 - (ب) يوجد على جانبي العذراء في المنطقة الصدرية وعند قاعدة الجناح الأمامي زوج من الأشواك القوية تشق بواسطته العذراء الشرنقة لكي تخرج منها الحشرة الكاملة .
 - (ج) تخرج العذراء سائلا من الفم تطب به جزءا من الشرنقة تنفذ منه الحشرة الكاملة بدفع نفسها خلاله كما في فراشة الحرير .
 - (د) بعض اليرقات عندما تنسج لنفسها شرنقة لتعذر فيها تبني في أحد أطراف هذه الشرنقة صماما مخروطي الشكل تدفعه الحشرة الكاملة أمامها إلى الخارج عند خروجها من الشرنقة .
- ٣- في الحشرات ذات أجزاء الفم اللاعق كالذباب تخرج الحشرة الكاملة من الجلد اليرقي الأخير المحيط بالعذراء الحرة الموجودة داخله بأحدى طريقتين :
 - (أ) يوجد على الجهة الظهرية بالقرب من منطقة الرأس لبعض عذاري الذباب (أى الجلد اليرقي الأخير الخارجى) شق على شكل حرف T تخرج منه الذبابة .
 - (ب) يوجد في بعض أنواع الذباب عند مقدمة الرأس عضو على شكل مثانة صغيرة يسمى Ptilinum تدفعه الذبابة خارج رأسها أثناء خروجها من الجلد اليرقي الأخير فيساعدوها على الخروج ثم تعود هذه المثانة داخل الرأس مرة ثانية كما كانت قبل خروج الذبابة .

فرط التطور

Hypermetamorphosis

يوجد قليل من الحشرات الكاملة التطور Holometabola تأخذ فيها اليرقة أثناء نموها أشكالا مختلفة ، فبعد الفقس من البيضة مباشرة تكون اليرقة منبسطة لها أرجل

صدرية منبسطة لها أرجل صدرية طويلة سريعة الحركة وأجزاء فمها قوية ، ولكن بعد الانسلاخ الأول تصبح هذه اليرقة رخوة ضعيفة الحركة ذات أرجل قصيرة وبعد الانسلاخ الثانى تصبح شكل العذراء (الكاذبة) مع أنها مازالت فى طور اليرقة ويتصلب الجسم وتقتصر أطرافه بشكل واضح ثم تقضى اليرقة بياتها الشتوى على هذا النحو ، وفى الربيع التالى تنسلخ هذه اليرقة للمرة الثالثة ثم للمرة الرابعة لتصبح عذراء حقيقية ، ثم تنسلخ لتعطى الحشرة الكاملة . هذه التغيرات هى مايعبر عنها بظاهرة فرط التطور أى أن أحد أطوار الحشرة وهو الطور اليرقى يأخذ أشكالا متعددة كما فى حشرات عائلة Meloidae من رتبة غمدية الاجنحة .

الباب الرابع عشر



تكوين ونشوء الحشرة الكاملة

The Development of the Imago

تتكون الحشرة الكاملة كنتيجة نهائية للتطور . ففي الحشرات ناقصة التطور يحدث التحول الى الحشرة الكاملة بعد تغيرات خارجية وداخلية تدريجية والتي يمكن تتبعها أثناء الاعمار المختلفة لطور الحورية ، ولو أن التغير الذى يحدث عند آخر انسلخ للحورية يكون أكبر بكثير من التغيرات التى تحدث عند الانسلخات السابقة .

وفى الحشرات كاملة التطور يحدث معظم التحول من طور اليرقة الى طور الحشرة الكاملة أثناء طور العذراء الساكن ، وتختلف درجة هذا التغير من حشرة إلى أخرى ومن نسيج إلى آخر . وقد تنتقل خلايا نسيج معين من أنسجة اليرقة الى نفس النسيج فى الحشرة الكاملة ، وفى مثل هذه الحالة يحدث الانتقال بدون تغير . وفى أحوال أخرى قد يتلاشى نسيج اليرقة كله (عملية الهدم هذه تسمى Histolysis) ويتكون النسيج الذى سيحل محله فى الحشرة الكاملة (عملية البناء هذه تسمى Histogenesis) من براعم مكونة من كتل من الخلايا المحددة المسماة Histoblasts أو Imaginal discs أو Imaginal buds .

ودرجة تجديد أنسجة الحشرة الكاملة بعد زوال وتلاشى مثيلاتها فى اليرقة تختلف أيضا من حشرة إلى أخرى ، إن أول ما يحدث فى جميع الحالات هو التهام نسيج اليرقة (الذى سيكون مثيله) أولا بواسطة كرات دموية آكله Phagocytic blood cells .

وتعتبر البراعم المحددة أنسجة جنينية تكون ساكنة أثناء الطور اليرقى ولكن عندما يتغير التوازن الهرمونى الذى يتحكم فى التطور فى نهاية عمر الطور اليرقى تبدأ هذه الخلايا الجنينية فى النمو وتعطى أنسجة الحشرة الكاملة المماثلة لها وذلك أثناء نهاية عمر اليرقة . Prepupa وأثناء طور العذراء Pupa .

وفيما يلى ملخص للتغيرات التى يمكن أن تحدث للأنسجة والأجهزة المختلفة فى الحشرات الكاملة التطور أثناء تحولها من أنسجة وأجهزة اليرقة إلى الأنسجة والأجهزة المماثلة لها فى الحشرة الكاملة .

١ - الهيودرس :



إن عملية نمو هيودرس الحشرة الكاملة من العمليات الهامة إذ يرتبط بها أيضا نمو أرجل وأجنحة وقرون استشعار وزوائد التناسل الخارجية في الحشرة الكاملة والتي تبدأ في الانبعاث والظهور خارجيا أثناء طور العذراء . وفي رتبة غمدية الاجنحة ينتقل أغلب خلايا هيودرس اليرقة الى الحشرة الكاملة بدون أن تحدث لها أى تدمير . وفي رتبة غشائية الاجنحة ورتبة الذباب يحدث تغير تدريجي لهيودرس اليرقة وينمو هيودرس الحشرة الكاملة من براعم مجددة Imaginal discs ، وفي هاتين الربتين تنشأ خلايا هيودرس الرأس والصدر من البراعم المجددة لزوائد الرأس والأرجل بينما ينشأ الهيودرس الجديد للبطن من مراكز مجددة منفصلة أى مستقلة ، ففي ذبابة الدروسوفيلا مثلا توجد ست من هذه المركز المجددة على الحلقات البطنية التي تحمل أزواج الثغور التنفسية .

وفي الرتب الأقل رقا التابعة للحشرات كاملة التطور حيث تكون زوائد الرأس والصدر في اليرقات مشابهة إلى حد كبير لمثيلاتها في العذراء أو الحشرة الكاملة نجد أن هذه الزوائد المذكورة في العذراء والحشرة الكاملة تنمو داخل مثيلاتها في اليرقة (شكل ١٤٢) ، وفي حالات أخرى لا توجد البراعم المجددة ملازمة لزوائد اليرقة بل ان الزوائد المذكورة في الحشرات الكاملة تنشأ أثناء طور العذراء من جيوب هيودرمية موجودة في اليرقة . وتظهر البراعم المجددة بصورة ميسرة في يرقة البعوضة التابعة لجنس أنوفيليس حيث توجد هذه البراعم عند قواعد زوائد اليرقة المماثلة لها والتي ينتظر أن تحل محلها أثناء طور العذراء .

٢ - القناة الهضمية :

قد ينتقل لإشليم القناة الهضمية الأمامية والقناة الهضمية الخلفية من اليرقة إلى الحشرة الكاملة بعد تغيير بسيط كما في رتبة غمدية الاجنحة .

وفي دودة الحرير *Bombyx mori* وكذلك في الحشرة التابعة لتحت رتبة سليكراهافا من رتبة الذباب توجد خلايا مجددة حول النهاية الداخلية للقناة الهضمية الأمامية Fore-gut أو Stomodaeum وأخرى عند النهاية الداخلية للقناة الهضمية الخلفية Hind-gut أو Proctodaeum ، وتسمى كل من هذه الخلايا المجددة بالحلقة الجنينية الأمامية Anterior imaginal ring والحلقة الجنينية الخلفية Posterior imaginal ring على التوالي ، وأثناء طور العذراء تندثر وتزول القناة الهضمية الأمامية والخلفية وتتكاثر خلايا الحلقة الجنينية الأمامية والخلفية وتكون قناة هضمية أمامية وخلفية جديدتين .



شكل (١٤٢) : (أ) تطورات نمو الجناح في بعض اليرقات .
 (ب) برعم الرجل في يرقة من يرقات عائلة السوس Curculionidae
 (رتبة غمدية الأجنحة) .
 (ج) برعم قرن الاستشعار في نفس اليرقة .

أما بالنسبة للقناة الهضمية الوسطية Mid-gut أو Mesenteron فغالبيتها تزول ويحل محلها قناة وسطى جديدة من الخلايا المجددة الموجودة عند قواعد خلايا الإبيليم العادية المكونة للقناة الوسطى في اليرقة (كما في رتب ترايكيترا وحرشفية الأجنحة والذباب وغشائية الأجنحة (شكل ١٤٣ أ) وكثير من حشرات رتبة غمدية الأجنحة) أو من براعم مجددة موجودة عند النهاية الخلفية لهذه القناة الوسطى (كما في بعض حشرات رتبة غمدية

الأجنحة). وفي بعض الحشرات (كما في السيستر مثلاً من رتبة غمدية الأجنحة) تزول هذه القناة الجديدة مرة أخرى ويحل محلها قناة جديدة ثانية نهائية وذلك في نهاية طور العذراء وقبل خروج الحشرة الكاملة.

٣ - أنابيب مليجي:

في بعض أنواع رتبة الذباب (حشرة Heterogenea) ورتبة غمدية الأجنحة (حشرة Leptinotarsa من عائلة Chrysomelidae) تنتقل أنابيب مليجي في اليرقة كما هي بدون تغير يذكر إلى الحشرة الكاملة، ولكن في بعض الحشرات الأخرى قد تتلاشى أنابيب اليرقة كلياً أو جزئياً وتتكون أنابيب الحشرة الكاملة من الخلايا الموجودة عند قواعد خلايا الإثيليم العادية لأنابيب مليجي ولو أن الجزء القاعدي لهذه الأنابيب الجديدة في الحشرة الكاملة تنشأ في هذه الحالة من الحلقة الحينية الخلفية Posterior imaginal ring.

٤ - الغدد اللعابية (وغدد الحرير):

تتلاشى الغدد اللعابية في اليرقة كلية بطريقة الـ Phagocytosis وتتكون غدد الحشرة الكاملة بواسطة نمو وتكاثر خلايا زوج من البراعم الحلقيّة موجود حول الفتحة الخارجية لقناة الغدة المشتركة (أو قناة كل غدة في حالة انتهاء كل غدة في خارج الجسم بفتحة مستقلة).

وفي حشرة Gallerucella (من عائلة Chrysomelidae من رتبة غمدية الأجنحة) تنمو الغدد الجديدة بعد إندثار غدد اليرقة كإنبعاجات للداخل من جدار الجسم عند قواعد الفكوك السفلى.

٥ - الخلايا النبيذية: Oenocytes

تتلاشى خلايا اليرقة النبيذية وتنشأ الخلايا النبيذية الجديدة من بعض خلايا هيودرمس جدار الجسم بعد انفصالها عن زميلاتها المكونة لجدار الجسم.

٦ - الجهاز القصبى:

تنتقل خلايا الهيودرمس المغلفة للقصبات الهوائية في اليرقة كما هي إلى الحشرة الكاملة ولو أنه قد يحدث أن تنشأ أفرع جديدة أو أن تفتح أخرى في ثغور تنفسية جديدة عاملة. وفي حشرة Marmonia (رتبة غشائية الأجنحة) يحدث تغير كبير للقصبات الهوائية في اليرقة وتنشأ القصبات الجديدة من خلايا خاصة موجودة عند قواعد القصبات الهوائية الرئيسية المتصلة بالثغور التنفسية Spiracular trunks في اليرقة. وفي حشرة

Calliphora يحدث بعض التغير للقصبات في اليرقة وتنمو القصبات الجديدة من براعم مجددة مبعثرة على جدار القصبات الهوائية لليرقة .

٨ - الوعاء الظهرى : Dorsal vessel

غالباً ينتقل الوعاء الظهرى من اليرقة إلى الحشرة الكاملة بدون تغير يذكر ومع استمرار نبضه وذلك أثناء طور العذراء الساكن، ولكن في حشرة Mormonella يندثر الوعاء الظهرى لليرقة ويحل محله وعاء ظهرى جديد من براعم مجددة مبعثرة .

٩ - الجهاز العصبى المركزى :

المعروف عما يحدث للجهاز العصبى المركزى فى اليرقة أثناء طور العذراء هو تغير موضع العقد عند انتقالها إلى الحشرة الكاملة وذلك لقصر الأحيال العصبية Connectives الموصلة بينها، ولكن بعض الحشريين (Tiegs ، ١٩٢٢) وجد أنه يحدث إندثار للجهاز العصبى المركزى فى اليرقة ويحل محله جهاز عصبى مركزى جديد من خلايا مجددة Neuroblasts موجودة على السطح الخارجى لكل عقدة عصبية فى اليرقة ومحيطه بخلايا عصبية أخرى أكبر حجماً موجودة جهة الداخل فى نفس العقدة العصبية هى الخلايا العصبية لليرقة .

١٠ - الجهاز العضلى :

توجد إختلافات كثيرة متباينة لما يحدث للجهاز العضلى أثناء التطور (أثناء طور العذراء) فى الحشرات المختلفة، وعلى ذلك فتنشأ عضلات الحشرة الكاملة تبعاً لعدة طرق منها :

- (أ) بعض عضلات اليرقة تنتقل بدون تغير يذكر إلى الحشرة الكاملة .
- (ب) البعض الآخر يحدث له بعض التجديد عند انتقاله من اليرقة إلى الحشرة الكاملة .
- (ج) بعض عضلات اليرقة تندثر بدون أن تعود ثانية أو يتجدد غيرها .
- (د) بعض عضلات اليرقة تندثر ويتكون غيرها لتحل محلها فى الحشرة الكاملة .
- (هـ) بعض العضلات لا توجد إلا فى الحشرة الكاملة فقط وتنشأ لأول مرة أثناء طور العذراء .

فى جميع الأحوال السابقة التى يحدث فيها تكوين عضلات جديدة تحل محل العضلات المتدثرة فى اليرقة أو يتكون فيها عضلات لأول مرة أثناء طور العذراء، تتكون مثل هذه العضلات الجديدة من نوايات مجددة صغيرة موجودة بداخل أو حول الألياف العضلية فى اليرقة (كما فى حشرة Mormonella وأنواع الذباب التابعة لتحت رتبة سيكلر هافا) .

وفي حشرة Calliphora تنشأ بعض عضلات الحشرة الكاملة لأول مرة أثناء طور العذراء والبعض الآخر ينشأ بعد اندثار عضلات اليرقة ثم بناء غيرها من جديد بواسطة الخلايا المجعدة المسماة Myoblasts (شكل ١٤٤).

١١ - الجهاز التناسلي:

تنشأ زوائد أعضاء التناسل الخارجية الموجودة بالحشرة الكاملة (آلة وضع البيض في الأنثى وآلة السفاد في الذكر) من ثخانات هيودرمية (Hypodermal thickenings) موجودة فوق استرنات الحلقتين البطنيتين الثامنة والتاسعة في اليرقة في حالة الأنثى وفوق استرنة الحلقة التاسعة فقط في اليرقة في حالة الذكر.

أما أجهزة التناسل الداخلية فتنشأ من براعم تناسلية Gonads تظهر في اليرقة (شكل ١٤٣ ب) ومن هذه البراعم والخيوط Cords المتصلة بها تنشأ المبايض وقنواتها الجانبية والمشاركة في حالة الأنثى أو الخصى والأوعية الناقلة وحوصلاتها المنوية في حالة الذكر.


وبخصوص قناة المهبل وما تحمله من غدد زائدة وقابلة منوية في حالة الأنثى أو القناة القاذفة وغدها الزائدة في حالة الذكر فتنشأ كلها كإنبعاجات للدخول من جدار الجسم وذلك أثناء طورى اليرقة والعذراء.

الثموى الذى قد يحدث بعد إنتهاء عملية التطور

Postmetamorphic Development

ولو أن القاعدة هى ألا تنسلخ الحشرة الكاملة في الحشرات ناقصة وكاملة التطور Pterygota إلا أن العادة أن تستمر بعض الأنسجة في الثموى بعد خروج الحشرة الكاملة من العذراء أو من الحورية. فالتلون وصلابة جدار الجسم لا يكتملان إلا بعد مرور فترة من خروج الحشرة الكاملة. وفي أغلب الحشرات الكاملة تحتاج الأعضاء والغدد التناسلية بعض الوقت للوصول إلى حجمها النهائى لكى تصبح نشطة.

وفي قليل من الحشرات الكاملة يصحب اكتمال نضج الأعضاء التناسلية تغيرات ظاهرة، ففي التمل الأبيض مثلاً تصحب هذه الظاهرة سقوط الأجنحة وإندثار عضلات الفكوك العليا وعضلات الصدر. وتكون أيضاً ظاهرة سقوط الأجنحة وإندثار عضلات الصدر مصاحبة للوصول طور الحشرة الكاملة إلى النضوج الجنسى في التمل العادى (Fam. Formicidae) وفي أنواع البرغش (رتبة الذباب)، كما يصحب ظاهرة إندثار عضلات الصدر في بعض أنواع المن والبعوض بلوغ النضوج الجنسى في الحشرة الكاملة التى تفقد عندئذ القدرة على الطيران.



شكل (١٤٤) : تطور عضل في ذبابة Calliphora .

- (أ) طور اليرقة .
- (ب) ابتداء التطور أثناء نهاية طور اليرقة .
- (ج) الإنقسام المباشر لنويات الحشرة الكاملة إلى سلاسل متصلة أثناء طور العذراء .
- (د) إنقسام العضل إلى ألياف عضلية منفصلة أثناء طور العذراء .
- (هـ) آخر مرحلة لمراحل تكوين العضلة أثناء للحشرة الكاملة أثناء طور العذراء .

ومن الظواهر التي تصاحب ظاهرة النضوج الجنسي في بعض أنواع البراغيث والحشرات القشرية وملكات الحمل الأبيض وبعض أنواع الذباب والخنفسا كبر المبايض وتضخمها أو تضخم القناة الهضمية .

وتتغير بعض الحشرات كثيراً في الشكل بعد بلوغها طور الحشرة الكاملة كما في إناث حشرة Aoscdireron (رتبة الذباب) إذ بعد خروج الحشرة الكاملة من العذراء تدفن الذبابة نفسها في جرح تحدثه بأجزاء فمها في جسم عائلها (الوطواط) ثم لا تلبث أن تسقط أرجلها وأجنحتها وتنمو ثنية من سطح بطنها الخارجى للأمام لتحيط بجسم الحشرة .

الباب الخامس عشر

الحشرات والبيئة

Insects and the Environment

تتأثر حياة الكائنات الحية عموماً والحشرات خصوصاً بالبيئات التى تعيش فيها . وبيئة أى كائن حى هى عبارة عن مجموعة العوامل الجوية والجغرافية والتربة (أى المتعلقة بالتربة) والغذائية والإحيائية (ولاسيما الأعداء الطبيعية) التى تكتنفه وتحيط به وتؤثر كثيراً على نواحي نشاطه وحيويته وعلى مدى تكاثره وإنتشاره (انظر الصواف وآخرون ١٩٧٢).

والعلم الذى يبحث فى العلاقات المعيشية الجارية بين الكائنات الحية وبين عوامل بيئاتها وما يترتب على ذلك من تصرفات وأحداث يطلق عليه علم البيئة أو الإيكولوجى (Ecology) . وينقسم علم البيئة هذا إلى قسمين رئيسيين هما :

١ — علم البيئة الذاتى أو الفردى : Autecology

وهو مختص بدراسة تأثير عامل أو أكثر من عوامل إحدى البيئات على نوع واحد أو فرد واحد فقط بالذات من الكائنات الحية التى تعيش فيها ، ومن أمثلة ذلك دراسة تأثير درجة الحرارة أو درجة الرطوبة أو كليهما معاً على عدد وحيوية البيض الذى تضعه أنثى إحدى الحشرات وعلى مايلى ذلك من أطوار النمو المختلفة .

٢ — علم البيئة الجماعى أو الإجمالى : Synecology

وهو مختص بتأثير عامل أو أكثر من عوامل إحدى البيئات على جميع الجاليات (Communities) أو الجماعات (Associations) من الكائنات الحية التى تشترك فى المعيشة فيها وعلى علاقاتها بعضها ببعض .

العوامل المؤثرة فى حياة الحشرات وحيويتها وتكاثرها وإنتشارها :

تنقسم العوامل التى تلعب دوراً هاماً فى التأثير على حياة كل حشرة ومقدار أعدادها فى الطبيعة إلى قسمين رئيسيين وهما :

أولاً : عوامل داخلية خاصة بالحشرة نفسها ، وهى وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء

وتختلف من حشرة إلى أخرى ولكنها تعمل جاهدة على إكثار أعداد الحشرة إلى الحد الذى يضمن على الأقل بقاء نوعها. وتعرف هذه بعوامل الكفاءة الحيوية (Biotic potential factors).

ثانياً : عوامل خارجية متعلقة بمكونات البيئة التى تعيش فيها الحشرة وتعرف بالعوامل البيئية (Environmental factors)، وهى ليست ثابتة على مدار السنة بل تتغير بتغير فصولها كما وتتغير أيضاً من سنة إلى أخرى، فإن تصادف وكانت هذه العوامل البيئية ملائمة للحشرة لازدادت حيويتها وكثرت أعدادها ولشاع أثرها من ضرر أو نفع، والعكس بالعكس.

أولاً - الكفاءة الحيوية : Biotic potential

الكفاءة الحيوية لأى حشرة هى عبارة عن مجموع قدرتها على إنتاج ذرية من الصغار (وهو ما يعبر عنه بالكفاءة التناسلية) وقدرة تلك الصغار على الكفاح في معترك الحياة من أجل البقاء والوصول إلى طور البلوغ (وهو ما يطلق عليه الكفاءة البقائية).

(أ) الكفاءة التناسلية : Reproductive potential

الكفاءة التناسلية لكل حشرة أى مقدار ما تنتجه أنثاها من الصغار تتوقف على العوامل الآتية :

(١) عدد البيض الذى تنتجه كل أنثى :

يختلف عدد ما تضعه إناث الحشرات من بيض باختلاف أنواعها، فهناك حشرات تضع الأنثى فيها أعداداً كبيرة من البيض، مثل دودة ورق القطن التى قد يزيد ما تضعه الأنثى الواحدة منها على ألف بيضة. ومثل ملكة النمل الأبيض التى تضع إناثها أعداداً بسيطة نسبياً من البيض، مثل أنثى سوسة الخزن فهى تضع في مدة حياتها حوالى ٧٠ بيضة فقط. وبديهي أنه كلما كثر عدد البيض الذى بمقدور أنثى حشرة أن تضعه كلما ازدادت أعداد هذه الحشرة بسرعة أعظم.

(٢) نسبة الفقس :

من الواضح أن البيض الذى تضعه أنثى حشرة لا يفقس بأجمعه بل تفقس منه نسبة خاصة محدودة تختلف باختلاف أنواع الحشرات، فمثلاً تصل نسبة الفقس في دودة ورق القطن إلى حوالى ٨٠٪ بينما في الترس (Thrips) فلا تزيد عن ٢٠٪. وبديهي أيضاً أنه كلما ارتفعت نسبة الفقس كلما ازدادت أعداد الحشرة بسرعة أعظم، كما وأن خاصية

تعدد الأجنة (Polyembryony) المشاهدة في بعض أنواع الحشرات ولا سيما بعض الحشرات المتطفلة من رتبة غشائية الأجنحة لا شك تعمل على رفع كفاءتها التناسلية وذلك بإنجاب أكثر من جنين صغير واحد من كل بيضة واحدة بل وقد يخرج من كل بيضة بضعة مئات أو حتى آلاف من الأجنة.

(٣أ) مدة الجيل :

المدة التي يستغرقها نمو الحشرة من وقت وضع البيض حتى خروج الحشرات الكاملة وهي التي تعرف بمدة الجيل تختلف باختلاف أنواع الحشرات ففي بعضها تكون طويلة تصل إلى عدة سنوات وفي بعض آخر تكون قصيرة فقد لا تزيد عن بضعة أيام ويدبى أيضاً أنه كلما قصرت هذه المدة كلما تعددت أجيال الحشرة في السنة الواحدة وبالتالي ازدادت أعدادها بسرعة أعظم، والعكس بالعكس. فمثلاً لبعض أنواع المن أكثر من خمسين جيلاً في السنة، لأن الجيل الواحد يتم في حوالى أسبوع، وللدودة ورق القطن سبعة أجيال في العام، وللدودة القارضة خمسة أجيال سنوياً، بينما يطول الجيل في بعض أنواع الجعال فالجيل الواحد يمتد ليستغرق حوالى ثلاثة سنوات، وفي حشرة السايكادا يتم الجيل في مدة قد تصل إلى ١٧ سنة في بعض أنواعها وإلى خمسة أعوام في أنواع أخرى منها.

(٤أ) النسبة الجنسية : Sex-ratio

النسبة بين عدد الإناث إلى عدد الذكور في الحشرات الكاملة الناتجة في كل جيل من أجيال الحشرة وهي التي يعبر عنها بالنسبة الجنسية تختلف أيضاً باختلاف أنواع الحشرات، ومن البدبى أنه كلما ارتفعت هذه النسبة كلما إزدادت الكفاءة التناسلية للحشرة وكثرت أعدادها بسرعة أعظم. وقد لوحظ أن النسبة الجنسية في الغالبية العظمى من الحشرات تقرب من ١ : ١، ولكنها في الأقلية الباقية تختلف عن ذلك. فمثلاً في الدبابير المنشارية ينتج من كل مائة بيضة وضعتها الأنثى الأم ٩٦ أنثى مقابل ٤ ذكور فقط، كما وأنه في بعض الحشرات التي تتولد بكرىاً قد لا تنتج ذكور قط أو تتواجد الذكور بنسبة قليلة جداً وتكون غالبية التناج من الإناث كما في بعض أنواع المن وبالتالي تزداد أعداد هذه الحشرات بسرعة فائقة.

ب — الكفاءة البقائية : Survival potential

الكفاءة البقائية هي مقدرة الصغار الناجمة عن الكفاءة التناسلية على الكفاح في سبيل العيش والبقاء والتغلب على ما يصادفها في بيئتها من صعوبات حتى يكتمل نموها. وهي

تختلف أيضاً باختلاف أنواع الحشرات فتتوقف على عاملين معينين هما الكفاءة الناتجة عن التغذية والكفاءة الوقائية :

(ب١) الكفاءة الناتجة عن التغذية : Nutritive potential

وهي مقدرة كل حشرة على إستخدام ما يوجد في بيئتها من مواد غذائية والإنتفاع منها بتحويلها إلى غذاء صالح لها . فلكي تستمر صغار الحشرة في البقاء حتى تستكمل دورة حياتها فتصل إلى الطور الكامل القادر على إستئناف التناسل يلزم أن تكون لديها قدرة على تخليق أو تدبير المركبات اللازمة لتغذيتها من مختلف المواد الغذائية المتاحة لها في البيئة التي تعيش فيها ، ولا شك أن مثل هذه الصغار تكون أقدر على البقاء من صغار حشرة أخرى لا تستطيع الإستفادة إلا من مواد غذائية جاهزة . كما وأن إنعدام المواد الغذائية الصالحة البيئة أو عدم المقدرة على الإستنتفاع بالمواد الغذائية المتوفرة بتلك البيئة لا شك سوف يؤدي بالحشرة إلى الموت جوعاً ثم الإنقراض . فالحشرات التي تتغذى بإمتصاص دم الحيوانات مثلاً ينبغي أن يتوفر لها في مكان معيشتها العائل المناسب وأن تتمكن من الوصول إلى ذلك العائل بسهولة لكي تتغذى منه . ولا ريب أيضاً في أن الحشرات التي من عاداتها أن تتغذى على عدة عوائل (Polyphagous) مثل دودة ورق القطن (*Spodoptera littoralis*) أو التي يمكنها أن تعود على عائل جديد بسهولة في وقت قصير إذا لم يتوفر عائلها الأصلي تكون أقدر على البقاء من الحشرات وحيدة العائل (Monophagous) التي لا يمكنها التغذية على غير عائلها الخاص . كما وأن بعض الحشرات تزيد من كفاءتها الغذائية بفضل ما تدخله في أجسامها من كائنات دقيقة لكي تتبادل معها المنفعة ، ومن أمثلة ذلك حشرات التمل الأبيض التي تتغذى على الأخشاب مع أنها لا تستطيع بنفسها هضم السليولوز غير أن جهازها الهضمي يحتوي على كائنات دقيقة بروتوزوية أو بكتيرية تقوم بتحليل سليولوز الخشب وتحويله إلى مواد أقل تعقيداً يستطيع التمل الأبيض أن يهضمها ويمتصها ويستفيد منها كغذاء . ولولا وجود تلك الكائنات الدقيقة لمات التمل الأبيض جوعاً على الرغم من توفر الخشب .

(ب٢) الكفاءة الوقائية : Protective potential

فمن أهم العوامل المؤثرة على كفاءة الحشرات في البقاء قدرتها على حماية أنفسها من العوامل البيئية المناوئة لها ولا سيما ضد أعدائها الطبيعية من طفيليات أو مفترسات حشرية كانت أم حيوانية ، وتعرف تلك القدرة بالكفاءة الوقائية وهي وراثية وتختلف أيضاً باختلاف أنواع الحشرات فلكل نوع وسيلته الخاصة في ذلك . فهناك حشرات مثل بعض أنواع البق تفرز روائح كريهة تعمل على طرد مفترساتها وأعدائها الأخرى . وهناك

أيضاً حشرات كالنحل والدبابير مجهزة بآلات لسع تدافع بها عن أنفسها ضد الأعداء . وهناك كذلك حشرات تحمل أجسامها أشواكاً وشعرات غدية تفرز سوائل لاذعة تسبب آلاماً لمن يلامسها كبعض يرقات حرشفية الأجنحة . كما وأن بعض الحشرات القشرية الرخوة الأجسام تقى أنفسها بغطاء شمعى سميك تفرزه فوقها وتعيش تحته طيلة حياتها فيحميها من الأعداء ومن المؤثرات الجوية . وبعض الحشرات الجماعية المعيشة مثل النمل الأبيض تخصص للدفاع عن مستعمراتها طاقماً خاصاً من الأفراد تعرف بالجنود أو العساكر (Soldiers) وهى مزودة بفكوك علوية حادة قوية تردع بها المهاجمين والدخلاء ، وأنواع أخرى من الحشرات كالحفار (كلب البحر) تعيش بداخل عشوش أو أنفاق بالتربة يصعب على أعدائها الوصول إليها فيها . كما وتحمي كثير من الحشرات أنفسها ضد أعدائها عن طريق إمتلاكها لظاهرة التلون الوقائى (Protective colouration) إذ تكون ألوان هذه الحشرات محاكية للون أجزاء من البيئة التى تعيش فوقها وبذلك تصبح فى أمان من اهتداء الأعداء إليها . كما وأنه حشرات أخرى ضعيفة الحيلة ومعرضة لهجوم كثير من الأعداء تقى أنفسها بمحاكاتها فى اللون والشكل لحشرات أخرى قوية ومجهزة بخصائص ووسائل دفاعية وبذلك تهرب من هجوم الأعداء بالتبعية ، فمثلا بعض أنواع الذباب تحاكي النحل فى لونه وشكله ، وتعرف هذه الخاصية بالمحاكاة الاحتمائية (Protective mimicry) .

هذا والملاحظ فى الطبيعة أن هناك نوعاً من التوازن بين الكفاءة التناسلية والكفاءة البقائية فى مختلف الحشرات ، فكلما كانت الكفاءة البقائية فى الحشرة ضعيفة كلما كانت كفاءتها التناسلية مرتفعة لكى تنجب أعداداً كبيرة من الأفراد فتعوض الفاقد من الذرية نتيجة ضعف الكفاءة البقائية ، والعكس بالعكس فالحشرة التى كفاءتها البقائية عالية تكون كفاءتها التناسلية واطمة لكى لا تنتج نسلأ كثيراً يطفى على ماعده .

ثانياً : العوامل البيئية : Environmental factors

تعيش الحشرات فى بيئات متباينة تتضمن عوامل مختلفة تؤثر تأثيراً كبيراً على حياتها وحيويتها وتكاثرها ومدى إنتشارها . فعوامل البيئة متغيرة تختلف باختلاف المكان والزمان ، وقد تكون ملائمة لمعيشة الحشرات فتؤدى إلى زيادة أعدادها ، أو قد تكون مناهضة لها فعمل عندئذ كعامل مضاد لتكاثر الحشرات وتقضى على أعداد كبيرة من أفرادها وتعرف فى هذه الحالة بالمقاومة البيئية (Environmental resistance) .

فأهم العوامل البيئية التى تؤثر على حياة الحشرات ما يأتى :

(أ) العوامل الجوية : Climatic factors

وأهمها الحرارة والرطوبة والضوء والرياح والأمطار والضغط الجوى :

(١) درجة الحرارة : Temperature

فالحشرات من الحيوانات ذات الدم البارد أى التى تتكيف درجة حرارة أجسامها تبعاً لدرجة حرارة الوسط الذى تعيش فيه، فلو ارتفعت درجة حرارة البيئة لارتفعت معها درجة حرارة أجسام ما يعيش فيها من حشرات وإزدادت على أثر ذلك حيوية تلك الحشرات كما يزداد عدد البيض الذى تضعه إنائها وتقل المدة اللازمة لنمو أطوارها المختلفة، والعكس بالعكس، وللحرارة فى تأثيرها على الحشرات مراحل مختلفة كالتالى :

١ — لكل نوع من أنواع الحشرات بل لكل طور من أطوار النوع الواحد مجالاً حرارياً معيناً يلائمه فتمارس فيه الأفراد أوجه نشاطها المختلفة وعملياتها الحيوية على خير وجه، ويطلق على هذا المجال الحرارى الملائم منطقة النشاط الحرارى (Zone of heat activity) أو منطقة درجات الحرارة المواتية (Zone of effective temperatures)، وقد لوحظ بصفة عامة أن هذه المنطقة المذكورة تقع ما بين درجتى 52° — 32° مئوية وفى داخل ذلك المجال المذكورة توجد درجة حرارة واحدة معينة خاصة بكل نوع من أنواع الحشرات وعندها يبلغ نشاط الحشرة أقصاه وتضع أنثاها أكبر عدد من البيض وتقل فترة نمو أطوارها إلى أقصر مدة ولذا يطلق عليها درجة الحرارة المثلى (Optimum temperature). كما وأن الحد الأعلى لمنطقة النشاط الحرارى يسمى درجة الحرارة المواتية القصوى (Maximam effective temperature)، بينما حدها الأدنى فيسمى درجة الحرارة المواتية الدنيا (Minimum effective temperature) أو عتبة النمو (Threshold of development).

٢ — إذا ارتفعت درجة حرارة البيئة عن الحد الأعلى لمنطقة النشاط الحرارى للحشرة فإن نشاطها يقل تدريجياً ثم تصاب بنوع من التخدر أو الغشية المؤقتة لدخولها مجالاً حرارياً يدعى منطقة الخمول الحرارى (Zone of heat inactivity) أو منطقة النوم الحرارى (Zone of heat dormancy) ويتمثل ذلك فى حالة البيات الصيفى (Aestivation) التى تدخلها بعض الحشرات فى فصل الصيف، ومن خصائص هذه المنطقة أنه إذا عادت درجة الحرارة إلى الانخفاض إلى ما دون الحد الأعلى لمنطقة النشاط الحرارى فإن الحشرة تستعيد نشاطها كاملاً ثانية.

٣ — إذا استمرت درجة حرارة البيئة في الارتفاع فوصلت إلى ما فوق الحد الأعلى لمنطقة الحمول أو النوم الحرارى التى تصاب فيها الحشرة بغشية حرارة مؤقتة فإن الحشرة تدخل حينئذ في منطقة تدعى منطقة الحرارة العالية المميتة (Zone of fatal high temperature) حيث يتوقف نشاطها تماماً وينتهى الأمر بموتها إن عاجلاً أو آجلاً حتى ولو عادت درجة الحرارة إلى الإنخفاض عن حدود تلك المنطقة قبل حدوث الوفاة وذلك لسريان تغيرات كيميائية وفسيولوجية بالأعضاء والأنسجة الجسمية يترتب عليها ألا تستطيع العودة إلى حالتها الأصلية مطلقاً بعد ذلك . ثم في أقصى حدود منطقة الحرارة العالية المميتة يوجد حد أعلى يسمى درجة الحرارة المميتة القصوى (Maximum fatal temperature) وهى التى تموت عندها الحشرة فجأة أو بعد برهة وجيزة جداً وقد لوحظ أنها تبلغ بالنسبة لكثير من الحشرات حوالى ٦٠ ° مئوية .

٤ — إذا إنخفضت درجة الحرارة من حول الحشرة عن الحد الأدنى لمنطقة النشاط الحرارى (أى عتبة النمو) فإن نشاط الحشرة يقل كذلك تدريجياً ثم تصاب بنوع من التخدر أو الغشية المؤقتة لدخولها منطقة يطلق عليها منطقة الحمول نتيجة البرودة (Zone of cold inactivity) أو منطقة الغشية نتيجة البرودة المؤقتة (Zone of temporary cold stuper) ويتمثل ذلك في حالة البيات الشتوى (Hibernation) التى تدخلها كثير من الحشرات شتاء، وتتميز منطقة الحمول نتيجة البرودة هذه بأن الحشرة تستعيد نشاطها كاملاً مرة أخرى إذا عادت درجة الحرارة إلى الإرتفاع إلى ما فوق عتبة النمو .

٥ — إذا استمرت درجة الحرارة في الإنخفاض عن الحد الأدنى لمنطقة الحمول نتيجة البرودة فإن الحشرة تدخل حينئذ في منطقة تدعى منطقة الحرارة المنخفضة المميتة (Zone of fatal low temperature) حيث تصاب بتوقف كلى في أوجه نشاطها ويكن مآلها حتماً إلى الموت فلا يمكنها إستعادة حالتها الطبيعية حتى لو عادت درجة الحرارة فارتفعت عن حدود تلك المنطقة قبل حدوث الوفاة . ثم إذا استمر إنخفاض الحرارة فجاوز الحد الأدنى لمنطقة الحرارة المنخفضة المميتة فإن الحشرة تموت عندئذ في الحال أو بعد برهة وجيزة على أكثر تقدير لأنها تكون قد مرت بدرجة حرارة تدعى درجة الحرارة الدنيا المميتة (Minimum fatal temperature) والتى لوحظ أنها تصل إلى حوالى — ٥٠ ° مئوية (أى درجة ٥٠ تحت الصفر المئوى) بالنسبة لبعض الحشرات .

٢أ) درجة الرطوبة : Moisture or Humidity

تتأثر الحشرات وقدرتها على التكاثر والنمو تأثراً كبيراً أيضاً بكمية الرطوبة الموجودة في الوسط الذي تعيش فيه سواء كان تربة أم هواء أم مادة غذائية، ذلك لأن رطوبة الوسط تؤثر على التوازن المائي في أجسام الحشرات.

والمجالات التي تؤثر بواسطتها الرطوبة على الحشرات تشبه إلى حد كبير مجالات الحرارة. فيوجد لكل حشرة مجال يدعى **منطقة الرطوبة المؤاتية** (Zone of effective humidity)، ثم داخل هذا المجال المذكور توجد درجة رطوبة معينة يكون نشاط الحشرة عندها على أحسن حال وتضع الإناث أكبر عدد من البيض وتقل فترات نمو الأطوار المختلفة إلى أدنى حد، ويطلق على تلك الدرجة درجة الرطوبة المثلى (Optimum humidity)، ثم إذا ارتفعت درجة الرطوبة عن الحد الأعلى لمنطقة الرطوبة المؤاتية لدخلت الحشرة عندئذ في منطقة تدعى **منطقة الرطوبة العالية المعوقة** (Zone of ineffective low humidity) حيث تستمر الحشرة في نشاطها ولكن بمعدلات أقل بمعنى أنها تكون أقل نشاطاً وحيوية. ثم إذا ارتفعت درجة الرطوبة عن الحد الأدنى لمنطقة الرطوبة العالية المعوقة لتتوقف نشاط الحشرة تماماً ثم تموت في النهاية لأنها تكون قد دخلت منطقة تدعى **منطقة الرطوبة العالية المميتة** (Zone of fatal high humidity). وأما إذا انخفضت الرطوبة عن الحد الأدنى لمنطقة الرطوبة المؤاتية فإن الحشرة تدخل عندئذ في منطقة تدعى **منطقة الرطوبة المنخفضة المعوقة** (Zone of ineffective low humidity) حيث تستمر الحشرات في القيام بأوجه نشاطها ولكن بمعدلات أقل. ثم إذا استمرت الرطوبة في الانخفاض عن الحد الأدنى لمنطقة الرطوبة المنخفضة المعوقة بحيث يصبح الجو المحيط بالحشرة جافاً تقريباً فإن النشاط يتوقف ثم تموت الحشرة لدخولها منطقة تسمى **منطقة الجفاف القاتل** (Zone of fatal dryness).

والواقع أنه من الناحية العملية يصعب الفصل بين تأثير كل من الحرارة والرطوبة على الحشرات نظراً لما هناك من إرتباط وثيق بين هذه العاملين في الطبيعة. فالرطوبة النسبية في الجو تتوقف إلى حد كبير على درجة الحرارة كما وأن معدل تبخر الماء من أجسام الحشرات مرتبط بصفة مباشرة بدرجة الحرارة وبصفة غير مباشرة بسرعة الرياح التي تعتمد على الضغط الجوي الذي يتأثر هو الآخر بالحرارة. ففي الجو الحار الجاف تكون درجة الحرارة العالية المميتة لإحدى الحشرات أقل منها في الجو الحار الرطب لأن الحشرة في الحالة الأولى تعاني من الجفاف علاوة على معاناتها من درجة الحرارة العالية، فمثلاً بالنسبة لسوسة الخزن تكون درجة ٥٢٦ مئوية ملائمة لحياتها عند توفر الرطوبة المناسبة غير أن هذه الدرجة مميتة لها تحت ظروف الجفاف.

(أ) الضوء والرياح والأمطار والضغط الجوي : فهذه كلها عوامل بيئية جوية لها تأثير ملموس على حياة الحشرات ولكن ليس بدرجة تأثير العاملين السابقين (الحرارة والرطوبة) وحتى هذه العوامل المذكورة فتتوقف إلى حد ما على درجة حرارة البيئة .

ب — عوامل التربة : Edaphic factors

فنوع التربة وتركيبها الطبيعي والكيمائى ومقدار ما تحتويه من رطوبة تؤثر تأثيراً ملحوظاً مباشراً على ما يستطيع أن يعيش فيها من أنواع الحشرات ، كما أن نوع التربة يؤثر على ما يمكن أن ينمو فيها من أنواع النباتات وبالتالي يؤثر ذلك بطريق غير مباشر على حياة الحشرات المتغذية على تلك النباتات .

ج — العوامل الجغرافية : Geographical factors

وهى تشمل الموانع الطبيعية كالجبال الشاهقة والأنهار أو البحار الواسعة والصحارى الشاسعة التى تقف حائلاً دون تسرب الحشرات من بقعة إلى أخرى .

د — العوامل البيولوجية أو الحيوية : Biological or biotic factors

وهى تشمل الغذاء والأعداء الإحيائية الطبيعية :

(د) عامل الغذاء : (Trophic factors)

فمن العوامل البيئية التى تؤثر فى حياة الحشرات وتكاثرها توفر النوع الصالح من المواد الغذائية أو العوائل فى بيئاتها . وإنعدام المادة الغذائية المناسبة أو العائل المناسب أو قلة كمية ما يتوفر من أحدهما فى البيئة لا بد وأن يؤدى إلى قلة أعداد الحشرات أو إلى إنقراضها تماماً . فكثيراً ما يشاهد فى الطبيعة أنه على الرغم من صلاحية جميع العوامل البيئية الأخرى لحياة حشرة ما فإن مجرد عدم توفر عائلها أو مادتها الغذائية المناسبة يكون وحده سبباً فى عدم تواجدها فى بيئة خاصة ، ومن أمثلة ذلك حشرة البلاستوفاجا (دبور التين البرى) فهى ليست موجودة بمجمهورية مصر العربية مثلاً لسبب وحيد هو غياب عائلها الأوحده وهو التين البرى . كما وأن توفر المادة الغذائية الصالحة بكثرة وتواجدها باستمرار طوال أوقات السنة لا بد وأن يؤدى إلى سرعة إزدياد أعداد الحشرات وتحولها إلى آفات اقتصادية كما هو الحال مع دودة ورق القطن بمجمهورية مصر العربية حيث الزراعة الكثيفة بمحاصيل متتالية طوال العام وفرت العوائل الصالحة لتغذيتها باستمرار فكان لذلك أثراً أساسياً فى إنتشارها إلى الحد الذى أصبحت معه من الآفات الزراعية الوحيدة الضرر .

(٢٥) الأعداد الإحيائية الطبيعية : (Natural enemies)

تعتبر الأعداء الحيوية الطبيعية للحشرات من أهم العوامل البيئية التي تؤثر أثراً بالغاً على مبلغ تكاثرها وانتشارها. وهي إما مفترسات (Predators) كالأسماك والضفادع والزواحف والطيور والعناكب والحشرات المفترسة غيرها من أنواع الخنافس مثل الكالوسوما (Calosoma spp.) وأسد المن (Chrysopa valgaris) أو طفيليات (Parasites) كالحشرات المتطفلة على حشرات غيرها والتابعة لرتبتي غشائية الأجنحة وذات الجناحين مثل ذبابة التاكاينا (Tachina larvarum) وحشرة البمبلا (Pimpla roborator) أو كائنات دقيقة مسببة للأمراض (Pathogenic organisms) كأ أنواع خاصة من الفطر والبكتريا والبروتوزوا والفيروس. ففي البيئات الطبيعية التي لم تمتد يد الإنسان إليها بالتغيير والتبديل توجد للحشرات وخصوصاً الضارة منها أعداد طبيعية من المفترسات والطفيليات التي تهلك الكثير منها كما وتصاب بالأمراض الفطرية والبكتيرية والبروتوزوية والفيروسية التي تقضي على كثير من أفرادها خصوصاً وأن الظروف البيئية غالباً ما تكون ملائمة لتفشي هذه الأمراض في مواسم معينة من العام. فكلما ازدادت أعداد حشرة في البيئة الطبيعية الأصلية ازدادت تبعاً لذلك أعداد أعدائها الطبيعية فتقضي على كثير من أفرادها وبذا تعيدها ثانية إلى حالتها العددية الإبتدائية وهكذا يكون هناك باستمرار حالة من التوازن بين أعداد الحشرات وبين أعداد أعدائها الطبيعية.

التوازن الحيوى : Biotic equilibrium

تتضمن حياة الحشرة صراعاً مستمراً بين كفاءتها الحيوية وقوة المقاومة البيئية، فالكفاءة الحيوية للحشرة بعواملها المختلفة تعمل جاهدة على إزدياد أعدادها، بينما قوة المقاومة البيئية بمختلف عواملها فتقوم بالقضاء على كثير من أفراد الذرية الناتجة. ولا ريب في أنه لو تركت تلك الكفاءة الحيوية لشأنها بدون أن تتصدى لها قوة المقاومة البيئية لامتأ العالم أجمع بالحشرات، فمثلاً إذا فرض أن أنثى واحدة ملقحة من الذباب بدأت تناسلها في شهر إبريل ثم عاش نسلها بدون أن يفقد منه شيء لبلغت الذرية الناتجة عنها في شهر أغسطس من السنة نفسها عدداً يكفى لتغطية كل سطح الكرة الأرضية، ولكن هذا لا يحدث في الواقع في الطبيعة لأن العوامل البيئية المختلفة غالباً ما تكون غير ملائمة لتكاثر الحشرات فتعمل على قتل أعداد كبيرة من أفراد ذريتها. ففي البيئات الطبيعية التي لم يتدخل الإنسان في تغيير معالمها مثل الغابات والأحراش يلاحظ أن أعداد الحشرات تبقى ثابتة باستمرار عند حد معقول معين فلا تزداد عنه، ويرجع ذلك إلى أن قوة المقاومة تكون دائماً مساوية أو معادلة للكفاءة الحيوية للحشرات وهي حالة تعرف بحالة التوازن الحيوى

حيث تظل أعداد مختلف الحشرات ثابتة فلا تزداد إلى الحد الذي تصير معه آفات ، ولكن لو حدث في وقت ما أن ضعفت قوة المقاومة البيئية عن طريق ضعف أحد عواملها فإن الكفاءة الحيوية تكون لها عندئذ الغلبة وبالتالي ينكسر ذلك التوازن الحيوى فتأخذ الحشرة في الإزدياد جيلاً بعد جيل متحولة آنشد إلى آفة ضارة يجب مكافحتها بوسائل صناعية من شأنها تقوية عوامل المقاومة البيئية إلى الحد الذى يمكنها من إرجاع حالة التوازن الحيوى ثانية .

الباب السادس عشر

تصنيف الحشرات وتسميتها

Insect Classification and Nomenclature

المخلوقات الحيوانية أو النباتية عديدة جداً، وحافضة الإنسان محدودة الطاقة، فلكي يسهل على الذاكرة البشرية إستيعاب كل ذلك العدد الهائل من الكائنات المتباينة الأشكال كان ولا بد من ترتيبها في مجاميع، وقد أطلق على هذا الترتيب لفظ التصنيف أو التقسيم (Classification or Taxonomy)، وعلاوة على ذلك فالتصنيف أيضاً وسيلة لغاية علمية هامة وهي إظهار التشابهات التي تجمع المتقارب والإختلافات التي تفرق المتباين من الكائنات مما يساعد الثقة في تتبع خطى تسلسل الكائنات وإقتفاء آثار خطوات نشوئها.

وللتصنيف أو التقسيم هيكل عام يقوم عليه بناؤه ويتلخص في أن الأفراد المتماثلة في الصفات تجمع معاً في مجموعة واحدة تسمى النوع (Species)، والأنواع (Species) المتقاربة تجمع في جنس (Genus) واحد، والأجناس (Genera) التي تمت إلى بعضها بصلة معينة تجمع في عائلة أو فصيلة (Family) واحدة، والعائلات (Families) ذوات القرى تجمع في رتبة (Order) واحدة، والرتب (Orders) المتشابهة تجمع في طائفة أو صف أو (Class) واحد، والصفوف (Classes) المتناسبة تجمع في قبيلة أو شعبة (Phylum) واحدة تدعى المملكة النباتية (Plant Kingdom) كما وتجمع كل قبائل الحيوانات في مملكة أخرى تدعى المملكة الحيوانية (Animal Kingdom) (انظر الصواف وآخرون، ١٩٧٢ وإمز، ١٩٦٣).

ففي الحيوانات حين يختلف ضربان منها عن بعضهما في صفة أو صفات تركيبية معينة واضحة ولكنها ليست برئيسية نسبياً فيقال عندئذ أنهما من نوعين مختلفين، وذلك على شرط أن تكون تلك الفروقات التركيبية بمثابة دلائل على وجود مانع يحول دون إمكانية التزاوج المتبادل (Interbreeding) بين هذين الضربين المذكورين. والأنواع تجمع معاً في أجناس حيث الجنس الواحد عبارة عن جملة أنواع متحلية بصفات مشتركة تدل على كونها وثيقة القرى.

والأجناس بدورها توضع في مراتب أعلى تدعى العائلات حيث الفصيلة الواحدة تشتمل على جملة أجناس متحلية جميعاً بنفس الصفات المعينة الهامة. والعائلات تجمع معاً في رتب حيث الرتبة الواحدة تتضمن جميع تلك العائلات المتصفة بصفات مشتركة رئيسية يمكن بواسطتها الجمع بينها في مجموعة طبيعية واحدة. وعلى هذا المنوال بنفس الترتيب التصاعدي فإن الرتب المتشابهة في بعض الصفات تجمع معاً في نفس الصف، والصفوف تجمع معاً بناء على اشتراكها في صفات رئيسية في قبيلة واحدة والقبائل المختلفة من الحيوانات تجمع معاً في نفس المملكة وهي المملكة الحيوانية. وعلاوة على ذلك ففي تصنيف الحيوانات تستخدم مراتب أخرى واقعة فيما بين بعض تلك المراتب السابقة الرئيسية ومن أهمها ما يأتي:

- ١ — تحت العائلة (Subfamily) وهي تضم جملة أجناس تؤلف جزءاً فقط من تحت عائلة.
- ٢ — فوق العائلة (Superfamily) وهي عبارة عن مجموعة عائلات تصنع معاً مرتبة أصغر من رتبة.
- ٣ — الرتبة أى تحت الرتبة (Suborder) وهي تتضمن مجموعة من العائلات أو فوق العائلات تؤلف معاً جزءاً فقط من رتبة. ويكفى لتوضيح كل ذلك أن يذكر المثال الآتي عن حشرة فورميكا ريوفا لينيس (*Formica rufa* Linnaeus):

Species: <i>rufa</i>	النوع: ريوفا
Genus: <i>Formica</i>	الجنس: فورميكا
Subfamily: <i>Formicinae</i> <i>Formicinae</i>	تحت العائلة: فورميسيبي
Family: <i>Formicidae</i>	العائلة: فورميسيدي
Superfamily: <i>Formicoidea</i>	فوق العائلة: فورميسيويديا
Suborder: <i>Apocrita</i>	تحت الرتبة: ابوكريتا
Order: <i>Hymenoptera</i>	الرتبة: هايميئوبترا (غشائية الأجنحة)
Class: <i>Insecta</i>	الصف: انسكتا (الحشرات)
Phylum: <i>Arthropoda</i>	القبيلة: أرثروبودا (مفصليات الأرجل)
Kingdom: <i>Animalia</i>	المملكة: أنيماليا (الحيوانية)

وأولى الخطوات في تصنيف أى جماعة من الحيوانات هي إعطاؤها إسماء علمية (Scientific names)، وذلك تلافياً لتعدد الأسماء الدارجة المطلوقة على نفس الحيوان في مختلف البلدان والتي يتسبب عنها كثيراً من اللبس والحيرة والخطأ. والطريقة الشائعة

الإستخدام عالمياً للتسمية العلمية هي التسمية ذات الأسمين-Binomial Nomen culture) حيث يعطى كل نوع من الحيوانات اسماً مكوناً من كلمتين متتاليتين ، الكلمة الأولى هي اسم الجنس (Generic name) وتكتب بدايتها دائماً بحرف كبيرة Capital letter) والكلمة الثانية هي اسم النوع (Specific name) وتكتب بدايتها دائماً بحرف صغير حتى ولو كانت إسم علم. وغالباً ما يردف هذان الاسمان بلقب (أو بمختصر من لقب) المؤلف وهو الشخص الذى قام بوصف وتسمية ذلك النوع. وإذا أريد كتابة إسم الجنس فقط بدون إسم النوع فلا بد من أن يلحق باسم الجنس كلمة Species مكتوبة بصيغة مختصرة هي. sp. ، فمثلا Spodoptera sp تدل على نوع واحد من أنواع جنس Spodoptera ، وأما إذا أريد أن ينسب إلى الجنس أكثر من نوع واحد فيجب أن تلحق باسم الجنس الكلمة المختصرة spp. وهي صيغة الجمع للمختصر sp. ، فمثلاً Spodoptera spp. تدل على نوعين أو أكثر من جنس Spodoptera . والاسماء العلمية تطبع دائماً بحروف مائلة ما عدا اسم المؤلف فهو يكتب بالحروف العادية، وأما إذا كتب الاسم العلمى باليد أو بالآلة الكاتبة فيلزم تمييزه بأن يوضع تحته خط .

ولأجل توحيد النظام الذى يجب إتباعه فى تسمية الحيوانات بالمراتب المختلفة من التصنيف فقد اعتمدت لائحة لقواعد التسمية العلمية (Code of Rules of Nomenclature) منذ عام ١٩٠١ بناء على تصديق دولى من علماء الحيوان .

فقواعد التسمية العلمية تقضى بأن الاسماء العلمية للحيوانات لا بد وأن تكون كلمات لاتينية أو محولة إلى اللاتينية أو تعتبر وتعامل كأنها كذلك إذا لم تكن من أصل كلاسيكى عريق ، وأن يشكل اسم الفصيلة (العائلة) أو اسم الفصيلة (تحت العائلة) بإضافة اللاحقة «—يدى» (idae) أو اللاحقة «—بنى» (inae) على الترتيب إلى جذع اسم الجنس التخطى (type genus) ، ومثال ذلك فورميسيدي (Formicidae) وفورميسينى (Formicinae) من فورميكا (Formica) . ولم ينص على قواعد بالذات للأسماء الخاصة بالمراتب الأعلى من مرتبة العائلة . ولكن جرت العادة على أن يشكل اسم فوق العائلة بإضافة اللاحقة «—أويديا» (oidea) إلى جذع اسم الجنس التخطى ، ومن القواعد التى نص عليها أيضاً ما يأتى :

١ — أن يكون اسم الجنس عبارة عن موصوف (Substantive) فى صيغة المفرد الفاعل (Nominative singular) .

٢ — لا بد وأن يكون اسم النوع إما صفة (أى نعمت Adjective) متمشية نحواً مع اسم الجنس ومثال ذلك *Musca domestica* ، أو موصوف متناسق مع إسم الجنس ومثال ذلك *Stratiomys chamaeleon* . أو موصوف فى صيغة المضاف إليه (Genitive) ومثال ذلك *Psila rosae* ، كما وأنه عند استعمال أسماء جغرافية أو أسماء أشخاص كمسميات للنوع فيجب أن تصاغ أيضاً فى صورة المضاف إليه ومثال ذلك *Phormica terranova*, *Odontotermes horni*, *Paederus alfieri*.

٣ — إذا ذكر إسم المؤلف عقب إسم النوع فيكتب بدون علامة تعجب ومثال ذلك :
Tabanus rusticus Linn.

٤ — إذا ما نقل نوع إلى جنس غير الجنس الذى كان موضوعاً فيه أصلاً فحينئذ يذكر اسم مؤلف ذلك النوع بين قوسين ، ومثال ذلك : *Blatta lapponica* Linn. قد أصبح (*Ectobius lapponicus* (Linn.)) مع مراعاة أن يكون اسم النوع متمشياً نحوياً مع الاسم الجنسى الجديد كما هو واضح فى المثل المذكور .

٥ — الاسم الصحيح أى السارى المفعول (Valid name) لنوع أو جنس هو ذلك الاسم الذى لقب به أولاً على نحو سليم ، وعلى ألا يعتبر صحيحاً ولا سارى المفعول أى اسم قد نشر قبل صدور الطبعة العاشرة من كتاب «نظام الطبيعة» (*Systema Naturae*) ، وعلى أن يطلق على الاسم النوعى أو الجنس الذى استبدل بسبب كونه غير صحيح (Invalid) لفظ اسم مرادف (Synonym) . ومن الجدير بالذكر أيضاً أن العينات (Specimens) التى أخذت منها الأوصاف المنشورة لنوع قد اصطلح على أن يطلق عليها الأنماط (Types) ، وأعطيت لهذه الأنماط فى المراتب التقسيمية المتعددة أسماء مخصوصة ، فكلما وصف أحد الباحثين نوعاً جديداً أو مرتبة تقسيمية أخرى جديدة وجب عليه أن يميز منها نمطاً (Type) وهو نموذج أصلى يستعمل كمرجع يُلجأ إليه كلما دعت الحاجة إلى معرفة ما يشتمل عليه النوع أو المرتبة من صفات ، فنمط النوع هو إحدى العينات ونمط الجنس هو النوع ونمط العائلة هو الجنس . وتتجلى أهمية شدة الإعتناء بحفظ وصيانة المحفوظ من هذه الأنماط من واقع أن تنقيح قدر كبير من الأعمال التصنيفية الموجودة حالياً إنما يعتمد على الرجوع إليها فحسب . فالأوصاف التى اعتبرت كافية فى وقت ما كثيراً ما يتضح فى سنوات تالية أنها ليست وافية فى ضوء معايير أدق وأحصف وعندئذ يكون النمط المحفوظ هو الملاذ والمرجع الأخير للبت فى مواضيع مشكوك فى أمرها .

وكثيراً ما يقوم باحثان أو أكثر كل على حدة بوصف نفس النوع أو الجنس أو العائلة أو غير ذلك من المراتب التقسيمية مما يترتب عليه وجود أكثر من اسم لنفس النوع أو المرتبة، ففي مثل هذه الأحوال يجب تطبيق قاعدة الأسبقية (Priority rule) التي تقضى بأن الاسم الأسبق هو الذى يعمل به على شرط أن يكون الواصف قد اتبع فى التسمية القواعد السليمة المطلوبة.

وأما بالنسبة لتصنيف الحشرات بالذات قد وضعت جميع حشرات الكون فى صف إنسيكتا أو ذوات الستة أرجل (Hexapoda أو Class Insecta) وهى إحدى الصفوف العديدة المنسوبة إلى فصيلة أرتروبودا أى مفصليات الأرجل (Phylum Arthropoda). ففضلاً عن اشتراك صف الحشرات فى الخواص العامة المميزة لقبيلة مفصليات الأرجل فإنها تتميز أيضاً بصفات خاصة قد سبق ذكرها. وكما فى أى صف آخر من صفوف شعبة من شعب المملكة الحيوانية فإن صف الحشرات قسم إلى رتب (Orders) والرتب إلى عائلات (Families) والعائلات إلى أجناس (Genera) والأجناس إلى أنواع (Species)، كما استخدمت أيضاً مراتب تقسيمية أخرى متوسطة بين تلك المراتب الرئيسية المذكورة. فبين الصف والرتبة استخدم تحت الصف (Subclass) ثم فوق العائلة (Super family). وبين العائلة والجنس استخدم تحت العائلة (Subfamily) ثم القبيلة (Tribe) على أن تنتهى الأخيرة دائماً باللاحقة "ini". وبين الجنس والنوع استخدم تحت الجنس (Subgenus)، والنوع أحياناً يقسم إلى تحت أنواع (Subspecies).

والأساس فى ذلك التقسيم السابق هو النوع (Species) الذى يعرف بأنه مجموعة من الأفراد التى تسكن بيئة طبيعية واحدة مع تميزها بما يأتى:

- ١ — التشابه الأساسى فى تركيبها.
- ٢ — المقدرة على التزاوج فيما بينها مع إنجاب ذرية خصبة.
- ٣ — عدم إمكانية التزاوج الطبيعى مع أفراد الأنواع الأخرى.

وأما تحت النوع (Subspecies) فهو سلالة جغرافية (Geographical Race) من النوع. والفروقات بين تحت أنواع النوع الواحد ليست قاطعة فى العادة بل قد تكون متداخلة ولا سيما فى الأحوال التى يتأنى فيها تلاق سلالات ببعضها من أمكنة متقاربة حيث يشتد التداخل لدرجة يستحيل معها أن ينسب فرد معين إلى تحت نوع أو سلالة بالذات. فإذا ما وجدت تحت أنواع فإن الاسم العلمى لا يتألف عندئذ من كلمتين فقط

بل من ثلاثة كلمات ثالثها تعبر عن اسم تحت النوع في صورة صفة أو مميزة للسلالة .
 فمثلاً نوع القمل الماص المتطفل على الإنسان وهو المسمى **Pediculus humanus** يتبعه
 سلالتين إحداهما تعيش على الرأس فتسمى **Pediculus humanus capitis** والأخرى
 تعيش على الجسم فتسمى **Pediculus humanus corporis** . غير أن بعض الحشريين
 قد استعملوا أسماء ثلاثية للدلالة على مرتبة أخرى بخلاف السلالة الجغرافية سموها الصنف
 (Variety) مخالفين بذلك القواعد الحديثة للتسمية ، ولكن لما كان الواقع أن الكثير من
 مثل هذه الأصناف هي إما أفراد متخصصة نتيجة لأحوال غذائية أو جوية خاصة وإما
 مظاهر موسمية وإما مظاهر إختلاف لوني فلا يجوز إستعمال التسمية الثلاثية للدلالة
 عليها ، فالنظام المتبع في الوقت الحاضر في تسمية الحشرات أو غيرها من الحيوانات لا يميز
 استخدام التسمية الثلاثية إلا للسلالات الجغرافية بينما الأصناف فلا تعطى إلا أسماء
 عامة .

هذا وقد مر تصنيف الحشرات بأدوار مختلفة وأن تكن هامة من الوجهتين العلمية
 والتاريخية فهنا ليس مجال ذكرها . فقد تناول تصنيف الحشرات علماء كثيرون اختلفوا فيما
 بينهم قليلاً أو كثيراً من حيث نظام وترتيب وتسمية الرتب الحشرية المختلفة ، إلا أن الآراء
 مجمعة حالياً على إتباع النظام التقسيمي التالى وهو المبني على أسس وأركان معينة يتلخص
 أهمها فيما يلي :

- ١ — الأجنحة ، أهي موجودة أم غائبة ، وإن وجدت فأين موضعها أثناء التكوين أهو
 خارج أم داخل الجسم وكم عددها وما شكلها وما نظام التعريق فيها .
- ٢ — التبدل الشكلي (Metamorphosis) ، وما نوعه أهو معدوم أم ناقص تدريجي أم
 ناقص غير تدريجي أم تام .
- ٣ — الأجزاء الفمية ، من حيث نوعها وتركيبها وما يعتريها من تغيرات أثناء مراحل نمو
 الفرد .
- ٤ — بعض الصفات الخارجية الهامة ، كعدد الحلقات الجسمية وأشكالها وأصلاها ،
 وكيفية اتصال المناطق الجسمية الثلاثة ببعضها وأشكال بعض الزوائد الجسمية
 مثل قرون الاستشعار والأرجل والقرون الشرجية وآلة السفاد وآلة وضع البيض ،
 وكذلك عدد عقل رسوغ الأرجل ، ووجود أو عدم وجود العيون المركبة والعيون
 البسيطة وغير ذلك .
- ٥ — بعض الصفات الداخلية ، كنوع التنفس وشكل القصبات الهوائية ، وشكل
 الأجهزة التناسلية الباطنية ، ووجود أو غياب أنابيب ملبىجي وعددها وصفاتها إن
 وجدت .

فعلی هذه الأسس المذكورة قسم صف الحشرات أولاً إلى تحت صنفين هما أبتريجوتا (الحشرات عديمة الأجنحة) وتريجوتا (الحشرات ذوات الأجنحة) وذلك كالآتي :

أولا تحت صف أبتريجوتا (أى عديمات الأجنحة) Subclass Apterygota

وهى تتضمن حشرات نشأت أصلاً وليس لها أجنحة ثم ظلت كذلك أى أن إنعدام الأجنحة فيها صفة أصلية أولية (Primitive) وليست ثانوية ولا مكتسبة كما وأن التبدل الشكلى فيها طفيف أو معدوم، ولها زوج أو أكثر من الزوائد البطنية القلمية الشكل بخلاف أعضاء التناسل الخارجية (آلة السفاد أو آلة وضع البيض) والقرنين الشرجيين .

ويتبع هذا التحت صف (إيتريجوتا) أربعة رتب وهى :

Order Thysanura

١ — رتبة ثايزانيورا أى ذات الذنب الشعرى أو

الهدبى

Order Diplura

٢ — رتبة دبلورا أى ذات الذنب المزدوج .

Order Protura

٣ — رتبة بروتورا أى ذات الذنب الأولى .

Order Collembola

٤ — رتبة كوليمبولا أى ذات القضيب اللاصق .

ثانياً تحت صف أبتريجوتا أى الحشرات ذوات الأجنحة :

Subclass Pterygota

وهذه تشتمل على حشرات تمتلك أجنحة ماعدا البعض القليل منها مثل القمل والبراغيث فليس لها أجنحة، غير أن جميع الشواهد البيولوجية والقرائن المورفولوجية إما تثبت أو تدل دلالة قاطعة على أن أجداد هذه الحشرات الغير مجنحة كانت تمتلك أجنحة فى أول خلقها ثم فقدت أجنحتها بصفة ثانوية مكتسبة نتيجة الإضمحلال والضمور بدليل أنه ما تزال تشاهد بالموجود منها الآن خصائص تركيبية لا تتواجد إلا فى الحشرات المجنحة مثل إنقسام بلورة الحلقة الصدرية بواسطة درز بلورى إلى صليبتين واحدة أمامية والأخرى خلفية، وإنقسام ترجة كل من الحلقتين الصدريتين الثانية والثالثة إلى جملة أصلاب مستقلة، وكون جدار الصدر مقوى من الداخل بسدائب هيكلية داخلية، كما وأن التبدل الشكلى فى هذا التحت صف يختلف كثيراً فيكون عادة إما ناقصاً أو تاماً ونادراً ما يكون طفيفاً أو معدوماً، وكذلك فالبطن لا تحمل أية زوائد خلاف آلة السفاد أو آلة وضع البيض وغير القرنين الشرجيين .

ولقد قسم تحت صف بترنجوتا إلى قسمين أو فرقتين هما اكسوترينجوتا واندوترينجوتا وذلك كالآتي :

أ — قسم إكسوترينجوتا أى الحشرات ذوات الاجنحة الخارجية النمو

(Division: Exopterygota) : وهذه يطلق عليها أيضا قسم هميميتابولا أى الحشرات ذوات التبدل الناقص (Hemimetabola) وهى تضم حشرات تمر في تبدل شكلى بسيط ناقص تدريجى أو ناقص غير تدريجى ، فمراحل النمو المتتالية هى عبارة عن البيضة (Egg) ثم الحورية (Nymph) ثم الحشرة الكاملة أو البالغة أو اليافعة (Adult) ، ونادرا ما يكون ذلك التبدل مصحوبا بطور يشبه العذراء ، كما وتتمو الاجنحة فيها خارجيا فتكون ظاهرة فوق الصدر باستمرار ابتداء من مرحلة الحورية .

ويتبع هذا القسم (اكسوترينجوتا) ستة عشر رتبة وهى :

Order Ephemeroptera	٥ — رتبة افيميروبترا أى ذات الجناح اليومى البقاء
Order Odonata	٦ — رتبة أودوناتا أى ذات الاجزاء الفمية المسننة
Order Plecoptera	٧ — رتبة بليكوپترا أى مطبقة الاجنحة
Order Orthoptera	٨ — رتبة أورثوبترا أى مستقيمة الاجنحة
Order phasmida	٩ — رتبة فارميذا أى الحشرات الشبيهة
Order Dermaptera	١٠ — رتبة ديرماپترا أى جلدية الاجنحة
Order Embioptera	١١ — رتبة امبيوبترا
Order Dictyoptera	١٢ — رتبة ديكتيوبترا أى مشبكة الاجنحة
Order Isobtera	١٣ — رتبة أيسوبترا أى متساوية الاجنحة
order Soraptera	١٤ — رتبة زوابترا أى الحشرات الرائقة غائبة الاجنحة
Order Psocoptera	١٥ — رتبة سوكوبترا
Order Mallophaga	١٦ — رتبة مالوفاجا أى آكلات الشعر
Order Siphunculata	١٧ — رتبة سايفنكبيو لانا أى ذات الانبوبة الماصة
Order Hemiptera	١٨ — رتبة هميبترأ أى نصفية الاجنحة
Order Homoptera	١٩ — رتبة هومبترأ أى متشابهة الاجنحة
Order Thysanoptera	٢٠ — رتبة ثايزانوبترا أى هدية الاجنحة

ب - اندوبتريجوتا أى الحشرات ذوات الاجنحة الداخلية النمو .

(Division : Endopterygota) : وهذه يطلق عليها أيضا قسم هولوميتا بولا أى الحشرات ذات التبدل التام (Holometabola) ، وهى تضم حشرات تمر فى تبدل شكل معقد مصحوب دائما بطور عذرائى فمراحل النمو المتتالية فيه هى البيضة (Egg) ثم اليرقة (Larva) ثم العذراء (Pupa) ثم الحشرة الكاملة (Adult) ، كما وأن الاجنحة تنمو داخلها فلا تظهر فوق الصدر خارجيا إلا ابتداء من طور العذراء ، واليرقات متخصصة عادة .

ويتبع هذا القسم (إندوبتريجوتا) تسعة رتب وهى :

Order Neuroptera	٢١ - رتبة نيوروبترا أو شبكية الأجنحة
Order Mecoptera	٢٢ - رتبة مكبترأ أى طويلة الأجنحة
Order Lepidoptera	٢٣ - رتبة لبيدوبترا أى حرشفية الاجنحة
Order Trichoptera	٢٤ - رتبة ترايكوبترا أى شعرية الاجنحة
Order Diptera	٢٥ - رتبة دييترا أى ذات الجناحين
Order Siphonaptera	٢٦ - رتبة سايفوتابترا أى غائية الأجنحة ذات المصاص
Order Hymenoptera	٢٧ - رتبة هايمينوا أى غشائية الأجنحة
Order Coleoptera	٢٨ - رتبة كوليبترا أى غمدية الاجنحة
Order Sterpsiptera	٢٩ - رتبة سترسبييترا أى ملوية الأجنحة

تحت صف أبتريجوتا (الحشرات عديمة الاجنحة)

(Order Thysanura)

رتبة ثايزانيورا (ذات الذنب الشعرى أو الهدبى)

(Order Thysannra)

[Finger or Tassel; Thysanos] أى هداية أو ثرابه ، Tail = Oura أى ذيل أو ذنب] .

وتعرف حشرات هذه الرتبة (شكل ١٤٥) بذوات الأذنان الشعرية (Bristle tails) وهى تتميز بالصفات العامة التالية :

١ - حشرات صغيرة الأحجام لديها فى العادة عيون مركبة وأجسامها فى الغالب مزودة بحراشيف .

٢ — قرون الاستشعار طويلة شعرية وعديدة الماصم ولكن مفاصمها خالية من العضلات .

٣ — الاجزاء الفموية قارضة من النوع العادى وبارزة خارج الرأس (Ectognathous)

٤ — البطن مكونه من ١١ حلقة وتنبى بقرنين طويلين خيطيين إما مقسمين أو غير مقسمين إلى حلقات ، ولترجة الحلقة البطنية الحادية عشر امتداد خلفى طويل بشكل خيط ذنبى ثالث ممتد فى وسط القرنين الشرجيين ، كما توجد على الحلقات البطنية أقلام ومجسمات (Styli) وحوصلات قابلة للانفراد (Protrusible vesicles) . وكذلك توجد آلة وضع بيض طويلة .

٥ — الارجل بها الرسغ يتألف من ٢ إلى ٤ عقل .

٦ — التبديل الشكلى معدوم أو طفيف .

وتوجد حشرات هذه الرتبة غالبا تحت الاحجار أو قرومات الخشب (Logs) أو بين الأوراق النباتية المتساقطة أو بالمنازل بين الكتب وخلف الصور المعلقة على الحوائط أو تحت السجاجيد .

رتبة ديپلورا (ذات الذنب المزدوج)

(Order Diplura)

[Dauble = diplos أى مزدوج ، Tail = Oure أى ذيل أو ذنب]

وتحتوى هذه الرتبة على حشرات صغيرة الاحجام عديمة العيون وليست مخضبة بالوان غالبا وتتميز بالصفات الاتية (شكل ١٤٦) :

(١) قرون الاستشعار عقدية (قلادية) ومفاصمها مزودة بعضلات .

(٢) الاجزاء الفموية معدة للقرض ولكنها غائرة بداخل الرأس (Entognathous) .


(٣) البطن تنتهى من مؤخرتها إما بزوج من القرون الشرجية المتبانية الاشكال أو بزوج من الملاقط الغير مقسمة إلى عقل . ولا يوجد خيط ذنبى وسطى ، ولكن توجد أقلام (مجسمات) وعادة حوصلات قابلة للانفراد .

(٤) لا توجد آلة وضع بيض .

(٥) رسوغ الارجل الصدرية مؤلفة من عقلة واحدة فقط .

(٦) التبديل الشكلى طفيف أو معدوم .

وحشرات هذه الرتبة ليس لها أهمية اقتصادية وهى تقطن الرتبة وكثيرا ايضا ماترتاد مختلف أصناف المواد النباتية المتحللة . وأضخم الأشكال قد تصل الى حوالى ٥٠ ملليمتر طولًا ولكن المتوسط هو ٢ — ٥ ملليمتر فى الطول .





السماك الفضي

Or. *Thysanura*

البرتيورا


Or. *Protura*



اللوطبول

Or. *Collembola*

شكل (١٤٥) : الرتب الحشرية التابعة لتحت صف Apteriygota .



شكل (١٤٦) : حشرات من رتبة دييلورا .

(أ) جاييكس (Japyx) .

(ب) كامبوديا (Campodea) .

(ج) أناجاييكس (Anajapyx) .

رتبة برتيورا (ذات الذنب الاولى) (Order Protura)

[First = Protos أى الاول ، Tail = Oura أى ذيل أو ذنب] .

وتشتمل هذه الرتبة على حشرات دقيقة الاحجام عديمة الالوان وهى تتميز بالصفات العمومية الاتية .

١ — لاتواجد عيون ولا قرون استشعار .

- ٢ — الاجزاء الفموية غائرة بداخل الرأس (Entognathous) ومعدة للثقب .
- ٣ — البطن في الحشرة الكاملة متألفة من ١١ حلقة يليها تيلسون (Telson) واضح ، ولا يوجد قرنان شرجيان .
- ٤ — التبدل الشكلي طفيف أو معدوم .

وحشرات هذه الرتبة (شكل ١٤) مخلوقات دقيقة الاحجام فنادرا ما تبلغ أكثر من ملليمتر واحد في الطول ، وهى موضوعية وتقضى رؤيتها البحث والتنقيب عنها في التربة أو بين الجذور السطحية للحشائش والنخيل أو تحت قلف الاشجار أو تحت قلف الاشجار أو أسفل الاحجار وغير ذلك .

رتبة كوليمبولا (ذات القضيب اللاصق)

(Order Collembola)

[Clue = Kola أى غراء ، Peg = Embolon أى وتد أو قضيب]

وتشتمل هذه الرتبة على حشرات صغيرة جدا مشهورة بذوات الذنب الزنبركى (Spring tails) وهى تتميز بالصفات العمومية الآتية :

- ١ — الاجزاء الفموية قارضة وغائرة بداخل الرأس (Entognathous) .
- ٢ — بكل من قرنى الاستشعار أربعة مفاصل ، وخلف كل قرن منها يوجد عضو خلف قرنى متميز .
- ٣ — لا توجد عينان مركبتان بل غالبا ما توجد في مكانها مجموعة من العيون البسيطة على كل جانب من جانبي الرأس .
- ٤ — لا توجد بالارجل الصدرية رسوغ على الاطلاق بل ينتهى الساق مباشرة بمخلب واحد .
- ٥ — البطن مؤلفة من ستة حلقات قد تكون أحيانا ملتحمة ببعضها البعض ، وتكون الحلقة الاولى منها مزودة بأنبوبة سفلية (Ventral tube) على هيئة الممص تساعد على الالتصاق بالسطوح ، كما وتكون الحلقة البطنية الرابعة مجهزة بعضو زنبركى (Springing organ) يستعمل في جعل الحشرة تقفز في الهواء .
- ٦ — يندر أن توجد قصبات هوائية بل يتم التنفس عن طريق جدار الجسم .
- ٧ — أنابيب ملييجى ليست موجودة على الاطلاق .
- ٨ — التبدل الشكلي معدوم أو طفيف جداً

والحشرات فى هذه الرتبة (شكل ١٤٥) نادرا ما تتجاوز خمسة ملليمترات طولاً .
وهى توجد فى كل مكان ابتداء من القطبين الى خط الاستواء . والافراد غالبا ماتوجد
متجمعة معا بأعداد كبيرة فوق أو تحت سطح التربة أو بين الاعشاب أو فى المواد
العضوية المتحللة أو تحت قلف الاشجار وأعماد السيقان أو بداخل عشوش النمل
الابيض .

تحت صف بتريجوتا (الحشرات ذوات الاجنحة) (Subclass Pterygota)

قسم اكسوپتريجوتا (الحشرات ذوات الاجنحة خارجية النمو) (Division Exopterygota)


رتبة افيميروترا (ذات الاجنحة اليومية البقاء) (Order Ephemeroptera)

[Living a day = Ephemeros أى يعيش يوما واحداً ، Wing = Pteron أى جناح] .

تشمل هذه الرتبة على الحشرات المعروفة بذباب مايو (May flies) (شكل ١٤٧)
والتي تتميز بالصفات العمومية التالية :

- ١ — الحشرات الكاملة رخوة الأجسام ذات عيون مركبة ضخمة وقرون استشعار قصيرة
رفيعة وأجزاء فمية مضمحلة .
- ٢ — الأجنحة زوجان غشائيان رقيقان وكل جناح منها مثلث الشكل تقريباً وبه انطواءات
طولية كطيات المروحة ، والزوج الخلفى من الأجنحة أصغر بكثير من الزوج
الأمامى وأحياناً ضامر مضمحل .
- ٣ — القرنان الشرجيان نحيفان وطويلان جداً وعديدى المقاصم ويتوسطها عادة خيط
ذنبى طويل .
- ٤ — التبديل الشكلى ناقص غير تدريجى ، فالحوريات مائة المعيشة ومزودة بخياشيم قصبية
(Tracheal gills) إما صفيحية أو خيطية الشكل .

والمعروف من هذه الرتبة يبلغ نحو ١٠٠٠ نوع ليس لها أهمية اقتصادية .



شكل (١٤٧) : رتبة ذبابة مايو Ephemeroptera (ذات الأجنحة اليومية البقاء).

رتبة أودوناتا (ذات الأجزاء الفمية المسننة)

(Order Odonata)

[Tooth = Odontos أى تسنينة أو سنة]

وتعرف حشرات هذه الرتبة بالرعاشات الكبيرة أو التنينية (Dragon Flies) والرعاشات الصغيرة أو النسوية (Damsel Flies) وهى تتميز بالصفات العامة التالية :


حشرات كبيرة الأحجام ذات أجسام مطاولة جداً ورؤوسها ضخمة ومزودة بعيون مركبة ضخمة وقرون استشعار صغيرة دقيقة.

- ٢ — الأجزاء الفمية قارضة متخصصة ومجهزة بأسنان قوية.
- ٣ — يوجد قرنان شرجيان صغيران وكل منهما يتكون من مفصم واحد.
- ٤ — يوجد زوجان متماثلان تقريباً من أجنحة غشائية زجاجية المظهر، ولكل جناح وصمة جناحية (Pterostigmata) سمراء وكذلك عروق عابرة كثيرة العدد.
- ٥ — التبدل الشكلى ناقص غير تدريجى، فالحوريات مائية المعيشة وتنفس بواسطة خياشيم وبها الشفة السفلى متحورة إلى عضو قابل للامتداد يدعى القناع (Mask) وهو يستخدم فى اقتناص الفرائس.

وجميع الحشرات الكاملة لهذه الرتبة مفترسة وتلتهم حشرات من أصناف متباينة فتقتنصها أثناء طيرانها فى الهواء، ويتم الإقتناص بواسطة الأرجل المسلحة لهذا الغرض بأشواك قوية على الإفخاذ والسيقان. والصدر الأمامى صغير جداً. بينا الصدر المتوسط والصدر الخلفى ففيهما تكون الأضلاع البلورية (Pleurites) متضخمة جداً ومنحرفة بانحدار شديد للوراء مما ترتب عليه أن أصبحت الترجات والأجنحة مدفوعة نحو الخلف بعكس الاسترنات فمتقدمة بعيداً للأمام، فنجم على أثر ذلك أن صارت الأرجل واقعة خلف الفم بقليل وهو الأمر الذى يجعلها تستطيع أن تقبض بسهولة على الفريسة. والأرجل ليست من أجل الانتقال ورسوغها تتألف من ثلاثة مفاصم. وتعريق الأجنحة لا يستعرض أى قرابة وثيقة لتعريق أجنحة الحشرات الأخرى. والأجنحة شأنها كشأن أجنحة ذباب مايو (إفيميروترا) ليس فى استطاعتها أن تنطوى بحيث يقع هامشها الخلفى فوق الظهر.

وتتألف البطن من عشرة حلقات بالإضافة إلى آثار من حلقة حادية عشر. والعضو الذكرى (القضيب) فريد فى كونه يقع على الجهة السفلية من الحلقة البطنية الثانية بينما الفتحة التناسلية فواقعة على الحلقة البطنية التاسعة ومنها ينقل المنى إلى القضيب، ويوجد بالأنثى غالباً آلة وضع بيض قصيرة ذات ثلاثة صمامات.

والحوريات مائية المعيشة دائماً وتسمى أيضاً حوريات الماء أو عرائس البحر (Naiads)، وهى تتغذى بإقتناص وإفتراس ماتعثر عليه هناك من حيوانات صغيرة كقشريات أو حشرات أخرى مثل يرقات الناموس أو خلافه، ولكنها كسولة بطيئة الحركة نوعاً ومزودة إلى حد ما بتلوين إحتوائى. ومن أهم خصائص هذه الحوريات تحور شفتها السفلى إلى عضو إقتناص يدعى القناع (Mask) وهو مزود بمفصلة بين مؤخر الذقن ومقدم الذقن كما ويكون مندساً بين الأرجل فى حالة عدم الاستعمال، ولكن عند القبض على ضحية فالقناع يفرد فجأة وبسرعة فائقة تقبض على الفريسة فوق أشواك الملمسين الشفويين.



شكل (١٤٨) : رتبة الرعاشات Odonata

- (أ) الرعاش الكبير. (ب) حورية الرعاش الكبير.
 (ج) الرعاش الصغير. (د) حورية الرعاش الصغير.

وتقسم رتبة أودوناتا إلى تحت ربتين أساسيتين وهما زايجويترا وأنيسويترا وذلك كالآتي :

١ — تحت رتبة زايجويترا أى متاثلاث الأجنحة : (Suborder Zygoptera)
وهي تتضمن الرعاشات الصغيرة أو النسوية (Damsel flies) (شكل ١٤٨ ج، د)،
وتتميز بكون أجسامها نحيفة جداً وبأن زوجي الأجنحة متاثلاثان وقواعدها ضيقة وتتخذ
وضعا عمودياً فوق الجسم في وقت الاستراحة. والحوريات في هذه التحت رتبة (شكل
١٤٨ د) نحيفة القوام وجسمها ينتهي بثلاثة خياشيم ذنبية (Tracheal caudal gills)
طويلة.

٢ — تحت رتبة أنيسويترا أى مختلفات الأجنحة : (Suborder Anisoptera)

وهي تتضمن الرعاشات الكبيرة أو التنينية (Dragon flies) (شكل ١٤٨ أ، ب)
وتتميز بكون أجسامها أغلظ وأضخم وبأن الجناحين الخلفيين أعرض قاعدياً من الجناحين
الأماميين وبأن زوجي الأجنحة يتخذان وضعاً أفقياً على جانبي الجسم أثناء الاستراحة.
والحوريات في هذه التحت رتبة (شكل ١٤٧ ب) أقوى بنياناً وليس لها خياشيم ذنبية ولكن
يوجد بها جهاز مكون من خياشيم قصبية (Rectal tracheal gills) بارزة في صفوف
طولية داخل فراغ القناة الهضمية الخلفية.

رتبة بليكويترا (مطبقة الأجنحة)

(Order Plecoptera)

[Wing = Pteron أى جناح ، To fold = Pleikein أى يطوى]

وحشرات هذه الرتبة (شكل ١٤٩) تعرف بذبذب الأحجار (Stoneflies) وتتميز
بالصفات العامة التالية :

١ — الحشرات الكاملة رخوة الأجسام وبها قرون الاستشعار والقرون الشرجية طويلة
خيطة الشكل.


٢ — رسوغ الأرجل مؤلفة من ثلاثة مفاصل.

٣ — الأجنحة زوجان غشائيان، ولكل من جناحي الزوج الخلفي فص خلفي أو شرجي
(Anal lobe) منطوي.

٤ — الأجزاء القمية معدة للقرص، والليجيولا ذات أربعة فصوص.

٥ — التبدل الشكلى ناقص غير تدريجي، فالحوريات مائة ولها خياشيم خيطة.

وتتضمن هذه الرتبة الصغيرة نحواً من ١٣٠٠ نوع ليس لها أهمية اقتصادية.



شكل (١٤٩) : رتبة بليكوپترا Plecoptera .

رتبة أورثوپترا (مستقيمة الأجنحة) (Order Orthoptera)

[Straight = Orthos أى مستقيم، Wing = Pteron أى جناح]

وتتضمن هذه الرتبة الحشرات المعروفة بالجراد والنطاطات (Grasshoppers, Locusts) وصراصير الغيط (Crickets) وغيرها، وهى تتميز بالصفات العامة الآتية:

- ١ - الأجنحة زوجان، والجناحان الأماميان متحوران إلى غطاءين جلديين (Tegmina) فهما سميكان يحميان تحتها الجناحين الخلفيين الغشائيين الكبيرين فى وقت الاستراحة وإنطباق الأجنحة فوق الجسم. والتعريق عام والعروق مستقيمة فى الجناحين إلا أنها تكون مرتبة ترتيباً شعاعياً فى الجناح خلفى.
- ٢ - الأجزاء الفموية معدة للقرص.

- ٣ — الرجلان الصدريتان الخلفيتان متحورتان عادة للقيام بوظيفة القفز، والرسوغ دائماً تقريباً مؤلفة من ثلاثة أو أربعة مفاصل.
- ٤ — للأنتى آلة وضع بيض حسنة النمو وظاهرة في نهاية البطن.
- ٥ — يوجد قرنان شرجيان وهما على الدوام تقريباً غير مقسمين إلى عقل.
- ٦ — غالباً ما توجد أجهزة إحداث الصوت (Stridulatory organs) لأصدار أصوات وأجهزة سمعية (Auditory organs) متخصصة.
- ٧ — التبديل الشكلي ناقص تدريجياً.

ويطلق على حشرات هذه الرتبة أحياناً اسم القافزات (Saltatoria) نظراً لكونها جميعاً قادرة على القفز بدرجة صغيرة أو كبيرة، وهي تقع في ثلاثة مجاميع رئيسية ضخمة جداً وهي مجموعة الجراد الطويل القرون ثم مجموعة صراصير الغيط وكلاب البحر أو الحفارات (شكل ١٥٠ أ) ثم مجموعة النطاطات والجرادات قصيرات القرون (شكل ١٥١).



رتبة فازميذا (الحشرات الشبحية أو العصوية)

(Order Phasmida)



[Apparition = Phasma أى شبح أو خيال]

وتعرف الحشرات المنتمية إلى هذه الرتبة بالحشرات العصوية والورقية (Stick - and Leaf - insects) وهي تتميز بالصفات العمومية التالية :

- (١) حشرات كبيرة الأحجام وغالباً غير مجنحة ، وفي أغلب الأحيان يكون شكلها اسطوانى مطاول وأرجلها رفيعة طويلة بحيث تصير محاكية لأغصان النباتات التي تقف فوقها (شكل ١٥٢) ، ولكن في أحيان أندر تكون أجسامها مضغوطة من أعلى إلى أسفل وورقية الشكل بحيث تصير محاكية لأوراق ما تعيش عليه من نباتات (شكل ١٥٢ ب) .
- (٢) الأجزاء الفمية قارضة .
- (٣) الصدر الأمامى قصير ، وجميع الأرجل مشابهة لبعضها .
- (٤) يوجد قرنان شرجيان قصيران وغير مقسمين إلى مفاصل .
- (٥) توجد آلة وضع البيض ولكنها مخبوءة في الداخل وغير ظاهرة .
- (٦) التبديل الشكلي ناقص تدريجياً ..




شكل (١٥٠) : (أ) الحفار (رتبة Orthoptera).
 (ب) فرسة النبی (رتبة Dictyoptera).



قمل الكتب


Or. Psocoptera



إبرة العجوزة

Or. Dermaptera

شكل (١٥١) : بعض الرتب الحشرية.



شكل (١٥٢) : رتبة فازميديا.

(أ) الحشرة العصوية . *Carausius sp.*

(ب) الحشرة الورقية . *Phyllium sp.*

رتبة ديرمابترا (جلدية الأجنحة)

(Order Dermaptera)

[**Wing = Pteron** أى جناح ، **Skin = Derma** أى جلد]

وتشتمل هذه الرتبة على الحشرات الملقبة بدخلات الآذان (Earwigs) ، وقد اشتق هذا الاسم من الاعتقاد الخاطئ بأنها تختبئ في أذن الإنسان ولا سيما الأطفال ولكن الواقع أنها غير ضارة مطلقاً . وهي تتميز بالصفات العامة الآتية (شكل ١٥١) :

(١) حشرات مطاولة الأجسام ولها زوجان من الأجنحة ، فالجناحين الأماميين قصيرين جلدي القوام (Tegmina) ، بينما الجناحان الخلفيان فكبيرين غشائيين

وينطويان إنطواءً مروحيًا في وقت الراحة بحيث يصيران محمين جزئيًا تحت الجناحين الأماميين الجلديين .

(٢) الأجزاء الفمية قارضة ، والليجيولا مكونة من فصين .

(٣) بمؤخرة البطن زوج من قرون شرجية غير مقسمة لحلقات ومتحورة إلى ملقطين قرنيين (Horny Forceps) .

(٤) التبدل الشكلي ناقص تدريجي .

ويبلغ ما عرف من أنواع هذه الرتبة نحو ٩٠٠ نوع كلها عديمة الأهمية .

رتبة إمبيوترا (إمياوية الأجنحة)

(Order Embioptera)

[أى إمياوى وذلك نسبة إلى جنس إمبيا (Embia) ،

Wing = Pteron أى جناح]

وتعرف حشرات هذه الرتبة باسم غازلات النسيج العنكبوتى (Web-spinners) (شكل ١٥٣) وهى تتميز بالصفات العامة التالية:

(١) حشرات مطاوله رخوة الاجسام وتعيش فى أنفاق حريرية كنسيج العنكبوت .

(٢) يوجد من الاجنحة زوجان جميعها متساوية الاحجام وطويلة دخانية اللون وتحتوى على اشارات عن اضمحلال بالتعريق .

(٣) الاجزاء الفمية قارضة ، والليجيولا ذات أربعة فصوص .

(٤) رسوغ الارجل مؤلفة من ثلاثة مفاصم ، والمفصم الأول من رسغ كل من الرجلين الاماميتين متضخم للغاية .


(٥) يوجد قرنان شرجيان متألف كل منهما من مفصمين . وفى الذكر غالبا ما يكون القرنان الشرجيان غير متماثلين .

(٦) الاناث غير مجنحة .

(٧) التبدل الشكلي ناقص تدريجي .

وهذه الرتبة الصغيرة تعيش حشراتا بداخل أنفاق حريرية منسوجة تحت الاحجار أو أسفل قلف الاشجار السائب ، وهى حشرات تجمعية (Gregarious) إذ تسكن أفراد عديدة منها ومعها حورياتها وبيضاتها فى نفس النفق الواحد . ويفرز حرير النسيج من غددة عديدة كائنة بالعقلة الاولى المتضخمة من رسغ كل من الرجلين الاماميتين ، ومن

كل غدة تخرج قناة صغيرة (Ducteola) تفتح سفلياً عند قمة شوكة مقابلة . وتوجد تلك الغدد المذكورة في أفراد من كل من الجنسين (الذكور والاناث) ومن جميع الأعمار .



شكل (١٥٣) : رتبة امبيوترا Embioidoptera .

رتبة ديكتيوترا (مشبكة الاجنحة)

(Order Dictyoptera)

[Network = Dictyon أى هيئة شبكية ، Wing = Pteron أى

جناح]

تشتمل هذه الرتبة على الحشرات المعروفة بالصراصير (Cockroaches)

(شكل ١٥٤) وأفراس النوى (Mantids) (شكل ١٥٠ ب) ، وهى تتميز

بالصفات العمومية التالية :

- (١) قرون الاستشعار دائماً تقريباً خيطية الشكل أو شعرية كثيرة المفاصل .
- (٢) الأجزاء الفموية معدة للقرض .
- (٣) الأرجل متشابهة لبعضها البعض أى أرجل جرى أو أن الرجلين الأماميتين محورتان للقنص والصيد (Raptorial) ، والرسوغ مؤلفة من خمسة مفاصل .


(٤) يوجد من الأجنحة زوجان ، فالجناحين الأماميين متغلظين سميكين ومتحورين إلى جناحين جلديين (Tegmina) وبكل منهما يكون العرق الضلعي منطبقاً على الحافة الأمامية للجناح .

(٥) يوجد قرنان شرجيان قصيران ولكنهما كثيرى المقاصم .


(٦) آلة وضع البيض مختزلة ومخبوءة بداخل الجسم ، والبيضات ترص بداخل كيس بيض (Ootheca) .

(٧) التبدل الشكلي ناقص تدريجى .

وكثيراً ما كانت حشرات هذه الرتبة توضع مع حشرات رتبتي أورثوترا وفازميديا فى رتبة واحدة شاملة ، إلا أن الفروقات المميزة الموضحة أعلاه تستأهل وضعها فى رتبة مستقلة قائمة بذاتها .




الصراصير الأمريكية



الصراصير الألمانية (♀)



الصراصير الشرقى (♂)



الصراصير الشرقى (♀)

شكل (١٥٤) : رتبة ديكتيوترا (الصراصير).

رتبة أيسوئترا (متساوية ارجنحة)

(Order Isoptera)

[Equal = Isos أى متساو ، Wing = Pteron أى جناح]

تعرف حشرات هذه الرتبة بالثمل الأبيض (White ants) أو قراضات الخشب الأرضية (Termies) ، إلا أن تسميتها بالثمل الأبيض لا تبرر في الواقع أى علاقة مطلقاً بالثمل العادى الحقيقى الذى يتبع رتبة غشائية الاجنحة فال فروقات بينهما عديدة واضحة .
وهى تتميز بالصفات العامة التالية :

(١) حشرات اجتماعية (Social insects) تعيش في مستعمرات ضخمة وأجسامها رخوة وعادة باهتة اللون .

(٢) الأجزاء الفموية معدة للقرض ، والليجيولا ذات أربعة فصوص .

(٣) القرنان الشريحيان قصيران جداً .


(٤) الحشرات إما ذات زوجين من أجنحة مطاولة متشابهة وسرعان ما تنقص من عند قواعدها وتسقط ، أو بدون أجنحة بالمرة .

(٥) الاشكال المجنحة هى ملكات (إناث خصبة) وملوك (ذكور خصبة) ولها عيون ، والأشكال الغير مجنحة إما لديها عيون أثرية أو لا عيون لها إطلاقاً ويوجد منها أساسياً طرازان ، الطراز الأول هو الجنود (ذكور وإناث عقيمة) أو العساكر (Soliders) وهى إما ذات رؤوس وفكوك ضخمة أو ذات منقار مدبب بالرأس ، والطراز الثانى هو الشغالات (ذكور وإناث عقيمة) (Workers) التى لها رؤوس وفكوك اعتيادية الاحجام .


(٦) التبدل الشكلى ناقص تدريجى .

والحشرات المنتمية إلى هذه الرتبة (شكل ١٥٥) تعد من حيث الناحية التركيبية وثيقة القرابة لصراصير فصيلة بلاتيدى . وجميع أنواع الثمل الأبيض إجتماعية ومتعددة الأشكال (Polymorphic) وتعيش على صورة مستعمرات راقية التنظيم في عشوش أو مساكن خاصة تدعى تيرميتاريا (Termitaria) وهى تبنى تحت سطح الأرض أو فوقه أو بداخل الأخشاب ، فالأنواع البدائية تعيش في أنفاق محفورة بداخل الخشب فقط (حياً كان أم ميتاً) ، بينما أنواع أخرى فتنشئ عشوشاً مخصوصة كبيرة الاحجام غالباً ومكونة من سراديب وحجرات مقامة من تراب وخشب مخلوطين باللعباب وبفضلات المادة البرازية ، وقد تبنى هذه العشوش تحت سطح الأرض فقط أو يكون لها أيضاً جزء


بارز بوضوح فوق سطح الأرض إما على شكل أكوام أو روائى صغيرة أو على هيئة تلال عالية قد يصل إرتفاعها إلى بضعة أمتار كما فى بعض الأنواع الاستوائية .



ملء



شغالة



خندي

ملءة بيض
مملوءة بالبيض
المرصع

شكل (١٥٥) : رتبة متساوية الأجنحة Isoptera (أفراد مستعمرة النمل الأبيض).

رتبة زورابترا (الحشرات الرائقة غائبة الأجنحة)

(Order Zoraptera)

[Pure = Zoros أى رائق أو نقي ، Wingless = Apteros أى

بدون أجنحة]

وتتميز هذه الرتبة بالصفات العمومية الآتية (شكل ١٥٦) :

- (١) حشرات دقيقة الأجسام إما مجنحة أو غير مجنحة وقرون إستشعارها عقدية مؤلفة من تسعة مفاصم .
- (٢) الأجزاء الفموية معدة للقرض ، وبها الفكمان السفليان اعتياديان ، وكل من الملمسين الشفويين يتألف من ثلاثة عقل .
- (٣) الصدر حلقاته الثلاثة متساوية الأحجام تقريباً، إذ أن الحلقة الصدرية الأمامية نامية إلى حجم كل من الحلقتين الأخريين .
- (٤) الأجنحة إن وجدت فتكون عبارة عن زوجين غشائيين وفيهما التعريق متخصص للغاية بالنقصان الشديد في عدد العروق ، ويمكن لهذه الأجنحة أن تنتزع (تنقص) عن طريق حزوز قاعدية (Basal fractures) .
- (٥) رسوغ الأرجل متألف كل منهما من مفصمين .
- (٦) يوجد قرنان شرجيان قصيران جداً وكل منهما متكون من عقلة واحدة .
- (٧) لا توجد بالأنثى آلة وضع بيض ، ولكن بالذكر توجد آلة سفاد متخصصة وأحياناً غير متماثلة الجانبين .
- (٨) التبدل الشكلي ناقص التدرج .

رتبة سوكوبترا (Order Psocoptera)

[Psoco وذلك نسبة إلى جنس سوكس (Psocus) ،

Wing = Pteron أى جناح]

وتعرف حشرات هذه الرتبة بقمل الكتب وأقربائه (Book - lice & Allies) وهي

تتميز بالصفات الآتية (شكل ١٥١) :

- (١) حشرات صغيرة جداً رخوة الأجسام إما مجنحة أو غير مجنحة ، وقرون إستشعارها خيطية طويلة ذات ١٢ — ٥٠ عقلة ، وهناك بالرأس درز جمجمي علوي (Epicranial suture) واضح ودرقة خلفية (Post - clypeus) متضخمة .

(٢) الأجزاء الفمية قارضة ولكن متحورة ، فالفك السفلى به اللاسينيا عصبوية وغائرة جزئياً بداخل محفظة الرأس ، كما وأن كل من الملمسين الشفويين صغير للغاية ومؤلف من عقلة أو عقلتين .

(٣) الحلقة الصدرية الأولى صغيرة الحجم بالنسبة للحلقتين الصدريتين التاليتين .


(٤) رسوغ الأرجل مؤلفة من مفصمين أو ثلاثة مفاصل .

(٥) في الأفراد المجنحة يوجد زوجان من الأجنحة الغشائية وبكل من الجناحين الأماميين وصمة جناحية (Pterostigma) ، والتعريق في تلك الأجنحة مضمحل ونادراً ما توجد عروق عابرة .

(٦) لا يوجد قرنان شرجيان إطلاقاً .

(٧) التبديل الشكلي ناقص تدريجياً .

والحشرات المنتمية إلى هذه الرتبة حشرات صغيرة الأحجام واسعة الإنتشار في العالم كله ، وأهميتها الإقتصادية ضئيلة جداً .



شكل (١٥٦) : فرد غير مجنح من النوع Zorotypus sp. من رتبة زورابترا .

رتبة ماللوفاجا (آكلات الشعر)

(Order Mallophaga)

[Hair = Mallos أى الشعر ، To eat = Phagein أى يأكل]

وتعرف حشرات هذه الرتبة بالقمل الطيرى أو القارض (Biting or

Bird lice) الذى يعيش على الطيور والققط والكلاب وغيرها من الحيوانات ، وهى تتميز

بالصفات العامة التالية (شكل ١٥٧) :

(١) حشرات صغيرة غير مجنحة وتعيش أثناء جميع مراحل نموها كطفيليات خارجية غالباً على الطيور وأحياناً على الثدييات وتتغذى بقرض شظايا من الريش أو الشعر وغير ذلك من المواد التى ينتجها جلد الحيوان العائل .

(٢) العيون المركبة مختزلة ، ولا توجد عيون بسيطة ، وقرون الاستشعار مؤلفة من ٣ إلى ٥ عقل .

(٣) الأجزاء الفموية من نوع قارض متحور ، والملمسان الفكيان إما غائبان بالمرة أو موجودان ومؤلف كل منهما من أربعة مفاصل ، الليجيولا إما غير مقسمة أو مقسمة إلى فصين ، والملمسان الشفويان أثريان .

(٤) الحلقة الصدرية الأولى طليقة الحركة ، والحلقة الصدرية الثانية غالباً ما تكون منفصلة إنفصلاً غير تام عن الحلقة الصدرية الثالثة .

(٥) رسوغ الأرجل مكونة من عقل أو عقلتين ومنتهية بمخالب واحد أو مخالبين .

(٦) الثغور التنفسية الصدرية سفلية الوضع .

(٧) لا يوجد قرنان شرجيان .

(٨) التبدل الشكلى طفيف وناقص تدريجى ، فالبيضات تفقس إلى حوريات شديدة الشبه بالحشرات الكاملة .

رتبة سايفانكيولاتا (ذات الأنبوبة الماصة)

(Order Siphunculata)

[Little tube = Siphunculus أى أنبوب أو مصاص صغير]

وتعرف حشرات هذه الرتبة بالقمل المصاص (Sucking lice) ، وهى تتميز

بالصفات العامة التالية (شكل ١٥٨) :

(١) حشرات صغيرة أجسامها مبطنية من أعلى إلى أسفل وغير مجنحة وتعيش أثناء

جميع مراحل نموها كطفيليات خارجية على الثدييات وتتغذى منها بامتصاص دمها.

(٢) العيون المركبة إما موجودة بحالة مختزلة أو غائبة بالمرة، ولا توجد عيون بسيطة، وقرون الاستشعار ذات ٣ إلى ٥ مفاصل.

(٣) الأجزاء الفموية معدة لأجل الثقب والمص ولكنها شديدة التحور وتكون منسحبة بداخل الرأس في وقت عدم إستخدامها.

(٤) الحلقات الصدرية الثلاثة ملتصقة ببعضها.

(٥) رسوخ الأرجل مؤلفة من علقة واحدة منتهية بمخالب واحد.

(٦) الثغور التنفسية الصدرية ظهرية الوضع.

(٧) لا يوجد قرنان شرجيان.

(٨) التبدل الشكلي طفيف وناقص التدرج، فالحوريات الفاقسة من البيضات تكاد لا تفتقر شكلاً عن أبوها.

رتبة هيميپترا (نصفية الأجنحة)

(Order Hemiptera)

[Hemi = نصف ، Pteron = Wing أى جناح]

وتحتوى هذه الرتبة على الحشرات المعروفة بالبق النباتي (Plant bugs) وهى

تتميز بالصفات العامة الآتية (شكل ١٥٩) :



(١) الجناحان الأماميان متحوران فى العادة إلى جناح نصف غمدى (Hemelytra)، وعند الاستراحة ينطبق هذان الجناحان على بعضهما فى شكل حرف X مع انبطاحهما أفقيًا فوق البطن .

(٢) كما وتكون قاعدة الشفة السفلى مفصولة عن حرقتي الرجلين الأماميتين بواسطة منطقة متصلة من جدار محفظة الرأس .


(٣) التطور ناقص تدريجى .

وأغلبية أنواع الحشرات المنتمية إلى هذه الرتبة تتغذى على عصارة نباتات وكثير منها ضار بالمحاصيل المنزرعة بمختلف بقاع العالم .

قمل الدجاج




التربس



قمل الحمام


شكل (١٥٧) : بعض الرتب الحشرية.




قمل العانة



شكل (١٥٨) : رتبة القمل الماص Anoplura .



نمّ الفرس



البقة الحفراء



Scutellum

الذئبة الأمامية
الضفيرة

بقة البستوما

شكل (١٥٩) : رتبة نصفية الأجنحة Hemiptera .

رتبة هومبترا (متشابهة الأجنحة) (Order Homoptera)

- تميز أفراد الرتبة (شكل ١٦٠) بالصفات التالية :
- (١) كل من الجناحين الأماميين إما جلدياً أو غشائياً ولكنه متجانس القوام وعند الاستراحة يطوى هذان الجناحان بحيث يصنعان هيئة السقف (الجمالون) فوق ظهر الجسم .
- (٢) الشفة السفلى تخرج بعيداً للوراء من على الرأس أو حتى من بين حرقفتي الرجلين الأماميتين .
- (٣) التطور ناقص تدريجى وفيه يكون كاملاً أحياناً كما في ذكور الحشرات القشرية والبق الدقيقى .

ومن الخصائص المميزة لحياة حشرات رتبة هومبترا ثلاثة طبائع هامة وهى :

(١) القيام بقذف مادة سكرية تدعى الندوة العسلية (Honey-dew) وذلك عن طريق الفتحة الشرجية وهو أمر ملحوظ على الأخص فى أنواع المن .

(٢) القيام غالباً بإخراج شمع إما فى هيئة دقيقة أو كخيوط .

(٣) إحتواء البطن على نسيج مخصوص يدعى الميسيتوم (Mycetome) وهو يأوى كائنات دقيقة يرجح بأن وظيفتها هى تبادل المنفعة مع الحشرات .

رتبة ثايزانوبترا (هديبة الأجنحة) (Order Thysanoptera)

[Fringe = Thsanos أى شرشوبة الأهداب ،
Wing = Pteron أى جناح]

وتشتمل هذه الرتبة على الحشرات الملقبة باسم التريس (Thrips) وهى تتميز بالصفات العامة التالية (شكل ١٥٧) :

- (١) حشرات دقيقة الأحجام نحيفة القوام ولها قرون استشعار مؤلفة من ٦ إلى ٩ مفاصل .
- (٢) الأجزاء الفمية ثابتة ماصة رحيمة الشكل ومكيفة للكحت (Rasping) ، وغالباً ما تكون غير متماثلة فى جهتها اليمنى واليسرى .
- (٣) يوجد زوجان متشابهان من أجنحة مطاولة شديدة الاستضافة وهوامشها مزودة بشرشوبة من أهداب طويلة ، والتعريق فيها مضمحل ، وفى حالة عدم الطيران توضع الأجنحة على الظهر موازية لبعضها وموازية لسطح الجسم .

- (٤) رسوغ الأرجل قصيرة جدًا وتنتهى بحويصلة (Vesicle) وليس بمخالب .
 (٥) لا يوجد قرنان شرجيان .
 (٦) التبدل الشكلى ناقص تدريجى ولكن توجد فى دورة حياة الفرد مبادئ من طور عذرائى .

وحشرات هذه الرتبة تؤم كثيرًا من أنواع النباتات كما وتوجد فى الخشب المتحلل ومع الفطريات وغير ذلك . ونادرًا ما تزيد هذه الحشرات عن أربعة ملليمترات فى الطول إلا أن أعداد الأفراد وافرة الكثرة . ونظرًا لكونها تمتص العصارة النباتية بشراهة فإن كثيرًا منها تعد أعداء ضارة للمحاصيل الزراعية ولأشجار الفاكهة ونباتات الزينة .

ولقد قسمت رتبة ثايزانوبترا إلى تحت رتبتين هما تيروبرانثيا وتيوبوليفرا وذلك كالآتى :
 ١ — تحت رتبة تيربر انثيا (Suborder Terebrantia) : وفيها يوجد للإناث آلة وضع بيض منشارية يوضع البيض بواسطتها فى داخل الأنسجة النباتية ، كما وتكون القمة القاصية للبطن مخروطية فى الأنثى ومستديرة فجائياً فى الذكر ، ويوجد بالجناحين الأماميين على الأقل عرق طولى واحد واصل لغاية الحافة الخارجية .

٢ — تحت رتبة تيوبوليفرا (Suborder Tubulifera) : وفيها لا توجد بالإناث آلة وضع بيض ولذا فالبيض يوضع فوق أجزاء النباتات ، كما وتكون القمة القاصية للبطن أنبوبية الشكل ومقطوثة بغتة فى كل من الذكر والأنثى والتعريق بالجناحين الأماميين يكاد يكون معدوماً .

قسم إندوبتريجوتا (الحشرات ذات الأجنحة الداخلية النمو)

Division: Endopterygota

رتبة نيوروبترا (معصبة أو شبكية الأجنحة)

(Order Neuroptera)

[A nerve = Neuron أى عصب ، Wing = Pteron أى جناح]

وتشتمل هذه الرتبة الحشرات الملقبة بالذباب الرومى (Alder flies) والذباب الشعبانى (Snake Flies) والحشرات الدنتلية الأجنحة (Lace Wings) وأسود المن (Aphid lions) وأسود التمل (Ant lions) وغيرها وهى تتميز بالصفات العامة الآتية (شكل ١٦١) :

(١) حشرات صغيرة إلى كبيرة ذات أجسام رخوة وقرون الاستشعار فيها جيدة النمو .

(٢) الأجزاء الفمية معدة للقرض ، والملامس الشفوية مؤلفة من ثلاثة حلقات بينما الملامس الفككية فلها خمسة حلقات .

(٣) يوجد زوجان من أجنحة غشائية لا تحتوى على فصوص خلفية (شرحية) والتعريق فيها عادة يتضمن فروعاً إضافية كثيرة وعريقات ضلعية (Costal Veinlets) عديدة وعروقاً عرضية وفيرة مما يجعل التعريق يبدو كالشبكة كما ويكون العرق ك ق (Rs) في العادة متشعباً تشعباً مشطياً ، وفي حالة عدم الطيران توضع الأجنحة على الجسم مائلة فوق الظهر على هيئة جمالون .

(٤) الرسغ في الأرجل مؤلف من خمسة عقل .

(٥) لا يوجد قرنان شرحيان .


(٦) التبدل الشكلى تام أو كامل ، واليرقات كامبودية الشكل (Campodie form) وأجزاءها الفمية قارضة أو ماصة ، وهى مفترسة وتعيش إما فى الماء أو على الأرض .

ولقد قسمت رتبة نيروبترا إلى تحت رتبتين وهما ميجالوبترا وبلانيبنيا وذلك كالاتى :


١ — تحت رتبة ميجالوبترا (Suborder Megaloptera) : وفيها يكون التعريق أكثر بدائية مع وجود عروق إضافية أقل ، كما ويكون تمشط (تفرع) العرق ك ق (Rs) عادة غير موجود ، وليرقاتها أجزاء فمية قارضة .

٢ — تحت رتبة بلانيبنيا (Suborder Planipennia) : وهى تشتمل على غالبية أنواع رتبة نيروبترا . وفيها يتميز التعريق بكون العرق ك ق (Rs) مشطياً وبكثرة تكوين تفرع ثانوى وخاصة على هيئة تشعبات ثنائية بالقرب من هوامش الأجنحة . واليرقات إما توجد على النباتات الخضراء أو فى التربة أو تعيش فى الماء ، وجميعها تمتلك أجزاء فمية ثاقبة إمتصاصية بارزة موحدة التصميم الأساسى فالفكين العلويين والفقين السفليين متآزرة وتحتصر داخلها قناة مص أخدودية الشكل تشفط خلالها السوائل الجسمية للضحية . كما وأن ستة من أنابيب ملبىجى الثمانية قد صارت غددًا حريرية بواسطتها تنسج اليرقات شرائقها عن طريق غازلة شرحية (Anal spinneret) . وكما فى تحت رتبة ميجالوبترا فتكون العذارى بدائية والحشرة الكاملة الفنارية (Pharate adult) تكون قادرة على المشى أو التسلق قبل أن تنبثق منها الحشرة الكاملة .


وأفراد رتبة نيروبترا منتشرة فى الأنحاء المختلفة من العالم ، والكثير منها هام من وجهة المكافحة الحيوية إذ تفترس يرقاته حشرات ضارة رخوة الأجسام كالن والحشرات القشرية والترس والتمل ، وبعضها أيضاً يتغذى على المواد العسلية التى تفرزها النباتات أو تفرزها بعض الحشرات من رتبة هومبترا .



شكل (١٦٠) : رتبة متشابهة الأجنحة Homoptera .




أسد المن



يرقة
أسد
المن



يرقة
أسد النمل



أسد النمل

شكل (١٦١) : رتبة شبكية الأجنحة Neuroptera .

رتبة ميكوبترا (طويلة الأجنحة)

(Order Mecoptera)

[Length = Mekos أى الطول ، Wing = Pteron أى جناح]

وتعرف حشرات هذه الرتبة بالذباب العقري (Scorpion flies) ، وهي تتميز بالصفات العامة التالية (شكل ١٦٢) :

(١) حشرات رخوة الأجسام ولرؤوسها إمتداد على شكل المنقار ، والأجزاء الفموية معدة للقرض .

- (٢) يوجد زوجان من أجنحة طويلة متماثلة وتعريقها بدائى والعريقات الضلعية قليلة .
 (٣) يوجد قرنان شرجيان قصيران .
 (٤) التبدل الشكلى تام ، واليرقات إما صدرية الأرجل (Oligopod) والعذارى تحمى بداخل حشرات ترابية .

وتوجد حشرات هذه الرتبة فى جميع أنحاء العالم وليس لها أهمية اقتصادية تذكر .
 وتتميز الحشرات المنتمية إليها بالرأس ذات المنقار وبالأجنحة الملطخة بالبقع وبآلة السفاد البارزة فى الذكور . وهى تفتقر عن رتبة نيوريترا فى كون العريقات الضلعية (Costal veinlets) عددها قليل وفى تشعب العرق ك (Rs) تشعباً ثنائياً وفى عدم إنقسام ز (Cu1) واعتياد الذكور على رفع نهاية بطنها ملوية إلى أعلى قد جعل لقب الذباب العقرى يطلق على أنواع جنس بانوربا (Panorpa) (شكل ١٦٢) وأقربائه .

والحشرات الكاملة تفضل الأماكن الظليلة ، وهى وكذلك يرقاتها مفترسة آكلة لحوم أساسياً . وتعيش اليرقات غالباً تحت سطح التربة . وتحمل يرقات جنس بانوربا (Panorpa) ثلاثة أزواج من الأرجل الصدرية وثمانية أزواج من الأرجل البطنية الكاذبة ، بينما فى يرقات جنس بورياس (Boreus) فلا توجد إلا الأرجل الصدرية فقط . وفى الجنس المذكور أخيراً تكون للحشرات الكاملة أجنحة مختزلة ، كما وأن يرقاته شاذة فى كونها تتغذى على طحالب .

رتبة لبيدوترا (حرشفية الأجنحة)


(Order Lepidoptera)

[Scale = Lepidos أى حشفة ، Wing = Pteron أى جناح]

وتشتمل هذه الرتبة على الحشرات المعروفة بالفراشات (Moths) وأبى دقيقات (Butter flies) ، وهى تتميز بالصفات العمومية التالية :

- (١) حشرات صغيرة إلى ضخمة الأحجام وأجسامها مكسوة بحراشيف هى عبارة عن شعيرات متحورة .
 (٢) الأجزاء الفمية بها جاليتى الفكين السفليين متحورتين إلى خرطوم مصاص ملتفة على نفسه زنيبركياً فى وقت عدم الاستعمال ، ونادراً ما يكون الفك العلويان موجودين .
 (٣) يوجد زوجان من أجنحة مغطاة بحراشيف ملونة تعطى الحشرات ألواناً زاهية غالباً .

(٤) التبدل الشكلي تام . واليرقات عديدة الأرجل (Poly podus) وتتغذى على نباتات وتسمى Caterpillars . والعذارى إما مكبلة (Obtect) أو حرة جزئيًا (Partially free) ، وتوجد غالبًا داخل شرنق (Cocoons) مصنوعة إما من حرير أو من طين معجون باللعاب .



شكل (١٦٢) : ذكر من رتبة ميكوبترا Mecoptera .

وأفراد هذه الرتبة تكون فيها الأجنحة والزوائد وجميع الجسم مغطاه بحراشيف ملونة ، وينجم عن وجود هذه الحراشيف فوق سطوح الأجنحة مظاهر لونية مميزة لكل نوع . وتتغذى الحشرات الكاملة عادةً على رحيق الأزهار وعصارة الثمار الزائدة النضج أو على الندوة العسلية وغير ذلك . بينما اليرقات فجميعها ما عدا شواذ قليلة تتغذى فقط على النباتات الزهرية (البذرية) فتأكل أوراقها أو ثمارها أو بذورها أو أخشاب سيقانها ، ولها في هذا الصدد أهمية إقتصادية كبرى .

ولقد اختلف التقاة في طريقة تقسيم رتبة لبيدوترا واتبعوا في ذلك قواعد مختلفة ، وأهم هذه التقسيمات ما يأتي :

أولاً : اتبع البعض طريقة تقسيم الرتبة إلى تحت ربتين وهما تحت رتبة روبالوسيرا (Suborder Heterocera) وتحت رتبة هيتروسيرا (Suborder Rhopalocera) وذلك على أساس أن تحت الرتبة الأولى (روبالوسيرا) تشتمل على الأبي دقيقات التي تتميز بكونها تهوى الشمس وتكثر رؤيتها في الجو الصحو ولا تطير عادةً ليلاً ويكون قرون استشعارها صولجانية (Clavate) ويكونها عندما تقف على الأوراق أو الأشجار تجعل أجنحتها مطبوقة على بعضها مع وضعها عمودية على الجسم (شكل ١٦٣) ، بينما تحت الرتبة الثانية (هيتروسيرا) فتشتمل على الفراشات التي تتميز بكونها ليلية ويكون قرون إستشعارها خيطية أو مشطية ويكون أجنحتها في حالة عدم الطيران لا توضع عمودية على الجسم (شكل ١٦٤) .

ثانياً : اتبع آخرون طريقة تقسيم الرتبة إلى تحت ربتين هما تحت رتبة ماكروليبيدوترا (Subor . Macrolepidoptera) أى حرشفية الأجنحة الكبيرة وتحت رتبة مايكروليبيدوترا (Subor . Microlepidoptera) أى حرشفية الأجنحة الصغيرة ، وذلك على أساس الحجم ، فالأولى ذات أحجام كبيرة ، والثانية أحجامها صغيرة .

ثالثاً : اتبع آخرون طريقة تقسيم الرتبة إلى تحت ربتين هما تحت رتبة جيوجاتا (Subor . Jugatae) وتحت رتبة فرينولاتا (Subor . Frenulatae) وذلك على أساس تركيب آلة تركيب شبك الأجنحة ، ففي حشرات تحت الرتبة الأولى (جيوجاتا) توجد آلة من النوع المزواجي (Jugate) إذ يوجد على الحافة الخلفية للجناح الأمامي عند زاويته المرفقية نوء متجه للخلف ويسمى المزواج (Jugum) وهو يشبك أثناء الطيران في ثنية بالحافة الأمامية للجناح الخلفي ، بينما في حشرات تحت الرتبة الثانية (فرينولاتا) فتوجد آلة من النوع الشنكلي (Frenate) حيث يوجد على الحافة الأمامية

للجناح الخلفى شوكة (فى الذكر) أو عدة شوكات (فى الأنثى) تدعى الشنكل أو الفرينيوم (Frenulum) وهى تشبك أثناء الطيران فى جهاز يوجد بالجناح الأمامى ويسمى المشبكية وهو عبارة عن خصلة من شعرات طويلة متكاثفة ومعقوفة الأطراف .

رابعاً : اتبع آخرون طريقة تقسيم الرتبة إلى تحت ربتين وهما تحت رتبة أوبتيكتى (Subor . Obtectae) وتحت رتبة إنكومبليتى (Subor . Incompletae) وذلك على أساس صفات طور العذراء ، ففي تحت الرتبة الأولى (أوبتيكتى) تكون العذراء من النوع المكبل (Obtect) حيث الزوائد (قرون الاستشعار والأرجل والأجنحة) ملتصقة بالجسم تماماً ولا يستطيع التحرك من الحلقات البطنية إلا ثلاثة حلقات فقط وهم الرابعة والخامسة والسادسة ولا تخرج العذراء من الشرقة ، بينما فى تحت الرتبة الثانية (إنكومبليتى) فتكون العذراء حرة جزئياً حيث زوائدها أقل إلتصاقاً بالجسم وبالبطن أكثر من ثلاثة حلقات فى استطاعتها التحرك وتخرج العذراء من الشرقة فتسعى إلى سطح الأرض أو قلف الشجرة لكى تيسر على الحشرة الكاملة الخروج فيما بعد إلى العالم الخارجى .

خامساً : اتبع آخرون طريقة تقسيم الرتبة إلى تحت ربتين هما تحت رتبة هومنيورا (Subor . Homoneura) وتحت رتبة هيترونيورا (Subor . Heteroneura) وذلك على أسس شكل التعريق فى الجناحين الأمامى والخلفى ، ففي تحت الرتبة الأولى (هومنيورا) يكون تعريق الجناح الخلفى مشابهاً لتعريق الجناح الأمامى ، بينما فى تحت الرتبة الثانية (هيترونيورا) فيكون التعريق مختلف فى الجناح الخلفى عما فى الجناح الأمامى .


سادساً : حديثاً اتبعت طريقة تقسيم الرتبة إلى ثلاثة تحت رتب وهى تحت رتبة زيوجلوبترا (Subor . Zeugloptera) وتحت رتبة مونوتريزيا (Subor . Monotrysia) وتحت رتبة دايتريزيا (Subor . Ditrysia) ، وذلك على أساس الأتى :

١ — تحت رتبة زيوجلوبترا (Subor . Zeugloptera) : وهى لا تتضمن إلا عائلة مايكوتريجيدي (Family Micropterygidae) حيث التعريق بدائى والأجزاء الفموية قارضة وفى الأنثى يفتح المهبل والمستقيم معا فى مجمع (Cloaca) مشترك على الاسترنة التاسعة البطنية .


٢ — تحت رتبة مونوتريزيا (Suborder Monotrysia) : وفيها يوجد الخرطوم المصاص بحالة بدائية على الأقل وفى الأنثى يوجد إما فتحة مجمع أو فتحات تناسلية على

الاسترنة التاسعة البطنية ، والتعريق غالباً بدائى شكاً فى عائلة ايريوكرانيائيدى (Fam . Eriocraniidae) وعائلة هيباليدي (Fam . Hepialidae) إلا أنه قد يكون مختلفاً .

٣ - تحت رتبة دايتريزيا (Suborder Dityrsia) : وهى تتضمن ما يزيد عن ٩٨ ٪ من حشرات الرتبة . وفيها يكون التعريق فى الجناحين الأماميين مختلف عما فى الجناحين الخلفيين حيث فى الأخيرين يكون العرق ك ق (Rs) مخنزل إلى عرق واحد ، وفى الأنثى توجد فتحة سفادية Opening of the bursa copulatrix على الاسترنة البطنية الثامنة ثم فتحة شرجية Anus فى نهاية البطن (الحلقة الحادية عشر) وفتحة لخروج البيض (Ovipore) على الاسترنة البطنية التاسعة .



شكل (١٦٣) : رتبة حرشفية الأجنحة.



شكل (١٦٤) : دورة حياة دودة الحرير *Bombyx mori* (رتبة حرشفية الأجنحة).

رتبة ترايكوبترا (شعرة الأجنحة)

(Order Trichoptera)

[Hair = Trichos أى شعرة ، Wing = Pteron أى جناح]

وتشتمل هذه الرتبة على الحشرات الشهيرة بذبذب الكاديس (Caddis flies) وهي تتميز بالصفات العامة التالية (شكل ١٦٥) :

- (١) حشرات فراشية الشكل لديها زوجين من أجنحة مغطاة بغزارة بالشعر وبها العروق الطولية سائدة فلا توجد إلا عروق عابرة قليلة العدد .
- (٢) الأجزاء الفموية مختزلة ، والفكان العلويان غير عاملين .
- (٣) التبدل الشكلي تام . واليرقات مائية وتسكن عمومياً في أكياس تحملها معها أثناء تجوالها ، وتوجد بها أرجل صدرية وأزواج من زوائد ذنبية متتية بخطاطيف . والعذارى مائية أيضاً ولها فكين علويين قويين .


والحشرات الكاملة في هذه الرتبة (شكل ١٦٥) ضعيفة الطيران وغالبًا ليلية وتوجد اعتياديًا بجوار الماء ، وهي مكفهرة الألوان إذ تشوبها عمومياً ظلال بنية أو رمادية ، وفي وقت الاستراحة تطبق الأجنحة على شكل سقف (جمالون) فوق الظهر . وتوضع البيضات في كتل إما في الماء أو بالقرب منه وتكون محمية عادة بمادة مخاطية .

ولجميع اليرقات رأس شديد التصلب تحمل قرني إستشعار قصيرين للغاية ، والزوج الأول في الأرجل أقصر وأغلظ من الزوجين الباقيين ، والبطن تتكون من تسعة حلقات تحمل الأخيرة منها زوجًا من زوائد ذنبية مقسمة لحلقات ومنتهية بمخاططيف .

والعذارى في هذه الرتبة تنفّس إما تنفّسًا جلديًا أو بواسطة خياشيم كما في اليرقة ، وتكون محمية إما بواسطة الأكياس الأصلية التي سبق أن صنعتها اليرقات أو بواسطة ماوى مخصوصة تكون اليرقات قد بنتها خصيصًا لهذا الغرض ، ويوجد بالعذراء فكان علويان قويان تستطيع بهما أن تشق طريقهما نحو الخارج توطئة لانبثاق الحشرة الكاملة . وفي كثير من الأنواع تكون الحشرات الكاملة الفنارية (Pharat adults) قادرة على السباحة لكي تصل إلى سطح الماء وهي تستعمل في هذا الشأن رجلي العذراء الوسطانيتين الطويلتين المجهزتين بشراشيب من شعرات عوامة .
وجميع أنواع هذه الرتبة عديمة الأهمية الاقتصادية .

Or. Trichoptera

Or. Strepsiptera



شكل (١٦٥) : رتبتي سترسبترا، ترايكيترا.

رتبة دييترا (ذات الجناحين)

(Order Diptera)

[Wing = Pteron أى جناح ، Di = Two أى إثنان ، Wing = Pteron أى جناح]

تحتوى هذه الرتبة على الحشرات المعروفة بالذباب الحقيقي (True flies) وهى تتميز بالصفات العامة التالية (شكل ١٦٦) :

(١) حشرات تتراوح أحجامها من متوسطة إلى متناهية الصغر ولديها زوج واحد من أجنحة غشائية هو الزوج الأمامى وذلك نظرًا لتحور الزوج الخلفى من الأجنحة إلى دبوسى توازن (Balancers or Haltetres) وهما زائدتين صولجانيتين بكل منهما أعضاء حسية تستطيع بواسطتها الحشرة أن تتعرف على مركزها فى الهواء أبان الطيران .
(٢) الأجزاء القمية إما لاعقة أو ثاقبة ماصة أو ثاقبة لاعقة وتكون عادةً على هيئة خرطوم .

(٣) التبدل الشكلى تام . واليرقات دودية الشكل (Vermiform) ويطلق عليها اسم الوسوسة (Maggot) وهى إما أرضية أو مائية أو طفيلية والعدارى إما مكبلية بصورة ضعيفة (Weakly obtect) أو حرة (Exarate) وتوجد داخل خدر عدراى (Puparium) متشكل عن آخر انسلاخة لليرقة فهو لا يتزعج بلى يستبقى ويتصلب صانعًا غلافًا حول العدراء . والمعتاد ألا توجد للعدراء شرنقة .

والذباب معظمه نهارى (Diurnal) وكثير منه يزور الأزهار من أجل لعق الرحيق بينما الكثير منه أيضًا فيتغذى على المواد العضوية المتحللة ومواد سائلة متباعدة . وكذلك من الذباب أيضًا أنواع تتغذى إما باقتراس حشرات أصغر منها أو بامتصاص دم الحيوانات الفقارية . والزوج الوحيد من الأجنحة محمول على الحلقة الصدرية الثانية . وأما جناحا الحلقة الصدرية الخلفية فقد تحورا إلى دبوسين توازيين . والأجزاء القمية تختلف كثيرًا باختلاف الفصائل (العائلات) غير أنه فى معظم الأحوال تكون الشفة السفلى المطاولة هى التى تصنع الجزء الرئيسى من الخرطوم .

ولقد قسمت رتبة دييترا إلى ثلاثة تحت رتب وهى نيماتوسيرا وبراكيسيرا وسايكلورافا وذلك كالآتى :

١ — تحت رتبة نيماتوسيرا أو خيطيات القرون (Suborder Nematocera) :

وهى تتميز بوجود قرون إستشعار كثيرة المفاصم وعادةً أطول من الرأس والصدر معًا وليس بها أريستا (Arista) كما وتكون الملامس الفككية مؤلفة من ٤ أو ٥ عقل .

والبرقات في العادة كاملة الرأس (Eucephalous) ويعمل فكاهها العلويان أفقيًا فيقومان بالقرض في حركة عرضية . والعذارى حرة (Exarate) .

٢ — تحت رتبة براكيسيرا أو قصيرات القرون (Suborder Brachycera) :

وهي تتضمن ١٤ عائلة مشتملة على ذباب يتميز بكون أجسامه غليظة وقرن استشعاره خنجرية قصيرة لا تصل إلى منتهى الصدر ومؤلفة عمومياً من ثلاثة مفاصم منها المفصم الأخير ممتد في هيئة مخراز أو خنجر (Style) كما وتكون الملامس الفككية مؤلفة من عقلة واحدة أو عقتين . والبرقات نصفية الرأس (Hemicephalous) وفيها الفككان العلويان قارضان عمودياً (حركتهما رأسية) ، والعذارى حرة .

٣ — تحت رتبة سايكلورافا أو دائريات الدروز (Suborder Cyclorrhapha) :

وهي أكبر التحت رتب الثلاث وتشتمل على أرقى حشرات رتبة دييترا . وتتميز بكون قرون الاستشعار مكونة من ثلاثة مفاصم ويحمل المفصم الطرفي منها شوكة ظهرية يطلق عليها الأريستا (Arista) ، كما ويكون الملمس الفككي مؤلفاً من عقلة واحدة . والبرقات عديدة الرأس (Acephalous) وعادةً ثنائية الثغور التنفسية (Amphipneustic) وبها الفككين العلويين مستبدلين بخطافين فميين (Mouth hooks) لا يتحركان إلا في المستوى العمودي، والعذارى مستورة داخل الجلد اليرقي الأخير (Puparium) .

رتبة سايفونابترا (غائبة الأجنحة ذات الفم المصاص)

(Order Siphonaptera)

[Tube or Pipe = Siphon أى أنبوبة أو مصاص ،

Wingless = Apterous أى غير مجنح]

وتشتمل هذه الرتبة على الحشرات المعروفة بالبراغيث (Fleas) وهي تتميز بالصفات العامة الآتية (شكل ١٦٧) :



(١) حشرات صغيرة جدًا غير مجنحة ومنضغطة الأجسام جانبياً وتعيش في الطور الكامل كطفيليات خارجية ماصة لدم الحيوانات ذوات الدم الحار كالإنسان والأرانب والكلاب والقطط والفيضان والطيور وغيرها .

(٢) قرون الاستشعار قصيرة توجد في تحويف خاص خلف الأعين التي لا تكون مركبة بل وقد تكون معدومة بالمرة .


(٣) الأجزاء الفمية معدة للثقب والمص .

(٤) إتصال الرأس بالصدر مباشر وعريض ، والأرجل الصدرية معدة للقفز والرسغ ذو خمسة عقل .


(٥) التبدل الشكلي تام ، واليرقات دودية الشكل (Vermiform) عديمة الأرجل ،
والعدارى حرة (Exarate) وتوجد بداخل شرائق حريرية خفيفة .




Or. Coleoptera




Or. Zoraptera



شكل (١٦٦) : بعض الرتب الحشرية .



برغوث



سِرْقَة
(عذبة الأرجل)

شكل (١٦٧) : رتبة خافية الأجنحة (البراغيث) Aphaniptera .

رتبة هايمينوترا (غشائية الأجنحة)

(Order Hymenoptera)

[Wing = Pteron أى غشاء ، Membrane = Hymen أى

جناح]

تشتمل هذه الرتبة على الحشرات الملقبة بالدبابير المنشارية (Sawflies) والنمل (Ants) والنحل (Bees) والدبابير الحقيقية (Wasps) وغيرها . وهى تتميز بالصفات العامة التالية :

(١) حشرات دقيقة إلى متوسطة الأحجام ذات زوجين من أجنحة غشائية والزوج الخلفى منهما أصغر من الأمامى وبالحافة الأمامية للجناح الخلفى سلسلة من الخطاطيف

الصغيرة (Hamulae) التى تشبك فى ثنية مواجهة لها بالحافة الخلفية من الجناح الأمامى ومتجهة إلى الجهة الظهرية وبذلك تحكم اشتباك جناحي نفس الجانب ببعضهما .

(٢) الأجزاء الفمية معدة للقرض واللعق (شغالة نخل العسل) أو القرض .
(٣) البطن بها الحلقة الأولى ملتحمة مع الحلقة الصدرية الأخيرة فتظهر كأنها جزء صغير .

(٤) توجد آلة وضع بيض إما ناشرة (Sawing) أو ثاقبة (Piercing) أو متحورة إلى زيان أو آلة لسع (Sting) .

(٥) التبدل الشكلى تام . واليرقات فى المعتاد إما عديدة الأرجل (Polypodous) أو عديمة الأرجل (Apodous) . والعذارى عمومياً حرة ومحتواة بداخل شرانق ، وغالباً ما يسبق العذراء طور يعرف بطور ما قبل العذراء (Prepupa) .

ولعل أثبت صفة من الصفات المميزة لرتبة هائمونيترأ هى التحام الحلقة البطنية الأولى الملقبة بالبروبوديوم أو الخصر الأولى (Propodeum) مع الحلقة الصدرية الخلفية ، وهو حدث يجرى فى طور ما قبل العذراء غير أن هذا الخصر غير واضح فى تحت رتبة سيمفايتا (Suborder Symphyta) ، وبما هو جدير بالملاحظة أن هذا البروبوديم يحمل الزوج الأول من الثغور التنفسية البطنية .


ولقد قسمت رتبة هائمونيترأ إلى تحت رتبتين هما سيمفايتا وأبوكريتا وذلك كالآتى :

١ — تحت رتبة سيمفايتا (Suborder Symphyta) :


وفىها تكون البطن عريضة وليس لها الاحتناق القاعدى المسمى بالخصر أو العنيق (Petiole) وراء البروبوديم الذى يكون مندمجاً اندماجاً جزئياً فقط مع الحلقة الصدرية الخلفية (شكل ١٦٨) كما ويكون مدور الرجل مؤلفاً من عقلتين وتكون آلة وضع البيض مستخدمة فى النشر . واليرقات فى هذه التحت رتبة آكلة نباتات وتملك أرجلاً صدرية وكذلك غالباً ما توجد بها أرجل بطنية كاذبة (شكل ١٦٨) .

٢ — تحت رتبة أبوكريتا (Suborder Apocrita) :


وهى تشتمل على غالبية حشرات الرتبة . وتتميز بكون البطن معنقة (مختصرة) القاعدة بسبب وجود انقباض واضح يدعى الخصر أو العنيق (petiole) فيما بين البروبوديم والحلقة البطنية الحقيقية الثانية ، كما وأن مدور الرجل يتركب من عقلة أو عقلتين ، وآلة وضع البيض تستخدم إما فى الثقب أو فى اللسع . واليرقات فى هذه التحت رتبة عديمة الأرجل (شكل ١٦٩ ، ١٧٠) .



تحت رتبة
Symphyta
(دبور)



تحت رتبة
Apocrita




برقة
Symphyta
(يرقة عديدة الأرجل)

شكل (١٦٨) : رتبة غشائية الأجنحة .



شكل (١٦٩) : شغالة نحلة العسل وبقعة نحلة العسل (عددية الأرجل)
 — رتبة غشائية الأجنحة.



شكل (١٧٠) : أفراد مستعمرة النمل (رتبة غشائية الأجنحة).

رتبة كوليفترا (غمدية الأجنحة)

(Order Coleoptera)

[Sheath = Koleos أى غمد أو غلاف ، Wing = Pteron أى

جناح]

وتشتمل هذه الرتبة على الحشرات المعروفة بالخنافس (Beetles) على اختلاف أشكالها . وهي تتميز بالصفات العامة التالية (شكل ١٦٦) :

(١) حشرات دقيقة إلى كبيرة الأحجام ولها زوجين من أجنحة ، الزوج الأمامي محور إلى غمدين (Elytra) سميكين صلبين ويلتقي هامشيتهما الداخليين معاً في خط مستقيم طولي فوق الظهر في حالة عدم الطيران بحيث يصنعان غطاءً يقي الجسم ، وأما الجناحان الخلفيان فغشائيين كبيرين وفي حالة الراحة يطويان على نفسيهما بحيث ينطويان تحت الغمدين تماماً ، وأما في حالة الطيران فالجناحين الأماميين ينفردان ليفسحا المجال لانفراد

الجنائحين الخلفيين اللذين يقومان وحدهما بعملية الطيران بدون مساعدة من الجنائحين الأماميين .

(٢) الصدر الأمامى كبير الحجم بالنسبة لكل من الصدر المتوسط والصدر الخلفى .

(٣) الأجزاء الفمية معدة للقرض ، والفكان العلويان كبيران .

(٤) التبدل الشكلى تام . واليرقات من طرز متباينة ولكنها لا تكون أبداً من الطراز عديد الأرجل (Polypodous) . والعذارى غالباً حرة وقليل منها مكبل ، وبعضها معرى وبعضها الآخر محمى إما بداخل أنسجة النباتات أو الأشجار العائلة أو فى صومعة من الطين تحت سطح الأرض ، ولكثير من العذارى شرائق ولكنها غير متقنة الصنع والمادة التى تنسج منها هذه الشرائق لم يعرف كنهها بعد ولا مصدرها بالضبط ما عدا فى بعض السوس حيث عرف أن الشرائق التى تصنع من إفراز ناتج من أنابيب مليجي .

ولقد قسمت رتبة كوليوپترا إلى ثلاثة تحت رتب وهى أركوستيماتا وأديفاجا وبوليفاجا وذلك كالآتى :

١ — تحت رتبة أركوستيماتا (Suborder Archostemata) :

وهى تحت رتبة صغيرة جداً ولكنها عتيقة (Archaia) وإلى حد ما شبيهة بتحت الرتبة الثانية من حيث الحشرة الكاملة وتحت الرتبة الثالثة من حيث اليرقة .

٢ — تحت رتبة أديفاجا (Suborder Adephaga) :

وفىها تكون قرون الاستشعار عادةً خيطية ويكون تجويفا حرقفتى الرجلين الخلفيتين كبيرين لدرجة أنهما يقسمان استرنة الحلقة البطنية الأولى تماماً ، كما ويحوى الجناح الخلفى خلية مستطيلة الشكل قصيرة تدعى الخلية المنحرفة (Oblongum) . واليرقات كامبودية الشكل (Campodei form) وبها رسوغ الأرجل واضحة الانعزال عن سيقانها ومنتهية عادةً بزوج من مخالب .

تحت رتبة بوليفاجا (Suborder Polyphaga) :

وهى تحتوى على الغالبية العظمى من حشرات الرتبة . وفىها تكون قرون الاستشعار متباينة الأشكال ولكنها غالباً صولجانية أو رقائقية أو مرفقية ، كما وأن تجويفى حرقفتى الرجلين الخلفيتين لا يقسمان تماماً أول استرنة بطنية ظاهرة ، وكذلك فالجنائحين الخلفيين لا توجد بهما الخلية المنحرفة ويحتويان على عروق عابرة قليلة . واليرقات على طرز متباينة للغاية إلا أن بأرجلها يتحد الرسغ مع الساق مكوناً قطعة مشتركة تعرف بالساق الرسغية (Tibiotarsus) وهى منتهية بمخالب واحد .

رتبة ستريسييترا (ملوية الأجنحة)

(Order Strepsiptera)

[Twisting = Strepsis أى ملتوية ، Wing = Pteron أى جناح]

وتعرف حشرات هذه الرتبة باسم الاستايلوبسيات (Stylopids) وهي تتميز بالصفات العامة التالية:

- (١) حشرات دقيقة الأحجام تعيش في أطوارها اليرقية كطفيليات داخلية في حشرات أخرى.
 - (٢) للذكور قرون استشعار متفرعة وأجزاء فمية قارضة مضمحلة وزوجان من أجنحة منهما الجناحين الأماميين متحورين إلى نتوئين صغيرين صولجائى الشكل بينما الجناحين الخلفيين فكبيرين جداً وبهما طيات شبيهة بطيات المروحة.
 - (٣) الإناث دائماً تقريباً عبارة عن طفيليات مضمحلة بداخل أجسام حشرات أخرى.
- وحشرات هذه الرتبة تعيش في أطوارها اليرقية كطفيليات داخلية وخصوصاً بداخل أجسام حشرات معينة تابعة لذوات آلات اللسع من رتبة هايمينوترا (غشائية الأجنحة) ولرتبة هيمييترا. فاليرقات في العمر الأول تكون عبارة عن مخلوقات نشيطة تدعى التريانجيلولينات (Triungulins) ثم متى قابلت العائل فهى تخفر فيه داخله إلى جوفه حيث يعتريها فرط تبدل (Hypemetamorphosis)، والحشرات الكاملة الإناث تستمر في الحياة كطفيليات بداخل العائل مع بروز الرأس والصدر المندمجين معاً من بين حلقتين متناحيتين من حلقات بطن العائل ما عدا في أحوال قليلة جداً حيث تكون الإناث نشيطة وطليلة المعيشة، أما الذكور (شكل ١٦٥) فتعيش لمدة قصيرة وهي تطير إلى العائل لكل تتزاوج مع الإناث.

المفاتيح التقسيمية

Taxonomic Keys

المفاتيح التقسيمية ما هي إلا سجل للصفات التقسيمية للمجموعات الحشرية تدون فيها بعد فصلها بطريقة ما بقصد اختيار بعض الصفات دون الأخرى لتعريف هذه الحشرات، فالمفاتيح تتعرف على المراتب التقسيمية والرتب والعائلات والأجناس والأنواع وهكذا. وتكوين المفاتيح يعتبر إمتداد لخطوة الوصف.

وتصميم المفاتيح عملية شاقة وتحتاج إلى مجهود ووقت كبيرين، ويعتمد فيها على الصفات التقسيمية الشديدة الأهمية والأكثر وضوحاً عن غيرها. ويتوقف إنشاء المفتاح النموذجي على الشروط التالية (انظر المنشاوى، ١٩٧٤):

- ١ — الصفات المثالية التي توضع في مفتاح التقسيم لا بد أن تنطبق بالتساوى على جميع الأفراد الداخلة في نطاق الجماعة المثالية، ويجب أن تكون الصفة ظاهرة خارجية على الحشرة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة كما يجب أن تكون ثابتة لا تدخل في نطاق الاختلافات الفردية لأفراد هذه المجموعة المثالية.
- ٢ — عند تصميم مفتاح يتضمن أنواعاً لم توصف من قبل يراعى أن يرتب هذا المفتاح بطريقة تجعل الأنواع الشديدة القرابة تقسيميا قريبة من بعضها في هذا المفتاح، وهذه الوسيلة يسهل تمييز وتوضيح الأنواع الجديدة.
- ٣ — المفتاح النموذجي هو الذي لا يمد القارئ بأكثر من صفتين متضادتين عند أية نقطة معينة فيه، فيجب اختصار الصفات المتضادة بقدر الإمكان.
- ٤ — يجب أن تتمكن من التعريف عند قراءة المفتاح دون الإشارة أو الإعتماد على الجنس المضاد أو الأظوار غير الكاملة مثل اليرقات والعذارى والتي تسجل صفاتها دائماً في مفاتيح خاصة.
- ٥ — لغة المفتاح كلغة الوصف يجب أن تكون مختصرة وتلغرافية وخالية من الأفعال وألفاظ وصل الجمل وتفضل فيه العبارات بفصلات منقوطة.

طريقة إنشاء المفاتيح:

قبل البدء في إنشاء المفتاح يجب حصر الصفات التقسيمية الهامة ثم ترتب هذه الصفات في جدول كما هو مبين في المثال الآتي، ومنه نستطيع بسهولة معرفة أوجه التشابه

وإختلاف فى جماعات الحشرات الموصوفة . والجدول الآتى يمحصر الصفات المثالية المختارة لثمانية أنواع مختلفة تابعة لجنس ما وعلى أساسها سيبينى المفتاح التقسيمى .

النوع	الأجنحة	قرون	لون قرون	الأعين	عقل	لون
					الرسغ	الأرجل
smithi	شفافة	خيطة	سوداء	كاملة الإستدارة	مستقيمة	سوداء
completa	معتمة	منشارى	سوداء	كاملة الإستدارة	مستقيمة	سوداء
emarginata	معتمة	منشارى	سوداء	غير كاملة الإستدارة	مستقيمة	سوداء
rufipes	معتمة	خيطة	سوداء	كاملة الإستدارة	مستقيمة	حمراء
nigripes	معتمة	خيطة	صفراء	كاملة الإستدارة	مستقيمة	سوداء
flavicornis	شفافة	خيطة	صفراء	كاملة الإستدارة	مستقيمة	سوداء
ruficornis	شفافة	خيطة	حمراء	كاملة الإستدارة	مستقيمة	سوداء
californica	شفافة	خيطة	سوداء	كاملة الإستدارة	ذات فصين	سوداء

وقد روعى التبسيط الزائد فى هذا المثال ، والصفات التى يوجد تحتها خط هى الصفات المستعملة فى عمل المفتاح .

أنواع المفاتيح Types of Keys

توجد فى المراجع المختلفة لعلم التقسيم عدة نماذج من المفاتيح تنحصر أنواعها فيما يلى :

- ١ - المفتاح المتعرج Indented Key
- ٢ - المفتاح ذو الأقواس Bracket Key
- ٣ - المفتاح المسلسل Serial Key
- ٤ - المفتاح المتفرع Branching Key
- ٥ - المفتاح الدائرى Circular Key
- ٦ - المفتاح الصندوقى Box-type Key
- ٧ - المفتاح المصور Pictorial Key

وأكثر هذه المفاتيح استعمالا فى مراجع التقسيم المختلفة هى الثلاث أنواع الأولى .

١ — المفتاح المتعرج

Indented Key

يمكن ترتيب الصفات الموجودة في الجدول للأنواع الثمانية في مفتاح متعرج كالآتي :
أ — الأجنحة معتمة

ب — قرون الاستشعار منشاوية .

ج — الأعين كاملة الإستدارة

completa

جـ جـ — الأعين غير كاملة الإستدارة

emarginata

ب ب — قرون الاستشعار خيطية

ج — الأرجل حمراء .

rufipes

جـ جـ — الأرجل سوداء

nigripes

أ أ — الأجنحة شفافة .

ب — عقل الرسغ مستقيمة .

ج — قرون الاستشعار سوداء .

smithi

ج ج — قرون الاستشعار حمراء .

ruficornis

ب ب — عقل الرسغ ذات فصين .

ج — قرون الاستشعار سوداء .

californica

ج ج — قرون الاستشعار صفراء .

flavicornis

٢ - المفتاح ذو الأقواس .

The Bracket Key

وفى هذا النوع من المفاتيح التقسيمية ترتب نفس الصفات السابقة كما يلى :

- ١ الأجنحة معتمدة
- ٢ الأجنحة شفافة
- ٣ قرون الاستشعار منشارية
- ٤ قرون الاستشعار خيطية
- ٣ (٢) الأعين كاملة الإستدارة
- completa
- emarginata الأعين غير كاملة الإستدارة
- ٤ (٢) الأرجل حمراء
- rufipes
- nigripes الأرجل سوداء
- ٥ (١) عقل الرسغ مستقيمة
- ٧ عقل الرسغ ذات فصين
- ٦ (٥) قرون الاستشعار سوداء
- smithi
- ruficornis قرون الاستشعار حمراء
- ٧ (٥) قرون الاستشعار سوداء
- californica
- flavicornis قرون الاستشعار صفراء

ويستعمل النوعين السابقين من المفاتيح التقسيمية ويتميزان بكثرة استعمالهما فى المراجع المختلفة ولكل منهما خصائصه من عيوب ومميزات وإن كان من الصعب على رجل التقسيم وضع مفتاح خالى من العيوب . وفى هذا الجدول مقارنة بين النوعين السابقين .

المفتاح المنعرج	المفتاح ذو الأقواس

- ١ - أقسام هذا المفتاح أكثر وضوحاً العلاقة بين أقسامه غير ظاهرة للنظر وتنبعا للنظر .

- ٢ — تظهر فيه الصفات المتضادة بعيدة عن بعضها وهذا عيب من شأنه أن يأخذ المفتاح مساحة كبيرة إذا كان كبيراً.
- ٣ — للعب السابق يفضل استعماله في حالة المفاتيح الصغيرة والتي تشمل المراتب العليا كالعائلات بقصد التعريف لا التشخيص، أى لا يصلح لمقارنة الأنواع وتحت الأنواع.
- تسجل فيه الصفات المتضادة متجاورة مما يسهل مقارنة الأنواع بعضها ببعض لذلك يعتبر مفتاحاً نموذجياً كما أنه يشغل مساحة أصغر إذا كان المفتاح طويلاً.
- يفضل استعماله في حالة التشخيص أى مقارنة الأنواع وذلك لسهولة تتبع الصفات التقسيمية فيه صعوداً ونزولاً وذلك بمتابعة الأرقام التي تشير إلى هذه الصفات بالنسبة للنوع تحت الفحص.

٣ — المفتاح المسلسل

The Serial Key

يقع المفتاح المتسلسل في المرتبة الثالثة بين أنواع المفاتيح التقسيمية وقد أنشأ هذا النوع بقصد الجمع بين مميزات المفتاحين السابقين (المتعرج وذو الأقواس) فهو يشارك المفتاح المتعرج في ترتيبه للجماعات في أقسام واضحة، وفي نفس الوقت بغرض المفتاح ذو الأقواس من ناحية قلة المساحة التي يشغلها هذا النوع من المفاتيح، لذلك يفضل في حالات المفاتيح الطويلة. ومن أهم عيوبه ظهور الصفات المتضادة فيه متباعدة جداً عن بعضها كما هو ظاهر في المثل الآتي الذي يبنى على أساس نفس الصفات التقسيمية في المفتاحين السابقين.

- ١ (٨) الأجنحة معتمة
- ٢ (٥) قرون الاستشعار منشارية
- ٣ (٤) العيون كاملة الإستدارة completa
- ٤ (٣) العيون غير كاملة الإستدارة emarginata
- ٥ (٢) قرون الاستشعار خيطية
- ٦ (٧) الأرجل حمراء rufipes
- ٧ (٦) الأرجل سوداء nigripes
- ٨ (١) الأجنحة شفافة

..... عقل الرسغ مستقيمة	٩ (١٢)
<u>smithi</u> عقل الرسغ ذات فصين	١٠ (١١)
<u>ruficornis</u> قرون الاستشعار حمراء	١١ (١٠)
..... عقل الرسغ ذات فصين	١٢ (٩)
<u>californica</u> قرون الاستشعار سوداء	١٣ (١٤)
<u>flavicornis</u> قرون الاستشعار صفراء	١٤ (١٣)


وقد سمي هذا المفتاح مفتاحاً متسلسلاً لتسلسل الأرقام الأولى منه .

أما بقية أنواع المفاتيح التقسيمية فقد وضعت لأغراض خاصة أهمها محاولة تعريف الحشرات لغير المتخصصين في دراسة هذه الكائنات، فالمفتاح المصور Pictorial Key ما هو إلا محاولة لتصوير بعض الصفات التقسيمية الظاهرة وترتيب هذه الرسوم مع توضيحها كتابة بطريقة ما يسهل تعريف الجماعات المختلفة لمن يهمهم الأمر من غير الحشريين .

أما الأنواع الأخرى الباقية كالمفتاح والدائري والصندوق ما هي إلا محاولات ذهنية لربط العلاقة بين جماعات الحشرات المختلفة بطريقة يدل عليها اسم المفتاح إذا كان دائرياً أو متفرعاً أو صندوقياً، فتوزع الصفات السابقة في مفتاح متفرع بالطريقة الآتية :


٤ - المفتاح المتفرع

The Branched Key



٥ - المفتاح الدائري

Circuler Key




٦ — المفتاح الصندوقى																	
الأجنحة معتمة					الأجنحة شفافة												
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
completa		emarginata		rufipes		nigripes		smithi		ruficornis		californica		flavicornis		flavicornis	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء		قرون الاستشعار صفراء	
العيون كاملة الإندارة		العيون غير كاملة الإندارة		الأرجل حمراء		الأرجل سوداء		قرون الاستشعار أسود		قرون الاستشعار أحمر		قرون الاستشعار سوداء		قرون الاستشعار صفراء			

Pictorial Key للمور و *Anopheles*



مفتاح لآفات البعوض الناصبة تجنس *Anopheles* المثل:

الأجنحة


اللامسي النكفية
طويلة
Anopheles



الرجل الظلمية



حافة الزرقاء البنية الناصبة على
الناصبة الزرقاء البنية وناصبة
الناصبة وناصبة



أو في بقع ناصبة على الناصبة
الناصبة وناصبة وناصبة
الناصبة وناصبة

دسغ الرجل الظلمية



= *A. gambiae*



= *A. pharoensis*

اللامسي القوي




عنان عند طرف



أعده عند طرف




حاشيت الرأس




وطيفة
وطيفة
= *A. ditarsi*


البرق الناصبة على ناصبة سوداء طويلة



= *A. sergenti*



= *A. superpictus*



= *A. multicolor*



الناصبة

الباب السابع عشر

علم الاحافير الحشرية

(Insect Palaeontology)

لعل من الاليق أن نغم المواضيع السابقة بذكر نبذة مفيدة عما تمخضت عنه الدراسات المصنية التى أجريت على أحافير (مستحجرات) الحشرات التى اكتشفت فى صخور مختلف العصور الجيولوجية يهدف محاولة التوصل إلى معرفة وقت ابتداء ظهور الحشرات فى الكون والأصل الذى تطورت عنه تلك الطائفة (الصف) وتسلسل تطور رتبها المختلفة عن طريق استقصاء العلاقات المشتركة بين الرتب الحشرية القديمة المنقرضة وبين الرتب الحشرية الحديثة الحية حاليا (انظر الصواف وآخرون ، ١٩٧٢) .

فالحشرات فى الحالة الاحفورية (المستحجرة) لم تلاقى الا فى طبقات جيولوجية معينة مواتية خصيصا لأن تحفظها وتصونها ، فهى قد وجدت بوفرة غالبا تحت تلك الظروف حيث يبدو أن ذلك راجع إلى الاحتمال بأن العينات قد تعرضت للغرق ثم غطيت على وجه السرعة بالجرين (Silt) أو غيره من المواد الرسوبية قبل أن يتسع أمام بقاياها الوقت لان تبلى بالكامل . وتبعاً لذلك فان بعضاً من أغنى المستودعات بالحشرات المستحجرة قد وجدت إما فى المتخلفات النباتية مثل الفحم والليجنيات والدبال وإما فى أحواض المياه العذبة سابقا . وكذلك وجدت أيضا حشرات كثيرة للغاية فى الكهرمان (العنبر Amber) حيث لاقت مصيرها فى الراتينج (Resin) الذى غلفها فى التو قبل أن تجد ثمة فرصة لتخليص أنفسها ، والواقع أن العينات التى دمغت وشربت بذلك الوسيط الطبيعى قد بقيت محفوظة بكامل هيئتها على أبدع حال .

وفى أكثرية الأحوال وجد أن المستحجرات الحشرية ممثلة بأجنحة فقط ، والظاهر أنه تحت ظروف الاستحجار كان البلى يدب بسرعة مما أفضى إلى أن أجسام الحشرات قد تحطمت فوراً وصارت مفصولة عن الأجنحة التى استطاعت بفضل خفتها أن تطفو مبتعدة وأن تتراكم فى مهاد معينة حيث مكنها بنائها الامتن من التصدى للتلف . وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن اعتمدت دراسة الاحافير الحشرية أساسيا على فحص تعريق الأجنحة وصار للمعلومات المستقاة من الاجسام والأجزاء الأخرى من معظم المستحجرات شأن ثانوى القيمة . ولم تتوافر الحشرات بكامل أجسامها الا فيما يختص بالمستحجرات

العنبرية للعصر الميوسيني ، ولكن نظرا لحدثة عهدها نسبيا فانها لم تقابل بمثل الاهمية الاستثنائية للذين حظيت بهما البقايا الأبرك الأقل اكتمالا . وعلى العموم فكل المعروف من المستحجرات الحشرية قد بلغ في الوقت الحاضر ١١٥٠٠ نوع منها نحو خمسها ينتمى إلى رتب وفصائل ليست موجودة في يومنا هذا .

ومع أن التقدمات الحديثة في علم الأحافير الحشرية قد ملأ إلى درجة محسوسة بعض النقص في معلوماتنا عن تطور أغلب الرتب الرئيسية ، إلا أننا مازلنا محتاجين من المستحجرات إلى دلائل مباشرة فيما يتعلق بأهم معضلتين في التاريخ التطوري الشعبي القبائلي للحشرات ألا وهما أصل الحشرات كطائفة (صف) وأصل الاجنحة . فأقدم ما اكتشف من الحشرات الجنحة ينتمى إلى العصر الكربوني الاعلى أى الأحدث (Upper Carboniferous) لأمريكا الشمالية ، ولكن واقع أن هذه الانواع وفيرة وكذلك متخصصة بالفعل في بعض الحالات يدفع إلى الاستنتاج بأن أبكر البترنجوتا (الحشرات الجنحة) لا بد لم يتأخر ظهورها عن العصر الديفونيائي (Devonian) أو العصر الكربوني الأسفل أى الأقدم (Lower Carboniferous) . فالبقايا الأثرولوجية التي وجدت في دقائق رايني تشيرت (Old red of scotland) كان من بينها كسرات مما يبدو عليه أنه أبترنجوتا (حشرات عديمة الاجنحة) ، وإذا كان هذا القرار صحيحا فإن هذه البقايا تعد أقدم المعروف من الحشرات المستحجرة ، وأما أقدم الحشرات الحية حاليا فهي فصيلة (عائلة) الصراصير (بلاتيدي) التي ثابرت عبر العصور الجيولوجية بدون أن تعثرها إلا تغييرات تطورية طفيفة منذ الأزمان الكربونية إلى اليوم الحالي .

والطبقات الأرضية التي وجدت فيها أغنى الاكتشافات الحديثة في الحشرات المستحجرة تعود إلى العصر البرميائي (Permian) والعصر الترياسي (Triassic) ، فالمستحجرات التي باحت بها تلك الصخور قد أماطت اللثام عن فونا حشرية مذهلة لدرجة أنها اثابت كل توقعاتنا بتغيرات محسوسة . وبالاختصار فيمكن القول بأن هذه الاكتشافات قد تسببت في كون سجلات الأزمان البرميائية والترياسية من الحياة الحشرية قد نقلت من مصاف أقل الاحقاب الجيولوجية صيتا إلى أذيعها شهرة بخصوص تلك الحيوانات .

الرتب الحشرية المعروفة على صورة مستحجرات فقط :

ان الحشرات المستحجرة التي وجدت بصخور العصرين الميزوزوي (Mesozoic) والباليزوي (Palaeozoic) تتضمن ممثلين من رتب تعد موجودة في الوقت الحاضر .

جدول رقم (١)

يبين الرتب الحشرية مرتبة بحسب تسلسل ظهورها على صورة مستحجرات
في العصور الجيولوجية المتتالية (الرتب المنقرضة مكتوبة بين قوسين)

الرتب الحشرية	الرباعي والحديث	الثلاثي	الطباشيري	الجوراسي	الترياس	البرميواي الأعلى	البرميواي الأسفل	الكربون الأعلى	الكربون الأسفل	الديفونيواي
كولمبولا										
(باليوديكتيونيترا)، (بروتودوناتا) (هيجاسيكونيترا)										
(بروتورثونيترا)										
أورثونيترا										
أودوناتا، أفيمبرونيترا، سوكونيترا هيميترا، هيكونيترا، نيورونيترا.										
(بروتوهيميترا)										
(بروتونيرلازيا) (بروتيليترونيترا)										
(بروتوكوليونيترا)										
بليكونيترا										
ديرمايترا، ثايز انونيترا، ديتيرا، ترايكونيترا، هاميمونيترا										
ثايزانيورا، أيسونيترا، امبيونيترا، ليدونيترا.										

وينحصر أهم تلك الرتب المنقرضة فيما يلى :

١ - رتبة البليوديكتيوبترا (Order Palaeodictyoptera)

أى رتبة مشبكة الاجنحة العتيقة ، وهى أقدم رتب الحشرات المجنحة وأقربها إلى البدائية . وتتميز بتابعها بالخصائص التالية :

- ١ - الرأس مدورة وتحمل زوجا من قرون الاستشعار الشعرية .
- ٢ - الصدر الامامى مجهز عموميا بنتوئين جانبيين شبيهين بالأجنحة المختزلة خارجين من الترجة .
- ٣ - الصدر المتوسط والصدر الخلفى مساويان لبعضهما تقريبا فى الحجم ومربعان فى الشكل .

٤ - الاجنحة مطاولة ومتصلة مع الصدر بقواعد عريضة . والزوجان متاثلان تماما من حيث الشكل والتعريق . ولا يحتوى الجناحان الخلفيان على الفص الشرجى المروحي الشكل المميز لكثير من الجاميع المبكرة .

٥ - التعريق أكمل مما فى أية حشرات أخرى . وصفاته البارزة هى كثرة تفرع أغلب العروق الرئيسية، ووجود فرعين واضحين للعرق الأوسط واستبقاء ثلاثة على الأقل (بل أكثر من ثلاثة فى المعتاد) من العروق الشرجية ، ووجود شكل شبكى غير منتظم يدعى الشكل الشبكى العتيق (أركيد يكتيون Archedictyon)والذى يتألف من عريقات دقيقة فوق غشاء الجناح بأجمعه .

٦ - البطن مطاولة ومحتوية على عشرة حلقات ، وبكل حلقة يوجد غالبا فسان جانبيين من طابع شبيه بقصى الصدر الأمامى إلا انها أقل وضوحا بكثير ، وعلى قمة البطن يوجد زوج من قرون شرجية نحيفة وغالبا مطاولة بشدة كما ويوجد أيضا فى بعض الاجناس خيط ذنبى وسطى .

والرتبة تكاد تقتصر فقط على الطبقات الدنيا والوسطى من العصر الكربونى الاعلى ، ويبلغ المعروف منها حوالى ١٦٠ نوع ، ويبدو أنها انحدرت فجائيا نسبيا حيث أنه يوجد لها ممثلون قلائل جدا فى صخور أواخر العصر الكربونى والعصر البرميوى .

٢ - رتبة بروتورثوبترا (Order Protorthoptera)

أى رتبة مستقيمة الاجنحة الأولية . وتشتمل هذه الرتبة على مجموعة من أنواع أورثوبتراوية تمثل الاسلاف القديمة لبعض من الجاميع الجارية والقافزة الحية حاليا من رتبة أورثوبترا . وهى عبارة عن فصيلة جانبية مبكرة من رتبة البليوديكتيوبترا بدليل احتفاظ

توابعها بكثير من خصائص نظام التعريق الخاص بالرتبة الأخيرة ، إلا أن هؤلاء التوابع
يمتازون بالصفات التالية :

- (١) الامتدادان الخارجان جانبيا من ترجمة الصدر الامامى (وهما بارزان جدا فى
الباليوديكتيوترا) يوجدان فى أنواع معينة فقط دون الباقي .
- (٢) الحلقة الصدرية الأمامية أكثر تخصصا فتكون مطاولة بنحو ملحوظ فى بعض
الأنواع وأعرض وأقرب إلى هيئة الدرع فى بقية الأنواع .
- (٣) الجناحان الأماميان أعرض من الجناحين الخلفيين نظرا بالأخص لثمو فص
شرجى مروحي الشكل .
- (٤) التعريق محتفظ بالشكل الشبكي العتيق البدائى ، والعرق الاوسط منقسم إلى
فرعية الاساسيين .

ولقد تواجدت أنواع هذه الرتبة ابتداء من العصر الكربونى الاعلى لغاية العصر
التراسى ويقدر عددها بحوالى ٢٠٠ نوع .

٣ رتبة ميجاسيكوترا (Or. Megasecoptera)

وهى تمت بقرابة لرتبة البروتودوناتا (الرعاشات الأولية) ولكن تتميز عنها بالقرنين
الشرجيين المطاولين ويكون قواعد الاجنحة مستفيضة أو مختصرة وبوجود عرق شرجى
للبروتودوناتا . وقد وجدت بقايا هذه الحشرات فى العصر الكربونى الاعلى بفرنسا وانجلترا
وأمریکا الشمالية وفى العصر البرميوى الاسفل بأمريكا الشمالية .

٤ — رتبة بروتودوناتا (Or. Protodonata)

أى رتبة الرعاشات الأولية وتوابعها وتفرق بسهولة عن الأودوناتا الحالية بغياب العقدة
(Nodus) الوصمة الجناحية (Pterostigma) من على الاجنحة . كما ويتميز تعريقها
عن تعريق الباليوديكتيوترا بكون العريقات العابرة المكونة للشبكة واقعة على زاوية قائمة مع
العروق الاساسية وفروعها (بدلا من أن تكون غير منتظمة وممتدة بميل) وبوجود عرق
شرجى وحيد . وحشرات هذه الرتبة من حيث الصفة الأخيرة تقارب حشرات
الميجاسكوترا غير أن القواعد العريضة للاجنحة والشبكة المتضامة من العروق العابرة
سرعان ما تفرق بين الاثنين . ضمن الرتبة أضخم الحشرات المستحجرة على الإطلاق
إذ يزيد عرض الاجنحة وهى مفردة فى بعض الأنواع عن قديمين . وقد وجدت الرتبة فى
العصر الكربونى الاعلى بفرنسا وانجلترا وفى العصر البرميوى الاسفل بأمريكا الشمالية
وألمانيا .

٥ — رتبة بروتوبيرلاريا (Or . Protoperlaria) :

أى رتبة بيلاريا أو بليكوترا (مطبقة الاجنحة) الأولية . وتختلف هذه الرتبة عن رتبة بيرلاريا أو بليكوترا الحالية فى وجود خمسة عقل برسوغ الأرجل وفى وجود امتدادين كبيرين خارجين جانبيا من ترجة الصدر الامامى وفى وجود الفرعين الرئيسيين للعرق الأوسط . حتى الآن لم يعثر على ممثل هذه الرتبة إلا فى الصخور البرمياوية بكانساس (بأمريكا الشمالية) وبشمال روسيا . وتوابع هذه الرتبة تتفق مع التوابع الأميل للبدائية من رتبة بليكوترا الحالية من حيث القسمات العمومية بما فى ذلك وجود القرنين الشرجيين وغياب الامتداد الذنبى . الأوسط ومن حيث الشكل العام للأجنحة واحتواء الزوج الخلفى منها على منطقة شرجية ضخمة مروحية الشكل . ومن السهل التفرقة بين هذه الرتبة وبين رتبة البليوديكتيوبترا بالفص الشرجى الكبير وغياب الشبكة الغير منتظمة من العريقات العابرة المصطفة بميل .

٦ — رتبة بروتوهيميپترا (Or . Protohemiptera) :

أى رتبة نصفية الاجنحة الأولية . وقد وجدت حشرات هذه الرتبة فى العصر البرمياوى الأسفل بالمانيا وفى العصر التراياسى الأوسط والأعلى بنيوساوث ويلز (بأستراليا) . وتعد حشرات الرتبة ضمن أضخم ما اكتشف للآن من المستحجزات الحشرية إذ قدر امتداد الأجنحة فى أحد أنواعها بنحو ١٦ سنتيمترا . وتتميز الرتبة بوجود امتدادين خارجين جانبيا من ترجة الصدر الأمامى ومشابهين جدا للموجودين فى البليالوديكتيوبترا والبروتوبيرلاريا . والرأس صغيرة نوعا وبها أجزاء فمية بارزة من الطراز الثاقب الماص . والجناح برتمه مشغول بشبكة من عريقات عريضة رهيبة وثيقة التجاور .

٧ — رتبة بروتوكوليپترا (Or . Protocoleoptera) :

أى رتبة غمدية الاجنحة الاولى . وقد أسست هذه الرتبة فى أول الأمر بناء على اكتشاف نموذج لجناح غمدى يبلغ طوله ٢٤ ملليمترا فى صخور العصر البرمياوى الأعلى بنيوساوث ويلز . والظاهر أن هذه العينة وما اكتشف بعدها من عينات أخرى تشير إلى تواجد رتبة بدائية سلفية لرتبة كوليبوترا الحالية إلا أنها تملك أجنحة غمدية مبططة ذات هامش درزى الشكل وجهاز كامل من التعريق غير أن الاخير مخالف تماما لتعريق الجناح الغمدى لأية واحدة من خنافس كوليبوترا الحقيقية المعروفة حاليا حيث تكون العروق الرئيسية بسيطة وغير متفرعة على طول امتدادها والمنطقة الشرجية مختزلة للغاية بينما فى البروتوكوليپترا فالمنطقة الشرجية ممدودة قاعديا والعروق الرئيسية كثيرة التفرع .

٨ — رتبة بروتيليتروبترا (Or . Protelytroptera) :

وقد أطلق هذا الأسم أولا على البقايا الحشرية التي وجدت في الحجر الجيري لصخور العصر البرميواي الاسفل بكانساس (أمريكا الشمالية) ، ثم اكتشفت بعد ذلك عينات أخرى مكنت من التوسع في دراسة هذه المستحجرات مما أدى إلى معرفة قدر كبير من المعلومات عن شكلها الخارجى بعكس الاجزاء الفمية فلم يسלט للآن أى ضوء على طابعها . ففى الاجناس الاقل تخصصا كان الجناحان الأماميان عبارة عن جناحين غمديين محدبين ومنطقتهما الضلعية متسعة ومحتويين على ثلاثة عروق شرجية بسيطة بينما العروق العابرة فغائبة . وأما فى الاجناس الاخرى فكان التعريق أشد تخصصا بطريق النقصان . وكان الجناحان مهيئين بجلاء للانطواء ومحتويين كالحال فى رتبة ديروماترا (جلدية الاجنحة) الحالية على عروق أمامية متحورة للغاية وعلى مروحة شرجية كبيرة مشتملة على عدد من العروق الشرجية المتشعبة ، وكان الصدر الامامى كبيرا ، والرأس مغسلة من خمس عقل ، وقرنا الاستشعار متألفين من حوالى ٢٢ علقه .

التاريخ الجيولوجى للحشرات :

يقصد بذلك بيان تسلسل ظهور البقايا الحشرية فى الأزمان الجيولوجية المتتالية ثم تقصى ما فى الماضى البعيد لهذه الحيوانات من وقائع أساسية على ضوء مختلف الاكتشافات الحديثة . والجدول المرفق يوضح ذلك التسلسل ومنه يتبين أنه للآن لم تكشف أية مستحجرات حشرية فى صخور العصور السابقة للعصر الديفونيواي . وفيما يلى نبذة مختصرة من المستحجرات الحشرية التى اكتشفت فى مختلف العصور الجيولوجية :

(١) العصر الديفونيواي : Devonian

البقايا الحشرية المنتمية لهذا العصر عبارة عن كسرات صغيرة للغاية وجدت فى رقايات راينى تشيرت من الحجر الرملى الأحمر المتوسط القدم باسكتلندا ويتألف أكمل تلك البقايا من أجزاء من محفظة الرأس والاجزاء الفمية وقرون الاستشعار لنوع معين اعتبر كحشرة كوليپولية قديمة . أما بقية المستحجرات فتألف فقط من فكوك علوية قد أحييت إلى نوع معين ينتمى بالارجحية إلى رتبة ثايزانيورا . ومع أن هناك احتمالا قويا بأن هذه الانواع تنتمى بحق إلى تحت صف أبتريجوتا (الحشرات عديمة الاجنحة) فمن الجدير بالملاحظة أنه لم يماط اللثام للآن عن أية بينة عن وجود مثل هذه الحشرات فى صخور مختلف العصور التالية لغاية فترة الاوليجوسين (Oligocene) .

(٢) العصر الكربوني : Carboniferous

لقد وجدت بقايا حياة حشرية بقدر أوفر في أثناء هذه الفترة . فقد تواجدت أبكر النماذج التي لا يتطرق إليها شك من صف الحشرات في الطبقات السفلية من صخور العصر الكربوني الأعلى لأمريكا الشمالية . وكانت هذه الفونا المبكرة متألفة تقريبا من اليوديكتيوبترا وپروتورثوبترا وپروتودوناتا وميجاسيكوبترا وبلاتيدى . وباستثناء الرتبة المذكورة أخيرا (بلاتيدى) فكل تلك المجموع منقرضة في الوقت الحاضر ، فهي أشكال أسلافية قد اشتقت منها طرز أحدث . ولا تقدم أى من تلك الرتبة أية دلالة عن أصل الحشرات كصف ، الا أن وفرتها بالاضافة الى مرتبتها التخصصية العالية نسبيا في بعض الاحوال إنما تدل بجلاء على أن رفات أمعن في القدم من الحياة الحشرية ما تزال تنتظر الكشف عنها في صخور عصور سابقة . ويبدو أن كثيرا من حشرات العصر الكربوني كانت ضخمة الحجم بطيئة الحركة ضعيفة الطيران ، وهي صفات لربما تكون قد ساهمت نحو إندثارها المبكر ، وذلك باستثناء البلاتيدى التي احتفظت بقسماتها العامة مع تحويرات طفيفة نسبيا لغاية وقتنا الحالى .

(٣) العصر البريماوى : Permian

لقد أثبتت الاكتشافات الحديثة أن الأزمان البريماوية كانت حافلة بالمستحجزات الحشرية المثيرة لاعظم الاهتمام . ففي صخور العصر البريماوى الأسفل وجد أبكر الحشرات المعروفة من الهولوميتابولا (الحشرات كاملة التبديل) ممثلا بعدد من رتبتي نيوروبترا (شبكية الاجنحة) وميكروبترا (طويلة الاجنحة) . كما اقتضرت البروتيليتروبترا الشبيهة بالخنفاص على شتى صخور تلك الفترة التي احتوت أيضا على سلاسل وفيرة من الميجاسيكوبترا . وفي نفس تلك الطبقات وجد أيضا أبكر الأنواع المعروفة من ذباب مايو الحقيقى وكذلك عدّد من الأنواع الأعم التي تؤلف رتبة پروتوبيرلاريا علاوة على مستحجرة لنوع ينتمى إلى رتبة پروتوهميبيترا . ومن الجدير بالذكر أن أقدم المسجل من المستحجزات الهميبيترا الحقيقية والذي وجد في العصر البريماوى الأسفل بكانساس بأمريكا الشمالية يعد نفس العمر تقريبا . والرعاشات الكبيرة (التنينية) الحقيقية ظهرت أيضا في الأزمان البريماوية الأقدم إلا أنها تختلف بما فيه الكفاية عن الانواع الحية حاليا لدرجة أنها وضعت في تحت رتبة مستقلة تدعى پروتوزايجوبترا (Suborder Prtozygopera) حيث أنه في هذه الرعاشات التنينية المبكرة لم تكن توجد الخلية الشبيهة بالقرص ولا الوصمة الجناحية اللتين هما من خصائص الأنواع الحالية . وكذلك كانت السوكوبترا (Or . Psocoptera) قديمة العهد للغاية فوجدت منها نماذج لأنواع يبدو أنها تحت رتبتين إضافيتين منقرضتين .

وأما من ناحية الأزمان البريماوية الأحدث فقد كشفت صخورها في استراليا وروسيا الشمالية عن سجلات وفيرة لحياة حشرية . ففي استراليا قدمت مهاد بيلمونت (Belmont beds) بنيو ساوث ويلز مزيداً من الأدلة عن وجود حشرات من رتبة هيميترا ، كما ظهرت أبكر البليكويترا الحقيقية في هذه الفترة ، وكذلك بدأت تظهر الباراميكويترا (وهي الاسلاف المحتملة لرتبتي تريكويترا ولبيدويترا سويا) بمصاحبة أبكر المعروف من مستحجرات كوليويترا . وكذلك وجدت النيورويترا في أثناء العصر البريماوى الأحدث . وفي روسيا وجدت نماذج من رتبتى نيورويترا وهيميترا كما سجلت أيضا بقايا لحشرات يعتقد بأنها من رتب ذباب مايو وميكويترا وسوكويترا .

وجميع رتب العصر الكربونى القديمة قد امتدت إلى أزمان بريماوية ، فالبروتورثويترا والبلايتيدى كانت وفيرة . ولكن الميجاسييكويترا على الرغم من شيوعها في باكورة العصر البريماوى فيبدو أنها انقرضت وتلاشت عند أواخر ذلك العصر . والباليوديكتيوترا التى خبطت فعلا خطوات كبيرة نحو الاضمحلال قد مثلت بنماذج في صخور العصر البريماوى الاسفل بكانساس ولربما كذلك ببعض كسرات من أجنحة بصخور العصر البريماوى الأعلى بروسيا ، والبروتودوناتا التى كانت بالمثل في سبيل الاضمحلال مثلت بآخر نماذج في مهاد كانساس .

(٤) العصر الترياسى : Triassic

لقد كشفت الإكتشافات الحديثة في الصخور الإسترالية من العصر الترياسى عن وجود فونا حشرية غنية . ففي مهاد إيسويتش (Ipswich beds) بنيو ساوث ويلز أظهرت الهيميترا تقدماً وتخصصاً أكثر مما في الحقب السابق كما كانت مجموعة سائدة حيث مثلت بأنواع عظيمة التباين ، ومثلت الميكويترا بنموذج محفوظ بحالة سليمة تثير الدهشة ، كما وجدت أيضاً في مهاد إيسويتش مستحجرات لحشرات اعتبرت بمثابة رتبة مستقلة سميت باراتريكوبترا (Paratrachoptera) . وفي هذا العصر وجدت عينات من رتبة نيورويترا ومن الرعاشات الكبيرة كما كانت الكوليوترا الحقيقية وفيرة . ومن الجدير التنويه إلى أن الرتبة الكربونية بروتورثويترا إمتدت إلى العصر الترياس . وأن بعضاً من البلايتيدى الترياسية لا تختلف إلا قليلاً جداً عن تلك الموجودة أثناء الحقب الباليوزوى ، وأن في مصاحبة تلك الطرز الورتوتيرية البدائية وجدت أيضاً نماذج تابعة بحق لعائلة الجرارد قصير القرون وأنواع تمت بقرابة إلى عائلتى أفراس النى والجرارد طويل القرون .

٥ - العصر الجيوراسى : Jurassic

لقد نال العصر الجيوراسى شهرة من واقع أن كل الرتب الحشرية الرئيسية ماعدا رتبة لبيدوبترا قد آتت إلى الوجود قبل انتهائه . فقد وجدت أبكر الهاميينوترا الحقيقية فى طبقات العصر الجيوراسى الأعلى بإنجلترا وبافاريا وأسبانيا وتركستان ، والديتيرا الحقيقية المنتمية إلى سلسلة أورثورافا ظهرت لأول مرة فى العصر اللياسى الأعلى بأوروبا (Upper Lias of Europe) ومعها أبكر المعروف من مستحجرات الترايكوبترا . وفى الأزمان اللياسية (Liassic Times) بأوروبا كانت الرعاشات الكبيرة من تحت رتبة أنيسوزايموبترا (Subor. Anisozygotoptera) انقرضة تقريباً الآن موجودة بكثرة ، كما ظهرت الانيسوبترا الحقيقية لأول مرة فى العصر الجيوراسى الأعلى . وفى صخور تعود للعصر الجيوراسى الأوسط وجد قليل من الأجنحة والحوريات لبعض البلييكوبترا المبكرة فى سايبيريا ، والنيوروبترا مثلت جيداً فى العصر اللياسى والعصر الجيوراسى الكوليوبترا (وجدت بكثرة فى صخور ذلك العصر فى أوروبا) ، بينما كل من تحت رتبتي رتبة هيميبترا فقد مثلت فيه ببقايا مستحجرة محفوظة جيداً ، وكذلك وجدت الميكوبترا بكثرة فى العصر اللياسى الأسفل بإنجلترا .

٦ - العصر الطباشيرى : Cretaceous

لم يوجد فى صخور هذا العصر إلا بقايا متناثرة لكسرات من حشرات . وعلى وجه العموم فالكوليبترا سادت فى العصر الطباشيرى الأسفل بإنجلترا والعصر الطباشيرى الأعلى فى بوهيميا . وفى طبقات العصر المذكور أخيراً كشف النقباب عن كسرات من حشرات يمكن أن تعزى إلى رتب أخرى ولكنها كانت محفوظة براءة لدرجة يستحيل معها تحديد تبعيتها بالضبط . وكذلك أميط اللقاص فى الصين فى طبقات العصر الطباشيرى عن سلسلة واسعة ومبعثرة جداً من نماذج تنتمى إلى رتب حشرية موجودة حالياً . وإنما لاينفى أن يعزى ذلك إلى القلة الفعلية لتلك الحيوانات أثناء تلك الفترة بل على الأصح إلى غياب رواسب المياه القلة الفعلية لتلك الحيوانات أثناء تلك الفترة بل على الأصح إلى غياب رواسب المياه العذبة الملائمة التى كان يتأقنى أن تتجمع فيها النماذج وتصبح مستحجرة . والواقع أن الظهور الفجائى نسبياً لنماذج راقية من لبيدوبترا وهاميينوترا الاكيليواتية وديتيرا السايكلورافية فى باكورة العصر الثلاثى توخى إلى أن تلك المجموع لا بد وأن كانت ممثلة بسوابق فى الأزمان الطباشيرية .

٧- العصر الثلاثي : Tertiary

كثير من الطبقات الرسوبية للعصر الثلاثي كانت حافلة بالحشرات فهي قد أمدتنا بحوالى ثلاثة أرباع المعروف من الأنواع المستحجرة حيث ترتب العصرية ممثلة بأجمعها تقريباً. فالواقع أن فونا تلك الأزمان مأخوذة ككل لم تختلف بنحو محسوس من حيث التركيب عن فونا الوقت الحاضر، وحتى في أثناء الأوليجوسين (Oligocene) وهو فترة مبكرة نسبياً في العصر الثلاثي فقد كانت الحشرات شبيهة تماماً بالحشرات السائدة حالياً. فالكو ليمبولا والتايزانورا كانت ممثلة جيداً في المهاد العنبرية البلطيقية (Baltic amber beds) للفترة الأوليجوسينية. وأبكر الايسوترا تواجدت في الأزمان الايوسينية (Eocene) ثم صارت أكثر شيوعاً في الأوليجوسين والميوسين (Miocene)، وأما لبيدوترا فقد تواجدت في صخور الزمن الميوسيني فما فوق، ولكن من المؤكد تقريباً أن هذه الرتبة قد نشأت قبل العصر الثلاثي، بل ويمكن أن نضيف قائلين أن الاتفاق الورقية المعينة الراجعة للعصر الطباشيري الأعلى هي على الأرجح جداً من عمل يرقاتها، ووجدت الكوليوترا بكثرة للغاية في صخور العصر الثلاثي، إذ أن عدداً من أجناس الوقت الحاضر كانت متواجدة في الأزمان الايوسينية كما استخرج ماينوف على ٤٣٠ نوع من الخنافس من المهاد العنبرية البلطيقية للعصر الأوليجوسيني بل وقد جمع عدداً أكبر من ذلك من الرواسب الميوسينية لفلوريسان (Florissant) في كولورادو (بأمريكا الشمالية). بينما أبكر المعروف هايمينوترا الاكيلياتية (اللاسعة) فقد ظهر ابتداء من فترة الايوسين وواضح أن هذه المجموعة كانت واحدة من أواخر ما تطور من المجاميع الحشرية الكبرى، وكذلك كانت مستحجرات جميع كبار عائلات هايمينوترا الطفيلية موجودة بكثرة في صخور العصر الأوليجوسيني الأسفل، والديتيرا الراقية وجدت على صورة مستحجرات في الصخور الايوسينية ثم صارت وفيرة في الأوليجوسين، وكذلك كان أغلب بقية الرتب الحشرية ممثلة في العصر الثلاثي بما في ذلك رتب امبيوترا وسترسبيتيرا وأفانييترا.

التاريخ التطوري للرتب الحشرية الحديثة والمستحجرة :

The Phylogene of Recent and Fossil Order Of Insectes

منذ الاكتشافات الأولى توالى اكتشافات جديدة تجمع على أثرها قدر كبير من المعلومات المستجدة في الأعوام الأخيرة. وفي ضوء هذه التقدمات الحديثة يمكن تلخيص النتائج الهامة التي توصل إليها العلماء بشأن السيرة التطورية للرتب الحشرية المنقرضة والحديثة فيما يلي :

١ - أبكر ما وجد في صخور العصر الكربوني من بقايا حشرية مستحجرة كانت

عبارة عن أنواع إكسوتريجوتية متمتعة بأجنحة ضخمة على درجة مقبولة من الكفاءة ، كما كانت هذه مصحوبة بكسرات من حويزات معاصرة ، وهو أمر يشير إلى أن تلك الحشرات كانت خاضعة لتبدل شكلي غير تام (ناقص) ، وقد وضعت هذه الحشرات القديمة في رتبة الباليوديكتيوبترا التي تعد أقدم الرتب المنقرضة .

٢ — تبدى رتبة بروتوتوبترا تقدمًا أكيدًا على الباليوديكتيوبترا ، ويتضح ذلك مثلاً من تركيب صدرها الذي يدل على أنها اكتسبت بعض المقدرة على الجرى بعكس الرتبة السلفية (الباليوديكتوبترا) فكانت لديها على الأرجح قدرات ضعيفة على المشي الأرضي إذ كانت تلجأ إلى الطيران طرانات فجائية قصيرة ، بل إن هذه الأنواع المبكرة الشبيهة بالاورثوبترا تظهر إزديادًا في درجة نماء الجناحين الخلفيين كما وأن المنطقة الشرجية المتسعة لهذين العضوين تعد خطوة تقدمية واضحة على الباليوديكتيوبترا حيث الأجنحة الأمامية والأجنحة الخلفية ماثلة لبعضها إلى حد كبير .

٣ — الميجاسيكوبترا كانت رتبة متخصصة وبنحو جلي ، فاستضافة قواعد أجنحتها واختزال تعريفها يدل على أنها لابد كانت عبارة عن فسيلة جانبية مخصوصة من الباليوديكتيوبترا . ويعتقد تيلارد (١٩٢٨) بأن أحد أجناس هذه الرتبة وهو جنس بروديا (Brodia) عبارة عن طراز سلفي للبروتودوناتا والأودوناتا وأن هاتين الربتين عبارة عن نمطين حائدين من الميجاسيكوبترا إلا أن هذا الرأي ليس مبنياً إلا على أساسيد واهية جداً ولذا لقي معارضة شديدة من جانب باقي علماء الاحافير واعتبر مرفوضاً .

٤ — يبدو أن الباليوديكتيوبترا قد نشأت من فسيلة جانبية أخرى هي البروتوبيرالرا التي تستعرض طراز من التعويق يسرح بالخيال إلى البليكوبترا .

ومن البروتوبيرالرا توجد طرز أكثر تقدمًا تبدى صفات تعد سلفية بالنسبة للأنواع البدائية من البيرالرا (أى البليكوبترا) الحية حاليًا مما يشير إلى أن الأخيرة ربما كانت سليلية من الأولى . كما وقد اكتشفت محفوظا في الصخور الباليوزية المنتمية للعصر البرميواى الأعلى جنس بليكوبتراوى أصيل هو جنس ستينوبيرليديم (Stenoperlidum) الذى ينتمى بجلاء إلى عائلة (فصيلة) يوسثينيايدى (Eustheniidae) الحية حاليًا ، وهو حدث ليس له نظير إلى بخصوص فصيلة بلاتيدي (Blattidae) .

٥ — تكشف رتبة أفيمروترا الحالية من حيث تعريفها البدائى وقرونها الشرجية الطويلة عن صفات تعد مميزة لرتبة الباليوديكتيوبترا المستحجرة والمعتقد أن الجنس تريفلوسوبا (Triphlosoba) المنتمى للعصر الكربونى الأعلى والمؤلف لرتبة مستحجرة

تسمى بروتوإيفيميرويديا (Protoephemeroidea) والذي يبدو أنه يمت إلى جنس من أجناس الباليوديكتيوترا بصلة قرابة قد أدى إلى ما اكتشف في صخور العصر البرميواى الأسفل من مستحجرات لذباب مايو حقيقى لا يختلف كثيراً عن توابع عائلة (فصيلة) سيفلونوريدي (Siphonuridae) العتيقة الحية حالياً .

٦ — كان للرتبة بروتوهيميترا (وهى رتبة قديمة أخرى) طراز من تعريق الأجنحة يوحى إلى احتمال كونها قد نشأت من فصيلة متخصصة من رتبة الباليوديكتيوترا ، ولكنها تجمع بين صفات تعريفية بدائية وأجزاء فمية متخصصة كالموجودة فى رتبة هيميترا الحالية . ولكن لغاية الوقت الحاضر لم يترع السجل الأحفورى بأية قرينة عن كيف أن تلك الأجزاء الفمية الهيميترية كانت مشتقة من أجزاء فمية قارضة غير متخصصة . وسواء أن البروتوهيميترا كانت أو لم تكن على نفس خط إنحدار الهيميترا الحالية فإنها تشير إلى الأرجحية بأن الرتبة الأخيرة كان لها سلسلة نسب مشتركة مع الاكسوتريموتا الأخرى المذكورة آنفاً .

٧ — ما اكتشف فى صخور العصر البرميواى الأسفل من هوموترا منقرضة قد أظهرت تشابهها من ناحية التعريق مع الطرز المبكرة من السوكوترا (Psocoptera) التى وجدت برفقتها ، والراجع على ما يبدو أن الهيميترا والسوكوترا هما تكوينان متشعبان من أصل واحد مشترك وأن الانوبلورا قد طورت بعدئذ فى الزمن الجيولوجى كسليلات من أفراد سوكوتيرية غير مجنحة ثم أصبحت مهياة لحياة طفيلية على فقاريات ذات دم حار .

٨ — السجل الأحفورى لرتبة أمبيوترا ضئيل لدرجة أنه لم يلق أى ضوء عن أسلافها ، وكذلك بالمثل لم تترك رتبة أيسوترا أية قرائن عن أجدادها ولكنها من الناحية التركيبية تم بجلاء عن صفات شبيهة بصفات عائلة بلاتيدى بل وهناك شك ضئيل فى كونها نشأت من أنواع صراصيرية الشكل قد اكتسبت بعدئذ نظاماً معقداً من الحياة الاجتماعية ، ففى الأزمان الثلاثية كانت أجناسها بنفس الشكل الذى نجدها عليه حالياً ومن البديهي إذن أنه يجب التنقيب عن أشكالها السلفية فى صخور أقدم عمراً من ذلك بكثير .

٩ — لم تكشف السجلات الاحافيرية أيضاً عن أى شيء بخصوص قرابات ثايزانوترا إلا أن دراسة الأنواع الحديثة تقودنا إلى الاستنتاج بأن لديها أوجه شبه مع الهيميترا عما مع أية رتبة أخرى ، ويحتمل أنها نشأت كفسائل جانبية من إحدى المجموع السوكوتيرية المبكرة ، إلا أن هذا الرأى مازال يفتقر إلى قرائن إثباتية .

١٠ — إن أقدم رتب الهولوميتابولا (الحشرات كاملة التبدل) هى الميكوبترا التى كانت بمثابة تمثيلًا جيدًا من قبل فى العصر البرميواى الأسفل ، إلا أن تعريق تلك الميكوبترا المبكرة يختلف بدرجة جوهرية عن تعريق كل من الباليوديكتيوبترا والبروتورثوبترا إلى حد يدفعنا إلى الاستنتاج بأنه لابد قد تواجدت فى بواكير الأزمان الكربونية سلسلة طويلة من الأشكال الانتقالية التى لم نستدل عليها حتى الآن . ومع أن أصول تلك الرتبة ما زالت إذن خافية فإن للرتبة نفسها أهمية عظمى من وجهة التاريخ التطورى الشعبى ، نظرًا لأن جميع الرتب الرئيسية من الهولوميتابولا (ما عدا كولوبترا وهامينوبترا) نحال بالارجح إلى أجداد ميكوبترية . فتحت رتبة بروتوميكوبترا (*Protomecoptera*) المنقرضة قد تضمنت أنواعًا تليق لأن تكون سلفًا لرتبة نيوروبترا ، بينما تحت رتبة باراميكوبترا (*Paramecoptera*) المنتمية للعصر البرميواى الأعلى فتستعرض صفات تعد سلفية بالنسبة لرتبتي ترايكوبترا ولييدوبترا من جهة كما تصاهاها مع الميكوبترا من الجهة الأخرى . عائلة ميزوسايكيدى (*Mesopsychidae*) التى وجدت فى صخور العصر الترياسى تجمع بين صفات توحى إلى كونها على خط إنحدار البروتوديتبرا (*Protodiptera*) ومع ذلك فالديتبرا الحقيقية لا تعرف باحتوائها على اشكال وسيطية تربط بينها وبين البروتوديتبرا .

١١ — ضمن الهامينوبترا يكون التعريف متخصصًا إلى درجة تدعو إلى اعتبار الرتبة ذات وضع معزول بمفرده . وحتى فى أعظم الدباير المنشارية بدائية فلا توجد أية قرينة على صلة قرى بأية رتب أخرى .

١٢ — البروتيليترويتبرا عبارة عن رتبة حشراتا مجهزة بجناحين أماميين غطائيين (لتغطية الجناحين الخلفيين) إلا أن قربانها ما تزال بعيدة كل البعد عن الوضوح . ولكن بما أنها تمت شبه وثيق لرتبة ديرماتبرا من حيث الجناح الخلفى فيمكن إعتبارها كأسلاف مبكرة لحشرات إبرة العجوز أو دخالات الاذن (*Earwigs*) الحالية ، كما وأن تعريق الجناحين الأماميين الغطائيين يوحى إلى كونها اشتقت من صراصر معينة من العصر الكربونى الأعلى . وأما رتبة البروتوكولوبترا فالمعتقد أنها من متخلفات رتبة بروتيليترويتبرا ، إلا أن البقايا الشحيحة المكتشفة حتى الآن من بروتوكولوبترا لا تتيح استخلاص استنتاجات ذات قيمة موضوعية .

١٣ — هناك من بين الرتب الحديثة تسعة على الأقل عرفت بكونها قد تواجدت منذ الأزمان الباليوزية ، وأما الرتب الباقية فمنها الترايكوبترا والهامينوبترا والديتبرا اكتشفت

مستحجراتها في طبقات العصر الجيوراسي بينا ثايزانيورا وأيسوترا ولبيدوترا فالمعروف حتى الآن أن تاريخها يعود إلى العصر الثلاثي فقط .

١٤ — هناك ثلاثة عائلات (فصائل) حديثة قد استدامت على ما يبدو منذ الأزمان الباليوزية وهي البوديوريدي (Poduridae) (من رتبة كوليمبولا) منذ العصر الديفونيائي الأوسط ، والبلاتيدي (Blattidae) (من رتبة أورثوترا) منذ العصر الكربوني الأعلى ، واليوسثينيدي (Eustheniidae) (من رتبة بليكوترا) منذ العصر البرميائي الأعلى .

١٥ — تعتبر رتبة البليوديكتيوترا المستحجرة أقرب الجميع إلى الصورة المتخيلة عن الحشرات المجنحة السلفية ، ولكن بما أن الرتب بروتودوناتا وميجاسيكتوترا والبروتوتوترا كانت متعاصرة مع البليوديكتيوترا في العصر الكربوني الأعلى وأن هذه الرتب الثلاثة كانت بالفعل آتخذ متميزة بنحو قاطع عن البليوديكتيوترا فإن هذا يدعو إلى الاستنتاج بأن الحشرات السلفية الفعلية ما تزال تنتظر إمطة اللثام عنها في طبقات عصور أبكر من ذلك .

١٦ — يبدو أن الأفيميوترا الحالية هي أقرب الجميع قرابة للبليوديكتيوترا بينا الأورثوترا والبليكتوترا فواضح أنهما مشتقتان من البروتوتوترا ، كما يظهر أن الأودوناتا قد نشأت عن طريق البروتودوناتا ، في حين أن أسلاف الهيميبترا والسوكوترا ما تزال غامضة .

١٧ — يبدو أن غالبية الرتب الهولوميتابولية (التامة التبدل) قد نشأت من أسلاف ميكوتراوية وأن منشأ الأخيرة ربما كان من أصل البليوديكتيوتري ، أما صلات قرى الهامينيوترا فليست معروفة ، بينما صلات قرى الكوليوترا فما تزال محفوفة بالشك ولكن يجوز أنها قد نشأت من بروتوتوترا عن طريق البروتوكوليوترا .

إنتهى بحمد الله

* *

*

المراجع العربية:

- ١ — دكتور أحمد ثابت عبد المنعم الدركزلى (١٩٨٢): علم فسلجة الحشرات . وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، العراق .
- ٢ — دكتور أحمد كامل-عزب (١٩٦٠): علم الحشرات العام . مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة .
- ٣ — دكتور أ. د. إمز (١٩٧٤): حياة الحشرات . ترجمة الدكتورة سمحة الزياىدى . رقم ٤٧٢ من سلسلة الألف كتاب بإشراف الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالى . دار الفكر العربى بالقاهرة .
- ٤ — دكتور شاكر محمد حماد (١٩٧٤): مورفولوجيا علم الحشرات (أساسيات ومتقدم) . دار المطبوعات الجديدة بالاسكندرية .
- ٥ — دكتور شاكر محمد حماد، دكتور ابراهيم عبده رواش، دكتور مراد محمد سامى الهلالى (١٩٧٥): مورفولوجيا وتقسيم الحشرات . دار الكتب الجامعية بالاسكندرية .
- ٦ — دكتور صالح كامل الصواف، دكتور محمد حسين زعزوع، دكتور شاكر محمد حماد، دكتور عبد الرحمن أحمد دنيا (١٩٧٢): مبادئ علم الحشرات . دار المعارف بالاسكندرية .
- ٧ — دكتور طلعت محمد الابراشى (١٩٧٨): غرائب الحشرات .. دار المعارف (كتابك — مسلسل رقم ١٠٧) بالقاهرة .
- ٨ — دكتور عبد العزيز محمد المنشاوى (١٩٧٤): أساسيات تقسيم الحشرات . كلية الزراعة، جامعة الاسكندرية .
- ٩ — دكتور محمد فؤاد توفيق (١٩٦٩): علم الحشرات العام . دار المعارف بالقاهرة .
- ١٠ — دكتور أرنست ماير، مورتون لينسلى، روبرت يوسنجر (١٩٦٥): طرق وأسس علم تصنيف الحيوان — ترجمة دكتور يحيى عزت، دكتور على المرسى، دكتور محمد رشاد الطوى (وزارة التربية والتعليم) جمهورية مصر العربية .

المراجع الأجنبية:

- Abdel-fattah, M.I. (1963) Studies on the morphology of the adult flea-beetle *Phyllotreta crucifera* (Col., Chrysomelidae) and the morphology and histology of its alimentary canal. M.Sc. Thesis, Fac. of Agr., Univ. of Alexandria.
- Abul-Naga, A. (1965): The external morphology, anatomy and histology of the mature larvae of the three different castes of the honeybee *Apis mellifera*. Ph.D. Thesis, Fac. of Agric., Univ. of Alexandria.
- AL Khalifa, Mohammed Saleh (1981)An: electron microscopical and histological Study of the egg development of the flour beetle *Tribolium castaneris* Herrbst (Tenebrionidae Col.). Bull of Faculty of Science King Saud University. Vol . 13. .
- Armanious, N. (1965): Studies on the morphology and biology of *Oxycarenus hyalinipennis* Costa. M.Sc. Thesis, Fac. of Agric., Univ., of Alexandria.
- Azmy, A.M. (1958): The external morphology of the adult weevil *Rhyncholus cylindricus* Boh., with a detailed study of its alimentary canal. Bull. Soc. Entom. Egypte. 62: 34-62.
- Beament, J.W., J.E. Treherne & V.B. Wigglesworth (1965-1978): Advances in insect physiology (1-13), Academic press, London & New York.
- Bodenheimer, F.S. (1951): Insects as human food.
- Bodenheimer, F.S. and Seirski (1957): Aphidoidea of the Middle East.
- Calahan, P.S. and Chapin J.B. (1960): Morphology of the reproductive systems and mating in two representative members of the family Noctidae, *Pseudaletia unipunctata* and *Peridroma margaritosa*, with comparison to *Heliothis zea*. Ann. ent. Soc. Amer., 51: 413-428.
- Chapman, R.F. (1969): The insects, structure and function. American Elsevier Publishing Co. Inc., New York.
- Chuman, T., Kato, K. and Noguchi, M. (1979): Agric. Biol. Chem. 43: 2005.

- Clausen, C.R. (1940): Entomophagous Insects.
- Counce, S.J. and Waddington, C.H. (1972&1973): Developmental systems: Insects. Vols. 1&2. Academic Press. London&New York.
- Davey, K.G. (1965): Reproduction in the insects (University Reviews in biology). Oliver&Boyd (Edinburgh&London).
- El-Mofty, M.M. (1955): The anatomy and histology of **Polyphaga aegyptiaca** Linn. (Orthoptera, Blattidae). M.Sc. Thesis, Fac. of Science, Univ., of Alexandria.
- El-Sawaf, S.K., Hammad, S.M. and El-Minshawy, A.M. (1964): The external morphology of **Spodoptera exigua** Hb. and **S. latebrosa** Letd. (Lep., Noctuidae). Alex. Journ. Agric. Res. 12 (No.2): 61-170.
- El-Sawarf, S.K., Hammad, S.M. and Allam, Somia (1964): The external morphology and internal anatomy of the adult moth of **Prodenis litura** F. (Lep., Noctuidae). Alex. Journ. Agric. Res. 12 (No. 2): 171-194.
- El-Shatoury, H. H. (1955): The structure of the lymph glands of **Drosophils** larvae. Roux, Archiv fur Entwicklungsmechanik, 147: 489-495.
- _____ (1965): Lethal no ____ differentiation and the development of the imaginal disc during larval stage in **Drosophia**. Ibid., 17: 523-538.
- Erick, K.E. (1952): A generic revision of the family Agromyzidae (Diptera) with a catalogue of new world species.
- Hall, S.A. (1963): New approaches to pest control and eradication. Advances in chemistry, series 41. American Chemical Society. Washington. D.C.
- Hammad, S.M. (1955): The morphology of three weevil larvae from Egypt. Bull. Entom. Soc. Egypt, 39: 385-389.
- _____ (1956): The external morphology of two Curculionid larvae (Coleoptera). Alex. Journ. Agric. Res., 4: 27-32.
- _____ (1957): The anatomy of the mature larva of **Pentarthrum huttodi** Woll. (Coleoptera, Curculionidae). Alex. Journ. Agric. Res. 5 (No.1): 3-36.
- _____ (1958): The morphology ad histology of the sexual

scent glands in the female moth of **Prodenia litura** F. (Lep, Noctuidae). Bull. Entom. Soc. Egypte, 62: 253-251.

_____ (1961): The morphology and histology of the sexual scent glands in certain female Lepidopterous moths. Bull. Entom. Soc. Egypte, 65: 471-482.

_____ (1965): Studies on the scent glands of Hymenoptera. I. The scent glands of **Vespa orientalis** (Vespidae) and **Cataglyphus bicolor** (Formicidae). Bull. Soc. Entom. Egypte, 49: 1-4.

Hammad, S.M. and El-Sherif, S. (1963): The external morphology of the adult beetle **Stephanoderes vulgaris** Shauf. (Col., Scolytidae), newly recorded from Egypte. Alex Journ. Agric. Res. 10 (No.2): 147-158.

Haskell, P.T. (1956a): J. exp. Biol., 33: 756-765.

_____ (1956b): J. exp. Biol. 33: 767-776.

_____ (1961): Insect Sounds.

Hassan, A:S, Shehata, A.E., and Hammad S.M. (1958): The morphology and anatomy of the mature larva of **Prodenia litura** F. Bull. Entom. Soc. Egypte 62: 291-309.

Hassan, A.A.G. (1943): The structure and mechanism of the spiracular regulatory apparatus in adult Diptera and certain other groups of insects. Trans. R. ent. Soc. Lond., 94: (103-153).

Henson, H. (1949): Embryology and metamorphosis. Biol. Rev., 21: 1-14.

Highnaw, K. C. (1965): Insect reproduction. Symposium No. 2. Trans. Roy. ent. Soc. London.

Hinton, H.E. (1947): On the reduction of functional spiracles in the aquatic larvae of Holometabola with notes on the moulting process of spiracles. Trans. R. ent. Soc. Lond. 98: 449-473.

_____ (1976): Notes on neglected phases in metamorphosis. Ann. Entom. Soc. Am.: 69 (no.): 560-566.

_____ (1948): Entomologist. 81: 254-269.

_____ (1951): The structure and function of the endocrine glands of the Lepidoptera. The Proceedings of the South London Entomological and Natural History Society for 1950-1961.

Hoppe, T. and Levinson, H.Z. (1979): The use of adhesive Pheromone traps for the detection and surveillance of storage moths (Phycitidae) in a chocolate factory. Anz. Schadlings Kunde., Pflanzenschutz, Umwelt-Schutz 52: 177-183.

Imms, A.D. (1960): Textbook of Entomology.

Jacobson, Martin (1967): Insect sex attractants. Interscience Publishers (New York and London).

_____ (1972: Insect sex pheromones. Academic Press.

_____ et al. (1978): Science, 159 (3811): 208-209.

Johannson, O.A. and Butt, F.H. (1941): Embryology of Insects and Myriapoda.

Khalifa, A. (1949a): The mechanism of insemination and the mode of action of the spermatophore in *Gryllus domesticus*. Quart. J.micr., Sci. 90: 281-292.

Khalifa. A. (1949b): Spermatophore production in Trichoptera and some other insects. Trans. Roy. ent. Soc. Lond., 100: 449-479.

Khalifa. A. (1950): Spermatophore production in *Galleria mellonella* (Lepidoptera). Trans Roy. ent. Soc. Lond. (A). 25; 33-42.

Levinson, H.Z. et al (1981): The pheromone activity of Anhydroserricornin and Serricornin for male Cigarette beetles (*Lasioderma serricorne*). Naturwissen schaften. 68: 148-149.

Metcalf, C.L, Flint, W.P. and Metcalf, R.C. (1962): Destructive and useful insects. McGraw-Hill Book Company

Minnich, D.W. (1925): J. exp., Zool., 42: 442-469.

_____ (1936): J. exp. Zool. 72: 439-453.

Muller, J. (1826): Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinnes des Menschen und der Tiere. Leipzig.

Mills, H.B. (1940): A new *Nicoletia* (Thysanura, Lepismidae). Ent. News, 51: 271-272.

Novak, V.J.A. (1975): Insect hormones. Chapman and Hall, London.

Neville, A.C. (1970): Insect ultrastructure. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

- Nour El-Din, I.T. (1963): Comparative study of the external morphology and internal anatomy of the alimentary canals and the reproductive systems of the queen, worker, and drone of the hornet wasp *Vespa orientalis* Fab. (Hym. Vespidae). M.Sc. Thesis, Fac. Agric., Univ. Alexandria.
- Novak, V.S.A. (1966): Insect hormones. Bulter and Tanner, London.
- Rees, H.H. (1977): Insect biochemistry. Chapman & Hall, London.
- Richards, A.G. (1951): The integument of Arthropods.
- Rockstein, Morris (1973-1974): The physiology of insecta. Vols. 1-6. Academic press, London, New York.
- Roshdy, H.M. (1950): Elementary Practical Zoology, Vol. 1. Protozoa and Invertebrates.
- Ross, H.H. (1948): A Textbook of Entomology.
- Saunders, D.S. (1976): Insect clocks. Pergamon Press, Oxford & New York.
- Shorey, H.H. and Mcltelvey, J.J. (1977): Chemical control of insect behaviour. John Wiley & Sons, New York & London.
- Siebold, C.T. (1841): Arch. Naturg., 10: 52-81.
- Sihler, H. (1924): Zool. Jahrb, Anat. Oent. Tiere, 45: 519-580.
- Salma, K. Romanuk, M. and Form, F. (1974). Insect hormones and bioanalogues. Springer-Verlag. New York & Wien.
- Smith, D.S. (1968): Insect cells: their structure and function. Oliver and Boyd, Edinburg.
- Snodgrass, R.E. (1925): Ann. Dept. Smithsonian Institute (1923): 405-452.
- _____ (1935): Principles of insect morphology.
- _____ (1951): Comparative studies of the head of mandibulate Arthrohods.
- _____ (1956): Anatomy of the honebee.
- Treherne, J.E. and Beament, J.W. (1965). The Physiology of the

insect central nervous system. Academic Press, London and New York.

Tuxen, S.C. (1956): Taxonomist's glossary of genitalia of insects.

Usherwood, P.N.R. (1975): Insect muscle. Academic Press, London & New York.

Van Emden, F.I. (1945): Egg-busters in some families of polyphagous beetles and some general remarks on egg-busters. Trans. Roy. ent, Soc, Lond., 21: 73-108.

Weber, Herman (1947: Grundriss der Insektenkunde (Verlag von Gustav Fischer Jena).

Wigglesworth, V.B. (1961): The Principles of insect physiology.

_____ (1964): The life of insects.

_____ (1970): Insect hormones. W.H. Freeman & Co. San Francisco.

Woods, E.F. (1956): Bee world. 37: 185-195, 216-226.

_____ (195): Nature. London, 84: 842-841.

Yeager, J.F. (1945): The blood picture of the southern army-worm **Prodenia eridanta**. J. agric. Res., 71: 1-40.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٤ / ٤٤٩١
الترقيم الدولي ١ - ٠٧٧ - ١٤٢ - ٩٧٧

دار النصر للطباعة الإسلامية
١٢ شارع نشاطي ... شبرا مصر ت ٧٧٣٢٢١